

طلبية الدراسة الخالصة



N b T

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠

(وثيقة محبة/محدود)

٣
٢
١

المبحث: الرياضيات (م٣، ف١، الورقة الأولى) رمز المبحث: ٢٠٢٠ مدة الامتحان: ١٠٠

الفرع: (الأدبي، الشرعي، الإدارة المعلوماتية، التعليم الصحي، فنون/جامعات) رقم النموذج: ١ اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠٢٠/٧/١
رقم الجلوس:


اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل عاًمق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة

في نموذج الإجابة (القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٢٠)

وعدد الصفحات (٣):

* معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران $Q(s)$ ، أجب عن الفقرتين (١)، (٢) الآتيتين:



١) $\lim_{s \rightarrow 2^-} Q(s)$ تساوي:

أ) ٢ ب) ١ ج) ٣ د) غير موجودة

٢) ما مجموعة قيم s التي يكون عندها الاقتران Q غير متصل؟

أ) {١ ، ٣} ب) {١ ، ٢} ج) {٢ ، ٣} د) {٢ ، ٤}

٣) إذا كانت $\lim_{s \rightarrow 3^-} Q(s) = 1$ ، $\lim_{s \rightarrow 3^+} Q(s) = -4$ ، فإن $\lim_{s \rightarrow 3} (Q(s) - h(s))$ تساوي:

أ) -٥ ب) -٦ ج) ٦ د) ٥

٤) إذا كانت $\lim_{s \rightarrow 1^-} (Ls^2 + 9) = 8$ ، فإن قيمة الثابت L تساوي:

أ) ١ ب) ١ ج) -١ د) ١٧

٥) إذا كانت $\lim_{s \rightarrow 1^+} Q(s) = 6$ ، فإن قيمة $\lim_{s \rightarrow 1^-} (Q(s))^2$ تساوي:

أ) ٣٦ ب) ٤ ج) ٩ د) ١٨

$$6) \text{ إذا كان } \frac{s^3 - 4}{2 + s} \text{ تساوي:}$$

- أ) ٤ ب) ٤ ج) صفر د) غير موجودة

7) إذا كان الاقتران $Q(s)$ متصلًا عند $s = 3$ ، وكانت $\lim_{s \rightarrow 3^-} Q(s) = 5$ ، فإن قيمة $Q(3)$ تساوي:

- أ) ٦ ب) ٥ ج) ٥ د) ٥

8) إذا كان $Q(s) = \frac{s(s-3)}{(s+1)(s-5)}$ ، فإن مجموعه قيم s التي يكون عندها الاقتران Q غير متصل هي:

- أ) {٣، ٠} ب) {-١، ٥} ج) {-٥، ١} د) {٠، ٣}

9) إذا كان منحنى الاقتران $s = Q(s)$ يمر بالنقطتين $(1, 2), (2, 1)$ ، فإن معدل تغير الاقتران $Q(s)$

في الفترة $[1, 2]$ يساوي:

- أ) $\frac{1}{2}$ ب) $-\frac{1}{2}$ ج) ٢ د) -٢

١٠) يتحرك جسيم على خط مستقيم حسب العلاقة: $s = f(t) = t^2$ ، حيث f المسافة المقطوعة بالأمتار ،

ن الزمن بالثواني ، ما السرعة المتوسطة للجسيم في الفترة الزمنية $[1, 3]$ ؟

- أ) ٢ م/ث ب) ٦ م/ث ج) ٨ م/ث د) ٤ م/ث

١١) إذا كان $Q(s) = s^3 + 27$ ، فإن $\lim_{s \rightarrow -5^+} Q(s) = Q(-5)$ تساوي:

- أ) ١٢ ب) ١٢ ج) ٢٥ د) ٣٩

١٢) إذا كان $Q(s) = \frac{8}{s}$ ، $s \neq 0$ ، فإن قيمة $Q(-2)$ تساوي:

- أ) ٨ ب) ٦ ج) -٢ د) ٢

١٣) إذا كان $Q(-5) = 1, Q(-3) = 2, Q(-1) = 5, Q(2) = 3$ ، فإن $(Q \times h)(2)$ تساوي:

- أ) ٦ ب) ٦ ج) -٣ د) ٣

١٤) إذا كان $Q(s) = \sqrt{2s-1}$ ، $s > \frac{1}{2}$ ، فإن $Q(5)$ تساوي:

- أ) $\frac{1}{3}$ ب) $\frac{1}{3}$ ج) -٣ د) ٣

(١٥) إذا كان $Q(s) = 3s^2$ ، فإن $Q'(s)$ تساوي:

- (أ) $-6s^2$ (ب) $6s^2$ (ج) $-3s^2$ (د) $3s^2$

(١٦) إذا كان $Q(s)$ اقترانًا متصلًا ، حيث $Q(1) = 0$ ، $Q'(1) = 2$ ، فإن معادلة المماس لمنحنى الاقتران Q عند $s = 1$ هي:

- (أ) $s = 2$ (ب) $s = -2$ (ج) $s = 2 - \frac{1}{s}$ (د) $s = \frac{1}{2}$

(١٧) يتحرك جسم وفق العلاقة: $F(n) = 3n^2 - n + 2$ ، حيث F المسافة بالامتار ، n الزمن بالثاني ، فإن تسارع الجسم بعد مرور (٣) ثوانٍ من بدء الحركة يساوي:

- (أ) 3 م/ث^2 (ب) 2 م/ث^2 (ج) 6 م/ث^2 (د) 5 م/ث^2

(١٨) إذا كانت $Q(s) = 4 - s^2$ ، فإن الاقتران Q يكون متزايدًا في الفترة:

- (أ) $[0, 4]$ (ب) $[-2, 2]$ (ج) $[2, \infty)$ (د) $(-\infty, -2]$

(١٩) إذا كان للاقتران $Q(s) = ms^2 + 4s - 4$ ، نقطة حرجة عند $s = -1$ ، فإن قيمة الثابت m تساوي:

- (أ) 2 (ب) -4 (ج) -3 (د) 4

(٢٠) إذا كان $K(s) = 50 + 4s$ دينار ، اقتران التكالفة الكلية لإنتاج s قطعة من سلعة ما ، فإن التكالفة الحدية لإنتاج (٢٠) قطعة من السلعة نفسها بالدينار تساوي:

- (أ) 50 (ب) 200 (ج) 160 (د) 120

«انتهت الأسئلة»