



د. س.

٣ ..

مدة الامتحان :

التاريخ : ٢٠٠١/١/١٨

المبحث : الكيمياء

الفرع : العلمي

ملحوظة: أجب عن جميع الأسئلة التالية وعددها (5) علماً بأن عدد صفحات الامتحان (3) .

السؤال الأول: (18 marks)

يتضمن هذا السؤال تسع فقرات، ولكل فقرة أربع إجابات واحدة منها صحيحة، انقل الإجابة الصحيحة لكل فقرة الى دفتر إجابتك.

1- في محلول مائي لـ N_2H_4 تركيزه (0.01 M)، K_b لـ $N_2H_4 = 1 \times 10^{-6}$ ، فإن قيمة pH للمحلول تساوي:

د- 12

ج- 10

ب- 8

أ- 4

د- NH_4NO_3 ج- $NaNO_3$ ب- $NaCN$ أ- KCl

3- إحدى المواد الآتية تسلك كحمض لويس فقط:

د- H_2O ج- OH^- ب- $B(OH)_3$ أ- NH_3

4- عدد تأكسد (As) في الأيون AsO_4^{3-} يساوي:

د- +5

ج- -5

ب- -3

أ- +3

5- عند التحليل الكهربائي لمحلول $NaCl$ تركيزه (1 M) باستخدام أقطاب خاملة فإن الذي يتكون عند المهبط:

د- $OH^-(aq)$ ج- $H^+(aq)$ ب- $Cl_2(g)$

أ- ذرات Na

6- إحدى العبارات الآتية المتعلقة بطاقة التنشيط تعتبر صحيحة:

أ- طاقة التنشيط تساوي طاقة المعقد المنشط.

ب- تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط.

ج- تقل طاقة التنشيط بزيادة درجة حرارة التفاعل.

د- تزداد طاقة التنشيط بزيادة درجة حرارة التفاعل.

7- في التفاعل الآتي: $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ ، إذا كانت سرعة استهلاك $(O_2) = 0.010 \text{ M/s}$ ، فإن سرعة تكوين H_2O (M/s) يساوي:

د- 8×10^{-2} ج- 1.25×10^{-2} ب- 8×10^{-3} أ- 1.25×10^{-3}

8- في التفاعل الآتي: $CH_3C \equiv CH + 2HBr \longrightarrow$ ، يكون الناتج:

ب- $CH_3CHBrCH_2Br$ أ- $CH_3CBr_2CH_3$ د- $BrCH_2CH_2CH_2Br$ ج- $CH_3CH_2CHBr_2$

9- عند اختزال البروبانال بواسطة H_2 وبوجود Ni، فإن المركب الناتج:

ب- 1 - بروبانول

ج- 2 - بروبانول

د- بروبانون

السؤال الثاني: (20 marks)

أ) اعتماداً على الجدول المجاور الذي يبين قيم ثابت التأيين (K_a) لعدد من الحموض الضعيفة، أجب عما يأتي: (14 marks)

صيغة الحمض	K_a
HA	3.2×10^{-8}
HB	7.5×10^{-3}
HC	4.0×10^{-10}
HD	6.3×10^{-5}

- 1- أي من محاليل هذه الحموض له أقل قيمة (pH)؟ (التركيز نفسه).
- 2- حدد الزوجين المرافقين من الحمض والقاعدة عند تفاعل حمض HD مع الماء.
- 3- أي من محاليل أملاح البوتاسيوم لهذه الحموض له أقل قيمة (pH)؟ (التركيز نفسه).

4- احسب قيمة pH لمحلول الحمض HC تركيزه (0.25 M).

5- قرر الجهة التي يرجحها الاتزان في التفاعل الآتي: $HA_{(aq)} + D^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons HD_{(aq)} + A^{-}_{(aq)}$

ب) حضر محلول منظم من قاعدة ضعيفة (B) تركيزها (0.3 M) والملح (BHCl) بالتركيز نفسه، فإذا علمت أن $K_b = 2 \times 10^{-4}$ ، أجب عما يأتي: (6 marks)

- 1- احسب pH للمحلول المنظم الناتج.
- 2- احسب كم تصبح قيمة pH عند إضافة 0.1 mol من HCl إلى لتر من المحلول المنظم السابق. ($\log 5 = 0.7$, $\log 2 = 0.3$)

السؤال الثالث: (20 marks)


أ) اعتماداً على جهود الاختزال المعيارية لأنصاف التفاعلات المبينة في الجدول المجاور، أجب عما يأتي:

نصف تفاعل الاختزال	$E^\circ (V)$
$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	-0.23
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80
$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$	-1.18
$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	+1.07
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	-0.44
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34

(10 marks)

- 1) ما العنصر الأقوى كعامل مؤكسد؟
- 2) ما الفلز الذي يتفاعل مع محلول حمض HCl ويطلق غاز H_2 ولا يذوب في أيونات Fe^{2+} ؟
- 3) أي فلزين يكونان خلية جلفانية بأعلى جهد (E°)؟ احسب جهد الخلية.
- 4) هل يمكن حفظ محلول مائي من كبريتات النحاس في وعاء فضة؟ فسر إجابتك اعتماداً على قيمة (E°) للتفاعل الكلي.

ب) وازن معادلة التفاعل الآتي بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي، ثم حدد كلاً من العامل المختزل والعامل المؤكسد فيها: (10 marks)



السؤال الرابع: (10 marks)

في التفاعل الآتي: $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$ ، تم جمع البيانات العملية كما هو مبين في الجدول أدناه، أجب عما يأتي:

رقم التجربة	$[Cl_2] (M)$	$[NO] (M)$	السرعة الابتدائية ($M.s^{-1}$)
1	0.1	0.1	2.50×10^{-6}
2	0.3	0.1	7.50×10^{-6}
3	0.1	0.3	2.25×10^{-5}


- 1- احسب رتبة التفاعل لكل من المادتين: NO ، Cl_2 .
- 2- اكتب قانون سرعة التفاعل.
- 3- احسب قيمة ثابت السرعة (k) مع ذكر وحدته.

السؤال الخامس: (15 marks)

أ) مبتدئاً بالمركب 1- بيوتانول ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)، بين بمعادلات كيفية تحضير المركب بيوتانول مستعينا بأي مواد غير عضوية تراها مناسبة. (6 marks)

(9 marks)

ب) اكتب الناتج العضوي في كل من التفاعلات الآتية:



انتهت الأسئلة

Ahmad Al-hosain