

الكيمياء

CHEMISTRY

للفصل الرابع العلمي

تأليف

أ.د. مهند جميل محمود
سالم محمد سيد النصراوي
خلود مهدي سالم
باسل ابراهيم الشوك
كريم عبدالحسين الكناني

أ.د. عمارهاني الدجيلي
د. سمير حكيم كريم
هدى صلاح كريم
ماجد حسين الجصاني
اسامة مرتضى الخالصي



1440 هـ / 2019 م

الطبعة العاشرة

المشرف العلمي على الطبع
د. هدى صلاح كريم

المشرف الفني على الطبع
بسمل عمر أكرم مهدي

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq
manahjb@yahoo.com
Info@manahj.edu.iq



[manahjb](#)

[manahj](#)



إسناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الأسواق

علم الكيمياء - بخصوصاته الدقيقة المتنوعة - حجر الاساس والمحفز الاول في تطوير العلوم الطبيعية كلها مثل الفيزياء والجيولوجي وعلوم الحياة وغيرها.. فما التطور في شتى مجالات الحياة، الا واسسه معرفة تركيب المادة و خواصها وتصنيع الاف المواد الجديدة المشتقة من المواد الاولية المحدودة وفقاً لحاجة المجتمع.

وقد اتصف محتوى كتاب الكيمياء للصف الرابع العلمي بالآتي:
أولاً: عمق المادة العلمية المتناسبة مع الساعات المحددة للتنفيذ آخذين بنظر الاعتبار المزاوجة بين المبادئ والمفاهيم الاساسية في الكيمياء وحدث النظريات والتطبيقات العملية.

ثانياً: التوسيع الاقفي والعمودي في المعلومات وفقاً لعمر الطالب وما درسه مسبقاً مع ربط المعلومات بالبيئة المحلية والصناعات العراقية والتقدم العلمي العالمي - ما أمكننا ذلك.

ثالثاً: الجانب العملي ودوره الأساس في دراسة الكيمياء .وفي هذا المجال توصي اللجنة بالآتي:

1 - من الضروري جداً اجراء التجارب المختبرية المنهجية بالاماكنات المتوفرة وتقليل الاعتماد على المادة النظرية الصرف، أبعاداً للملل والسام عن الطلبة.

2- تشجيع الطلبة على توسيع معلوماتهم عن طريق التقارير المستندة الى معلومات المكتبة المدرسية ووسائل الاعلام المتنوعة الاخرى والتشجيع على البحث والتقسي.

3 - استثمار موارد البيئة المتاحة في التجارب وإثراء المعلومات وربط الطلبة ببيئتهم المحلية - كيميائياً وتعويدهم على السعي من اجل كيمياء خضراء وبيئة نظيفة فعلياً.

4 - تنظيم سفرات نوعية (علمية ترفيهية) في الوقت نفسه الى المعامل والمصانع القريبة من المدرسة لإطلاع الطلبة - ميدانياً - على خطوات التصنيع وكيفية تحويل المواد الأولية او نصف المصنعة الى مواد جديدة يفيد منها المجتمع ... ومطالبة الطلبة بتقارير علمية عن هذه الزيارات (يكافؤون عنها) .

نأمل من اخواننا المدرسين ومن له شأن بمادة الكتاب موافاة المديرية العامة للمناهج بما يستجد لديهم من مقتراحات لتطوير وتنقیح محتوى الكتاب.

المؤلفون

الفهرس

5

الفصل الأول

المفاهيم الأساسية في الكيمياء

31

الفصل الثاني

الغازات

64

الفصل الثالث

المعادلات والحسابات الكيميائية

87

الفصل الرابع

الكيمياء العضوية

118


الفصل الخامس

الكيمياء النووية

المفاهيم الاساسية في الكيمياء

Basic Concepts in Chemistry

1



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان : -

يتفهم النظرية الذرية لذالتون وفرضياتها واستخدام قوانين الاتحاد الكيميائي في التعرف على تكون المركبات الكيميائية ونسب العناصر الثابتة فيها .

يفهم ما يرمي اليه قانون غي - لوساك للحجوم الغازية المتفاعلة وعلاقته بفرضية افوكادرو .

يعرف المصطلحات الاساسية: التكافؤ ، الكتلة الذرية ، الكتلة المكافئة والعلاقة بينهما ويتمكن من معرفة مفهوم المول والكتلة المولية وعدد افوكادرو والعلاقة بينهما.

يستطيع التوصل الى معرفة الصيغ الكيميائية الوضعية والجزئية للمركبات وكيفية ايجادها من حساب النسبة المئوية للعناصر الدالة في تركيب المركبات.



ادت الأبحاث والأكتشافات العلمية والكيميائية، والتي جرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، إلى معرفة أن المادة تتكون من نرات، وأن إختلاف نوع الذرة وعددها هو الذي يحدد صفات ونوع الجزيئات التي تؤلفها ، أي تحدد صفات المادة. وهذا ما ساعد العالم الانكليزي جون دالتون (Dalton) إلى اعلان النظرية الذرية للمادة عام 1803م وسميت بالنظرية الذرية لدالتون والتي تضمنت الفرضيات الآتية:



- 1- أن المادة تتكون من دقائق صغيرة غير قابلة للتجزئة تسمى «نرات» (وقد تمكّن العلماء فيما بعد من تجزئتها).
- 2- أن النرات لاتفنى ولا يمكن تخليقها، ضمن النطاق البشري.
- 3- نرات العنصر الواحد متشابهة في كافة خواصها الفيزيائية والكيميائية وتختلف عن نرات العناصر الأخرى.
- 4- تتكون النرات المركبة (كما دعاها دالتون) من اتحاد نرات العناصر بحسب عدديّة بسيطة. وبعد ثمانية سنوات أدخلت بعض التعديلات عليها، حيث استبدل التعبير ”النرات المركبة“ بكلمة ”الجزيئات“ من قبل العالم الإيطالي أفوگادرو (Avogadro) ويجب أن يكون فهمنا لهذه الفرضيات في الفترة الزمنية التي جاء بها دالتون، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث التقدم العلمي الذي حصل فيما بعد وخصوصاً خلال القرن العشرين، قد أدى إلى إعادة صياغة هذه الفرضيات بصورة أكثر دقة، إلا أن ذلك لم يؤثر مطلقاً على معانيها الأساسية. وقد كان غرض دالتون من صياغة بنود هذه النظرية هو لتفسيير هذه التغيرات الكيميائية التي تحدث على المادة وقوانين الاتحاد الكيميائي التي تحكمها.

جون دالتون « 1766م-1844م » ولد من أب حائك فقير، وقد عمل في سن مبكرة. بيد أنه كان يمضى جل فراغه في دراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية اللاتينية. أهتم بدراسة علم الاحوال الجوية ومنذ عام 1787 وحتى وفاته سجل أكثر من 200000 ملاحظة، وقد قاده اهتمامه هذا لأن يتحرى عن خواص الغازات فأكتشف قانون الضغوط الجزئية لها واستنتج أيضاً أن انحلال غاز في مزيج من جملة غازات يتتناسب وضغطه الجزيئي ومنذ عام 1803 م عمل على تطوير نظريته الذرية، فوضع قانون النسب المضاعفة كما ادخل مفهوم الكتلة الذرية النسبية .



2-1 قوانين الاتحاد الكيميائي



نتيجة لتطور المعرفة العلمية والاكتشافات الجديدة والقائمة والمعتمدة على التجارب العملية والاستنتاجات العلمية ادت الى تفسير تركيب المادة وصياغة قوانين الاتحاد الكيميائي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.

ان اول هذه القوانين هو قانون حفظ الكتلة (Law of mass conservation) الذي اجاب عن سؤال ماذا يحدث للمادة أثناء تفاعلها الكيميائي؟. يمكن ان تفنى أو تخلق؟ فهل ان كتلة المواد المتفاعلة تختلف عن كتلة المواد الناتجة من التفاعل ، أم تسليها؟. للجابة على كل تلك الأسئلة، قام العالم الفرنسي لافوازية (Lavoisier) 1743-1794 بأخذة

القصدير في وعاء مغلق، فوجد أن كتلة الوعاء المغلق تبقى ثابتة دون تغير، لأنه قد تم تفاعل كيميائي بين القصدير والاوكسجين وتكونت جزيئات جديدة هي أوكسيد القصدير (II).

ولما كانت كتلة الذرة لاتعتمد على طبيعة الذرات الأخرى التي تتحد معها، فمن البديهي أن تحافظ كافة نرات الاوكسجين والقصدير الدالة في التفاعل الكيميائي على كتلتها بدون تغير، فدللت تجارب لافوازية على أن:-

”**كتلة المادة لا تفنى ولا تخلق أثناء التفاعل الكيميائي**“ أي أن:-

كتل المواد المتفاعلة = كتل المواد الناتجة من التفاعل

يعتبر العالم العربي ابو القاسم المجريطي «1007-950م» اول من برهن على صحة هذا القانون، فلقد لاحظ عند تسخين كمية موزونة من عنصر الزئبق في وعاء زجاجي مغلق وبوجود الهواء سيتحول الزئبق الى مسحوق أحمر ناعم دون حدوث تغير في الكتلة الكلية للمواد المتفاعلة داخل الوعاء. وقد اعاد لافوازية وتوصل الى نفس استنتاج المجريطي ثم وضع قانون حفظ الكتلة.

مثال 1-1 :

أمرر 73 g من غاز HCl في محلول يحتوي على 158 g من ثايكبريتات الصوديوم فتكون 117 g من ملح الطعام و 64 g من غاز SO_2 و 32 g من الكبريت و 18 g من الماء. برهن أن هذه النتائج تؤيد قانون حفظ الكتلة؟

الحل :

$$158 + 73 = 231 \text{ g} = \text{مجموع كتل المواد المتفاعلة}$$

$$117 + 64 + 32 + 18 = 231 \text{ g} = \text{مجموع كتل المواد الناتجة}$$

مجموع كتل المواد الداخلة في تفاعل = مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل وهذا ما يتفق مع قانون حفظ الكتلة.



ابو القاسم مسلمه بن احمد المجريطي 950-1007م . ولد في بلاد الاندلس وتوفي فيها، وهو الذي يعد أحد رواد صناعة الكيمياء، في المغرب العربي هي اتحاد العناصر بنسب وزنية ثابتة لتكوين المركبات. وكان ومن آثاره كتاب «غاية الحكيم» وكتاب «رتبة الحكيم» حيث لاحظ بأنه عندما سخن ربع رطل « وهو معيار قديم» من عنصر الزئبق في وعاء زجاجي مغلق يشبه البيضة له» ولناخذ المثال الآتي :

او من وضع قانون التراكيب الثابتة العالم برواست (prust) اول (Law of constant composition) والذي نص على ان «جميع العينات لمركب معين تمتلك نفس النسب من العناصر المكونة وبوجود الهواء (الاوكسجين) تحول الزئبق الى مسحوق احمر ناعم نعرفه اليوم بـأوكسيد الزئبق(II) دون أن يحدث تغيير في الكتلة الكلية للمواد المتفاعلة.

$$\text{النسبة} = \frac{16 \text{ g (O)}}{2 \text{ g (H)}}$$

وهذه النسبة ستجدها في كل عينة من عينات الماء النقى بغض النظر عن المصدر الذي اخذت منه او باي طريقة تم تحضيره (الشكل 1-1) تمتلك المركبات تركيباً ثابتاً. يمتلك الماء باي طريقة على نسبة ثابتة من الهيدروجين (●) للاوكسجين (●) بغض النظر من اي مصدر جاء.



الشكل 1 - 1

لا يطبق قانون التراكيب الثابتة على الماء فقط ولكن على جميع المركبات الكيميائية . لذا نأخذ الامونيا التي تتركب من النتروجين والهيدروجين . تحتوي الامونيا على 14 g من النتروجين لكل 3 g من الهيدروجين ، اي نسبة كتلة النتروجين الى الهيدروجين تساوي :

$$\text{النسبة} = \frac{14 \text{ g (N)}}{3 \text{ g (H)}}$$

وهذه النسبة كذلك صحيحة لاي عينة من عينات الامونيا مهما كان مصدرها او طريقة تحضيرها .

تمرين (1-1)

تم تحليل عينتين من احدى اوكسيد الكاربون تم الحصول عليهما من مصادر مختلفين . احتوت العينة الاولى على 4.3 g من الاوكسجين و 3.2 g من الكاربون . بينما احتوت العينة الثانية 7.5 g اوكسجين و 5.6 g من الكاربون . هل تحقق هذه النتائج قانون التراكيب الثابتة .

مثال 1-2 :

تم الحصول على عينتين من ثنائي اوكسيد الكاربون من مصادر مختلفين . وتم تفكيكهما الى مكوناتها من العناصر . احتوت العينة الاولى 4.8 g من الاوكسجين و 1.8 g من الكاربون بينما احتوت العينة الاخرى 17.1 g من الاوكسجين و 6.4 g من الكاربون . بين ان هذه النتائج تتوافق مع قانون التراكيب الثابتة .

الحل :

نسبة كتلة الاوكسجين الى الكاربون في العينة الاولى

$$\text{النسبة} = \frac{4.8 \text{ g (O)}}{1.8 \text{ g (C)}}$$

نسبة كتلة الاوكسجين الى الكاربون في العينة الثانية

$$\text{النسبة} = \frac{17.1 \text{ g (O)}}{6.4 \text{ g (C)}}$$

وبما ان النسبة هي نفسها للعينتين ، معنى ذلك ان هذه النتائج تتوافق مع قانون التراكيب الثابتة .

3-1 قانون غي - لوساك للجوم الغازية المتفاعلة Gay-Lussac Law of Combining Gas Volumes

لقد اشتغل العالم الفرنسي غي-لوساك (Joseph Gay- Lussac) كثيراً في تفاعل الغازات فرأى أن هناك علاقة بين حجم الغازات الداخلة في التفاعل الكيميائي والناتجة منه تحت نفس الظروف من ضغط ودرجة حرارة، وبقياس حجم الغازات المتفاعلة والناتجة عن التفاعل صاغ نتائج تحرياته في عام

1808 م بالتعوييم الآتي:

”تناسب حجم الغازات الداخلة في التفاعل الكيميائي أو الناتجة منه مع بعضها البعض تناسباً عددياً بسيطاً إذا ما قيست تحت نفس الظروف من ضغط ودرجة حرارة“
فمثلاً :


1- يتحد حجم واحد من الهيدروجين مع حجم واحد من الكلور ويكون حجمان من غاز كلوريد الهيدروجين، فالنسبة بين حجمي الغازين المترافقين وحجم الغاز الناتج هي 1:2:1 كما في المعادلة الكيميائية الآتية :



2- عند تحليل الماء كهربائياً يكون حجم الهيدروجين المتحرر مسليوياً ضعف حجم الاوكسجين، كما أنه يتحد حجمين من الهيدروجين بحجم واحد من الاوكسجين وينتج حجمان من بخار الماء.




فالنسبة بين حجمي الغازين المترافقين وحجم بخار الماء الناتج هي 2:1:2 فتكون نسبة عددية بسيطة.
ويمكن تمثيل ما سبق بالأشكال الآتية :



حجمين من هيدروجين + حجم واحد اوكسجين → حجمين من بخار الماء

تمثيل بعض تجارب
غي - لوساك في مجال
اتحاد حجم مختلفة من
الغازات .



حجمين من هيدروجين + حجم واحد اوكسجين → حجمين من بخار الماء

في عام 1811 م توصل العالم الإيطالي أفوکادرو إلى أن جزيئات العناصر الغازية قد تتكون من أكثر من نرة واحدة، أي قد تتكون من نرتين، أي أن جزيء العنصر الغازي هو جزيء ثنائي الذرة، حيث أدخل مفهوم جزيء (molecule) كأصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد بصورة مستقلة، والبقاء على مفهوم الذرة كأصغر جزء من العنصر يوجد في جزيئات مختلف المركبات، وقد أكد على أن جزيئات المواد البسيطة ليست بالضرورة متماثلة مع نرات العنصر، بل أنها على عكس ذلك قد تتكون من عدة نرات متماثلة. كانت فرضية أفوکادرو الأساسية كالتالي :

”تحوي الحجوم المتسلویة من الغازات المختلفة والمقدمة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، اعداداً متسلویة من الجزيئات.“


لم تقتصر فرضية أفوکادرو على تفسير النسب البسيطة والكافئة ما بين حجوم الغازات الداخلة في التفاعل والناتجة عنه فحسب، بل قدمت أيضاً بعض النتائج الهامة المتعلقة بعدد الذرات في جزيئات الغازات البسيطة والمعقدة، ممهدة بذلك أمام تعين الكتل الذرية الحقيقة. لقد افترض أفوکادرو أن عددًا ثابتاً من الذرات يتحد من كل عنصر لتكوين جزيء منه. وعلى نفس النهج تكون جزيئات المركبات، سوى أن الذرات التي تؤلف جزيء المركب ليست من نوع واحد، فمثلاً : عند اتحاد حجم من غاز الهيدروجين مع حجم مسلي له من غاز الكلور نحصل على حجمين من غاز كلوريد الهيدروجين أي نحصل على :




ويتحد حجمان من غاز الهيدروجين مع حجم واحد من غاز الاوكسجين لنحصل على حجمين من بخار الماء .



وان هذا لا ينافي نظرية دالتون الذرية ، فعليه يجب أن يتكون جزيء الهيدروجين من نرتين وكذلك جزيء الكلور والأوكسجين تتكونان من نرتين أيضاً، أما جزيء كلوريد الهيدروجين فانها تتكون من نرة كلور واحدة متحدة مع نرة واحدة من الهيدروجين، وجزيء بخار الماء فانها تتكون أيضاً من نرتين هيدروجين مع نرة واحدة من الاوكسجين.



تمثيل اتحاد الغازات بمستوى الجزيئات . الكرات تمثل الذرات في الجزيئات .



Valance

5-1 التكافؤ

إن صيغ المركبات الكيميائية، ليست وليدة الصدفة، وإنما هي معتمدة على كيفية ارتباط الذرات مع بعضها في جزيئات تلك المركبات . وقد وجد انه هناك حد معين لقدرة نرات عنصر معين للاتحاد مع نرات عنصر اخر، وتسمى القدرة الاتحادية للعنصر في مركباته ، أو عدد نرات الهيدروجين التي تتحد مباشرة مع نرة واحدة من العنصر بـ ”التكافؤ“ . تتبادر نرات العناصر الكيميائية في قابليتها للارتباط بعدد محدد من الذرات الاخرى، لذلك ادخل مفهوم تكافؤ العنصر في علم الكيمياء لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر. يمكن تعريف التكافؤ لعنصر ما في الوقت الحالي بأنه :-

”عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لنرة العنصر والتي تستطيع فقدتها أو اكتسابها أو الاشتراك بها اثناء التفاعل الكيميائي“.

فمثلاً : ان تكافؤ الهيدروجين يعتبر واحداً لوجود الكترون واحد في غلافه الخارجي قابل للمشاركة، ويكون تكافؤ الاوكسجين في الماء H_2O يساوي 2 وذلك لوجود 6 الالكترونات في غلافه الخارجي، فذرته تميل لاكتساب الكترونين لاشباع غلافها الخارجي وكذلك يكون الصوديوم احادي التكافؤ لانه يفقد الكترون واحد من غلافه الخارجي، ويكون تكافؤ المغنيسيوم ثنائياً لانه يفقد الالكترونين من غلافه الخارجي، ويكون تكافؤ الكلور احادي لانه يكتسب الكترون واحد لغلافه الخارجي وهكذا .

الكتلة الذرية 6-1

Atomic Mass

تكون الذرات على درجة من الدقة والصغر بحيث يصعب معها تقدير كتلتها الذرية ، ومع ذلك فقد امكن تعين كتلتها بدقة كبيرة، فقد وجد مثلاً كتلة نزرة الهيدروجين تبلغ 1.64×10^{-24} g وقد امكن ايضاً الحصول على كتل الذرات النسبية من تعين كتلة العناصر المتحدة مع عنصر آخر، بشرط ان يكون العدد النسبي للذرات في المركبات معلوماً، فعليه تستخدم الكتلة الذرية للتعبير عن كتلة عنصر ما بالنسبة لكتلة نزرة عنصر اخر اتفق على استخدامه في تحديد الكتل النسبية لكل عناصر الجدول الدوري. وفي عام 1961 عقد في جنيف مؤتمر لاتحاد الدولي للكيمياء الصرفة والتطبيقية (IUPAC) وتم الاتفاق فيه على تعريف الوحدة القياسية للكتل الذرية والتي سميت بوحدة الكتلة الذرية (وكم) (amu) على انها مسلوية لواحد من اثنا عشر جزءاً من كتلة نزرة نظير الكاربون 12 والذي اعتبرت كتلته الذرية مسلوية 12 وحدة بالضبط وعلى هذا الاساس فأن :-

$$\text{وحدة الكتلة الذرية (وكم)} = \frac{\text{كتلة نزرة نظير الكاربون 12}}{12}$$

$$\text{اي ان } 1 \text{ (وكم)} = \frac{1}{12} \text{ من كتلة نزرة نظير الكاربون 12}$$

$$\text{وبما ان كتلة نزرة نظير الكاربون 12} = \frac{12}{\text{عدد افوكادرو}}$$

$$\frac{12}{6.023 \times 10^{23}} = 1 \text{ (amu)} = \frac{1}{12} \times \frac{12}{6.023 \times 10^{23}}$$

لذلك

$$1 \text{ (amu)} = 1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

وهكذا فان الكتل الذرية التي نستعملها اليوم ونجدها في الجدول الدوري، هي ليست كتل فعلية، بل كتل نسبية توضح العلاقة من حيث الكتل الذرية بين الذرات المختلفة. فالكتلة الذرية لنظير الهيدروجين 1 مثلاً هي $\frac{1}{12}$ من الكتلة الذرية لنظير الكاربون 12 اي حوالي 1 amu اما نواة الاوكسجين 16 فلها كتلة تسلوي $\frac{16}{12}$ او $\frac{4}{3}$ من كتلة نظير الكاربون 12 وعندما تقدر الكتلة الذرية بالغرامات تدعى بالكتلة الذرية الغرامية .

فالكتلة الذرية الغرامية للاوكسجين = 16 g وللضة = 107.9 g وان كل كتلة من هذه الكتل تحتوي على عدد افوكادرو من الذرات والذي يساوي 6.023×10^{23} نرة فمثلاً:

1 g من الهيدروجين يحتوي على 6.023×10^{23} نرة هيدروجين

39 g من البوتاسيوم يحتوي على 6.023×10^{23} نرة بوتاسيوم

207 g من الرصاص يحتوي على 6.023×10^{23} نرة رصاص

اما الكتلة المطلقة للنرة فهي كتلة نرة واحدة من العنصر. اي

$$\frac{\text{الكتلة المطلقة لنرة عنصر}}{\text{عدد افوكادرو}} = \frac{\text{الكتلة الذرية الغرامية للعنصر}}{6.023 \times 10^{23}}$$

مثال 3-1 :

احسب الكتلة المطلقة للنرة الاوكسجين علماً بان كتلته الذرية

تساوي 16

الحل :

$$\frac{16}{6.023 \times 10^{23}} = \frac{\text{الكتلة الذرية الغرامية للعنصر}}{\text{عدد افوكادرو}} = 2.656 \times 10^{-23} \text{ g}$$

Equivalent Mass

7-1 الكتلة المكافئة

قادت براسة قانون النسب الكتليلية التي تتحدد بموجبها العناصر المختلفة الى معرفة الكتل المكافئة، حيث كان دالتون أول من حسب هذه الكتل، فأفترض أن كتلة العنصر التي تتحدد مع كتلة نرة واحدة من الهيدروجين هي الكتلة المكافئة للعنصر، وبسبب قصور العنصر الهيدروجين في تكوين مركبات مع اغلب العناصر الأخرى، او لكون اغلب العناصر لا تتحدد مباشرة مع الهيدروجين وانها تتحدد مع الاوكسجين بشكل مباشر، فقد تم اعتماد الاوكسجين أساساً في حساب الكتل المكافئة، واعتبرت كتلته المتحددة مسلوية «ثمانية 8». هذا ولا تقتصر العناصر على الاتحاد مع بعضها بكميات مكافئة فقط، بل هي تحل محل بعضها في مركباتها بكتل مكافئة. وهكذا يكون تعريف الكتلة المكافئة لعنصر ما بأنها :-

«كتلة هذا العنصر التي تتحدد مع ثمانية اجزاء كتليلية من الاوكسجين او تزيح هذه المقادير من مركباتها»

وقد مكن مفهوم الكتلة المكافئة، من صياغة القانون الآتي المسمى بقانون الكتل المكافئة :-

”تحد العناصر مع بعضها ببعض بكميات تتناسب وكتلها المكافئة“

وعندما تقدر الكتلة المكافئة بالغرامات تسمى عندئذ بالمكافئ الغرامي (Gram Equivalent)، فمثلاً المكافئ الغرامي للأوكسجين = g 8 وللكلور = 35.5 g، وللهيدروجين = 1 g وللفضة = g 107.9 وهذا... ويمكن تحديد الكتل المكافئة بدءاً من المعطيات المتعلقة بتحليل المركبات المختلفة، او من استبدال عنصر بأخر، وانه ليس من الضروري لتعيين الكتل المكافئة ان ننطلق من المركبات التي تحوي اوكسجين او مع عنصر آخر ذي كتلة مكافئة معلومة اعتماداً على الآتي:-

$$\frac{\text{كتلة العنصر الاول}}{\text{كتلته المكافئة}} = \frac{\text{كتلة العنصر الثاني}}{\text{كتلته المكافئة}}$$

مثال 1-4 :

تحد g 3.5 من الحديد مع الكبريت لتكون g 5.5 من كبريتيد الحديد (II). إحسب الكتلة المكافئة للحديد علماً بأن الكتلة المكافئة للكبريت = g 16.

الحل :

تمرين (2-1)
عند اختزال g 1.64 من اوكسيد النحاس(II) بالهيدروجين يتكون g 1.31 من النحاس، احسب الكتلة المكافئة للنحاس علماً بأن الكتلة المكافئة للأوكسجين = . 8 g

$$\text{كتلة الكبريت} = 5.5 - 3.5 = 2 \text{ g}$$

$$\frac{\text{كتلة العنصر الاول}}{\text{كتلته المكافئة}} = \frac{\text{كتلة العنصر الثاني}}{\text{كتلته المكافئة}}$$

$$\frac{2}{16} = \frac{3.5}{\text{الكتلة المكافئة للحديد}}$$

$$\text{الكتلة المكافئة للحديد} = 28 \text{ g}$$

8-1 العلاقة بين الكتلة الذرية والكتلة المكافئة والتكافؤ

لما كان مقياس الكتل الذرية هو اعتبار نرة الاوكسجين = 16 وحدة، ومقياس الكتل المكافئة هو اعتبار الاوكسجين = 8 وحدة، لذلك نجمت علاقة رياضية بين الكتلة الذرية والكتلة المكافئة، وبناءً على ذلك لا يجاد الكتلة المكافئة لعنصر ما نقسم الكتلة الذرية للعنصر على عدد نرات الهيدروجين التي تستطيع ان

تتحدد بها او ان تحل محلها، فالقاسم المشترك في هذه الحالة هو تكافؤ العنصر او قيمته الاتحادية فينتج من ذلك ان الكتلة المكافئة للعنصر تساوي كتلته الذرية مقسوماً على تكافؤه .

$$\text{الكتلة المكافئة للعنصر} = \frac{\text{الكتلة الذرية للعنصر}}{\text{تكافؤ العنصر}}$$

مثال 5-1 :

ما هو تكافؤ الالمنيوم اذا علمت ان كتلته الذرية = 27 وكتلته المكافئة = 9 ؟

الحل :

$$\text{تكافؤ الالمنيوم} = \frac{27}{9} = \frac{\text{الكتلة الذرية للالمنيوم}}{\text{كتلته المكافئة}}$$

تمرين (3-1)

عنصر كتلته الذرية = 55.85 و تكافئه = 3 ما هي كتلته المكافئة ؟

Density of gas

كثافة الغاز 9-1

يمكن تعريف الكثافة بالعلاقة التالية:

$$\rho(\text{kg/m}^3) = \frac{\text{المass (kg)}}{\text{الحجم (m}^3\text{)}} = \frac{\text{الكتلة (كم)}}{\text{الحجم (م}^3\text{)}}$$

ان وحدة الكثافة يمكن ان تكون (g/cm³) ، (غم \ سم³) او (g/mL) للمواد الصلبة والسائلة اما بالنسبة للغازات فان كتلة 1 مليلتر تكون صغيرة جداً يصعب التعامل بها عملياً، فلذلك قد اتخاذ اللتر «L» كوحدة حجم لقياس كثافة الغاز. وان حجوم الغازات تتاثر تأثراً كبيراً بالضغط ودرجة الحرارة، فعليه يجب ان تحدد الظروف التي تقامس بها كثافة الغازات، وتدعى الظروف التي يقامس عنها الغاز في درجة حرارة صفر درجة سيليزية (0°C) وضغط 1 جو (1 atm) بالظروف القياسية . (Standard Temperature and Pressure) (STP)

تمرين (4-1)
اذا كانت كتلة غاز = 0.4 g وتشغل حجماً مقداره ربع لتر عند STP ما هي كثافته؟

اذا علمت ان كثافة غاز ماتسلوي L/g 0.7 ويشغل حجماً مقداره 490 cm³ عند STP ما هي كتلة هذا الغاز ؟

الحل :

نحو وحدة الحجم cm³ الى وحدة L

$$V(L) = \frac{1}{490 \text{ cm}^3} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} = 0.490 \text{ L}$$

ولحساب كتلة الغاز نستخدم العلاقة :

$$m(g) = \rho(g/L) \times V(L)$$

$$m(g) = 0.7(g/L) \times 0.490(L) = 0.343 \text{ g}$$

Mole Concept

مفهوم المول 10-1

تتم التفاعلات الكيميائية بين عدد كبير من الجسيمات وقد تكون هذه الجسيمات على هيئة نرات او جزيئات او ايونات ولكل من هذه الجسيمات كتلتها النسبية الخاصة بها، ولكن لا يوجد تناسب عام بين كميات كل مادة وكتلتها . فمثلاً لو سئل طالب ان يقارن بين 1g من غاز H₂ و 1g من غاز N₂ و 1g من غاز O₂ من حيث ماتحتويه من عدد جزيئات لتعذر عليه ذلك بسبب بسيط لأن الكتل الجزيئية لهذه العناصر تختلف بعضها عن بعض فالكتلة الجزيئية لغاز الهيدروجين 2 والنتروجين 28 وللأوكسجين 32 فلو قسمت كتلة 1g لكل عنصر على كتلته الجزيئية .

$$0.031 = \frac{1}{32} : O_2 \quad 0.036 = \frac{1}{28} : N_2 \quad 0.5 = \frac{1}{2} : H_2$$

لحصلنا على قيم يمكن استخدامها للمقارنة . لذلك ومنذ سنوات خلت ظهرت الحاجة الى وحدات اساسية مستقلة لتعبر عن كمية المادة وقد وجدت لها قبولاً عاماً وهذه الوحدة هي المول (mole) ويرمز له بالرمز (n) وهو من الوحدات الاساسية في النظام الدولي للوحدات ويعرف المول بأنه كمية المادة التي تحتوي على نفس العدد من الجسيمات (جزيئات او نرات او ايونات) الذي يحتويه 12g من نظير الكاربون 12 (¹²C) (حيث يستخدم هذا النظير ايضاً كمقاييس لحساب الكتل الذرية كما تقدم) وهذا العدد من الجسيمات يسمى بعدد افوكادرو (Avogadro's Number) ويساوي 6.023×10^{23} ويرمز له بالرمز (N_A) ويجب التاكيد على ان المول هو الوحدة الفعلية لكمية المادة وهو غير الكتلة .

يعتبر مفهوم المول من اهم المفاهيم الاساسية في الكيمياء العامة والذي ادى تبنيه من قبل العلماء الى توحيد نظريتهم الى الكثير من القضايا المهمة في علم الكيمياء. ويمكن ان يطبق مفهوم المول على الذرات او الجزيئات او الايونات او الالكترونات ولذلك فمن الضرورة دائمًا تحديد نوع الجسيمات التي نتعامل معها مثلاً

كتلة مول واحد من نترات نظير الكاربون 12 هي g 12

كتلة مول واحد من نترات الفضة هي g 107.868

كتلة مول واحد من جزيئات H_2 هي g 2

كتلة مول واحد من ايونات SO_4^{2-} هي g 96

وتحسب عدد المولات n باستخدام العلاقة الاتية :

$$n \text{ (mol)} = \frac{\text{mass (m) (g)}}{\text{Molar mass (M)} (\text{g/mol})}$$

$$\text{عدد المولات (n) (مول)} = \frac{\text{الكتلة (m) (غم)}}{\text{الكتلة المولية (M) (غم \ مول)}}$$

1-10-1 الكتلة المولية Molar Mass

لما كانت الجزيئات هي مجموعة من الذرات اتحدت كيميائياً مع بعضها فان الكتلة النهائية لهذه الجزيئات تعرف من كتل الذرات المكونة لها اي اننا نستخدم الكتل النسبية للمقارنة بين الجزيئات المختلفة من حيث الكتلة اي ان :-

الكتلة المولية للمادة = مجموع الكتل الذرية للذرات المكونة
للمادة في نسب وجودها

وتعرف الكتلة المولية (M) Molar Mass) بأنها كتلة 1 من اي مادة (مثلاً نترات او جزيئات او ايونات) والمكافئة بالضبط الى g 12 للمول الواحد من نظير الكاربون 12(سابقاً كان يطلق على الكتلة المولية بالوزن الجزيئي الغرامي).

مثلاً لو اردنا حساب الكتلة المولية لغاز الميثان CH_4 او بمعنى اخر ما هي كتلة mole 1 من غاز الميثان. ونحن نعرف ان المول الواحد من اي غاز يحتوي على عدد افوكادرو من الجزيئات لذلك يمكن القول انه كيف نحسب كتلة 6.023×10^{23}

جزيء من غاز CH_4 . وبما ان كل جزيء من CH_4 يحتوي على نرة كاربون واحدة واربع نرات هيدروجين اي ان 1 mole من جزيئات CH_4 يحتوي على 1 mole من نرات الكاربون و 4 mole من نرات الهيدروجين لذا يمكن حساب كتلة المول الواحد من CH_4 على الصورة الآتية :

$$\begin{array}{rcl} \text{كتلة مول واحد من C} & = & 12 \times 1 \\ 12 \text{ g} & = & 12 \\ \text{كتلة 4 مول من H} & = & 4 \times 1 \\ 4 \text{ g} & = & 4 \\ \hline \text{كتلة مول واحد من } \text{CH}_4 & = & 16 \text{ g} \end{array}$$

وهكذا الحال عند حساب الكتلة المولية لحامض الكبريتيك

$$\begin{array}{rcl} \text{كتلة 2 مول من H} & = & 2 \times 1 \\ 2 \text{ g} & = & 2 \\ \text{كتلة مول واحد من S} & = & 32 \times 1 \\ 32 \text{ g} & = & 32 \\ \text{كتلة 4 مول من O} & = & 16 \times 4 \\ 64 \text{ g} & = & 64 \\ \hline \text{كتلة مول واحد من } \text{H}_2\text{SO}_4 & = & 98 \text{ g} \end{array}$$

وبما ان 16 g تمثل كتلة 1 mol من غاز الميثان و 98 g تمثل كتلة 1 mol من حامض الكبريتيك يكون من المنطقي ان نسمى هذه الكتل بالكتلة المولية.

يتضح مما سبق ان جميع الحسابات التي تخضع لها الذرات والجزيئات في الكيمياء تنحصر فيما يأتي :

أ - الكتلة الذرية ومن ثم الكتلة المولية

ب - المول

ج - عدد افوكادرو

فالكتلة الذرية او الكتلة المولية معبراً عنها بوحدة الغرام تحتوي على نفس العدد من الذرات او الجزيئات وقد اسماها بعد افوكادرو (N_A) بينما اطلقنا على الكمية المحتوية على هذا العدد من الذرات او الجزيئات او الايونات اسم المول

مول من غاز O_2

يحتوي

6.023×10^{23}

كتلته

32 g

مول ماء

يحتوي

6.023×10^{23}

كتلته

18 g

جزيء اوكسجين

جزيء ماء

مثال 7-1 :

جد الكتلة المولية للمركبات الآتية * :-

أ) كبريتات الصوديوم المائية $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

ب) الجكلون $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_3$


ج) ثنائي أوكسيد الكبريت SO_2

الحل :

$$\begin{aligned} M(\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) &= (2 \times 23) + (1 \times 32) + (4 \times 16) + 7(2 \times 1 + 1 \times 16) \\ &= 268 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

$$M(\text{C}_{10}\text{H}_6\text{O}_3) = (10 \times 12) + (6 \times 1) + (3 \times 16) = 174 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{SO}_2) = (1 \times 32) + (2 \times 16) = 64 \text{ g/mol}$$



● Carbon
● Oxygen
● Hydrogen

مثال 8-1 :

كم عدد المولات الموجودة في

أ) 9.6 g من ثنائي أوكسيد الكبريت SO_2

ب) 85 g من غاز الامونيا NH_3

الحل :

أ) الكتلة المولية لـ SO_2

$$M(\text{SO}_2) = (1 \times 32) + (2 \times 16) = 64 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})} = \frac{9.6 \cancel{(\text{g})}}{64 \cancel{(\text{g/mol})}} = 0.15 \text{ mol SO}_2$$

ب) الكتلة المولية لـ NH_3

$$M(\text{NH}_3) = (1 \times 14) + (3 \times 1) = 17 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})} = \frac{85 \cancel{(\text{g})}}{17 \cancel{(\text{g/mol})}} = 5 \text{ mol NH}_3$$

الجكلون مركب عضوي يستخدم كمبيد للاعشاب ويدخل في صناعة الاحبار ويعتبر صبغة طبيعية .

مثال 9-1 :

احسب الكتلة الموجدة في 0.7 mol من ثنائي أوكسيد المنفنيز

(MnO_2)

الحل :

الكتلة المولية لـ MnO_2

$$M(\text{MnO}_2) = (1 \times 55) + (2 \times 16) = 87 \text{ g/mol}$$

$$m(\text{g}) = n(\text{mol}) \times M(\text{g/mol})$$

$$m(\text{g}) = 0.7 \cancel{(\text{mol})} \times 87 \cancel{(\text{g/mol})} = 60.9 \text{ g MnO}_2$$

تمرين (5-1)
أ - ماهي كتلة النتروجين المحتوية على N_2 من 0.04 mol
ب - ما هو عدد مولات PCl_5 الموجودة في 5.6 g من PCl_5 ?
ج - احسب الكتلة المولية لغاز يحتوي 0.23 mol منه على كتلة . 22.54 g

* يمكن للطلبة الحصول على قيم الكتل الذرية للعناصر من الجدول (3) في نهاية الكتاب عند حل الأمثلة والتمارين والأسئلة .

10-2 تطبيق فكرة المول على المواد

كما أسلفنا ان المول الواحد من الكاربون ذا كتلة بالضبط 12g فالذرة الواحدة من الكاربون كتلتها بالضبط :-

$$= \frac{12 \text{ g}}{\text{عدد افوکادرو من الذرات}} = \frac{12 \text{ g}}{6.023 \times 10^{23}} = 1.995 \times 10^{-23} \text{ g/atom}$$

من الممكن كتابة المعادلة الآتية:

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{عدد الجسيمات (جزيئات او ذرات او ايونات)}}{\text{عدد افوکادرو من الجسيمات}}$$

مثال 10-1 :

احسب

تمرين (6-1)

كم عدد جزيئات ثنائي اوكسيد السليكون SiO_2 الموجودة في حبة رمل كتلتها 1mg على فرض ان حبة الرمل تحتوي على $100\% \text{SiO}_2$ النقى .

أ) عدد مولات 3.01×10^{25} جزء ماء .

ب) عدد الجزيئات في mol 0.02 من ثنائي اوكسيد الكاربون

الحل :

أ) باستخدام القانون

$$\text{عدد المولات} = \frac{3.01 \times 10^{25}}{6.023 \times 10^{23}} = \frac{\text{عدد الجزيئات}}{\text{عدد افوکادرو من الجسيمات}} = 50 \text{ mol H}_2\text{O}$$

ب) من القانون اعلاه

$\text{عدد الجزيئات} = \text{عدد المولات} \times \text{عدد افوکادرو من الجزيئات}$

$$= 0.02 \times 6.023 \times 10^{23} = 1.2 \times 10^{22} \text{ CO}_2$$

مثال 11-1 :

احسب عدد الجزيئات الموجودة في 170g من غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S ؟

الحل :

الكتلة المولية لـ H_2S : $M(\text{H}_2\text{S}) = (2 \times 1) + (1 \times 32) = 34 \text{ g/mol}$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})} = \frac{170 \text{ g}}{34 \text{ g/mol}} = 5 \text{ mol H}_2\text{S}$$

$\text{عدد الجزيئات} = \text{عدد المولات} \times \text{عدد افوکادرو من الجزيئات}$

$$= 5 \times 6.023 \times 10^{23} = 3.01 \times 10^{24} \text{ H}_2\text{S}$$

11-1

النسبة المئوية للعناصر في المركبات

توجد طريقتان لوصف التراكيب الجزيئية للمركبات اولها معرفة عدد الذرات لكل عنصر الداخلة في تركيب المركب وثانيهما معرفة النسبة المئوية بدلالة كتل العناصر الداخلة في هذا التركيب. اي عدد غرامات العنصر في g 100 من المركب، وعليه يمكن إيجاد النسبة المئوية لكل عنصر يدخل في تكوين المركب وكما يأتي:

- أ- إيجاد الكتلة المولية للمركب من صيغته الجزيئية.
- ب- تعين وايجاد كتلة كل عنصر في جزء المركب، اي حاصل ضرب الكتلة الذرية لكل عنصر × عدد ذراته
- ج- استخراج النسبة المئوية للعنصر في المركب حسب العلاقة الآتية :

$$\text{النسبة المئوية (\%)} \text{ للعنصر في المركب} = \frac{\text{الكتلة الذرية للعنصر} \times \text{عدد ذرات العنصر}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100$$

مثال 12-1 :

احسب النسبة المئوية لكل من الكاربون و الهيدروجين والاوكسجين في مركب خلات الايزو بنتيل (C₇H₁₄O₂) (مادة تفرزها حشرة النحل)

الحل :

الكتلة المولية لـ (C₇H₁₄O₂)

$$M(C_7H_{14}O_2) = 7 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 16 = 130 \text{ g/mol}$$


و حسب العلاقة اعلاه يتم حساب النسبة المئوية للعنصر في المركب كالاتي :

$$\%C = \frac{7 \times 12}{130} = \frac{84}{130} \times 100\% = 64.61\%$$

$$\%H = \frac{14 \times 1}{130} = \frac{14}{130} \times 100\% = 10.77\%$$

$$\%O = \frac{2 \times 16}{130} = \frac{32}{130} \times 100\% = 24.62\%$$

ويلاحظ ان مجموع النسب المئوية للعناصر المكونة للمركب تساوي 100 % .



Carbon

Oxygen

Hydrogen

الايزو بنتيل مادة تفرز من حشرة النحل .

مثال 1-13 :

ما النسبة المئوية للعناصر الموجودة في حامض الاوكزاليك $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$? وما النسبة المئوية لماء التبلور في بلورات حامض الاوكزاليك المائي صيغته الجزيئية هي $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ؟

الحل :

الكتلة المولية لـ $(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$

$$M(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = (2 \times 1) + (2 \times 12) + (4 \times 16) = 90 \text{ g/mol}$$

ويمكن حساب النسبة المئوية للعناصر كالتالي :

$$\text{C\%} = \frac{2 \times 12}{90} = \frac{24}{90} \times 100\% = 26.67\%$$

$$\text{H\%} = \frac{2 \times 1}{90} = \frac{2}{90} \times 100\% = 2.22\%$$

$$\text{O\%} = \frac{4 \times 16}{90} = \frac{64}{90} \times 100\% = 71.11\%$$

تمرين (7-1)
احسب النسبة المئوية للعناصر الموجودة في حامض الخليك CH_3COOH .

وبنفس الطريقة الكتلة المولية لحامض الاوكزاليك المائي
 $M(\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 12 + 2 \times 1 + 4 \times 16 + 2(2 \times 1 + 1 \times 16)$
 $= 126 \text{ g/mol}$

النسبة المئوية لماء التبلور :

$$\text{H}_2\text{O\%} = \frac{2 \times 18}{126} \times 100\% = 28.57\%$$

اضافة لما تقدم يمكن ايضا حساب كتلة العنصر في كتلة معينة لا ي مرتب من خلال معرفتنا لنسبة العنصر في اي مركب ، وذلك باستخدام القانون الاتي :

$$\text{كتلة العنصر} = \frac{\text{كتلة نرات العنصر في المركب}}{\text{كتلة المولية للمركب}} \times \text{كتلة النموذج}$$

مثال 1-14 :

احسب كتلة الكالسيوم الموجودة في 20 g من فوسفات الكالسيوم $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ؟

الحل :

الكتلة المولية لـ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

$$M(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = (3 \times 40) + (2 \times 1 \times 31) + (2 \times 4 \times 16) = 310 \text{ g/mol}$$

$$= \frac{(3 \times 40)}{310} \times 20 = 7.74 \text{ g}$$

مثال 15-1 :

10 g من بلورات كبريتات النحاس $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (II). احسب كتلة النحاس الموجودة في النموذج ثم اوجد كتلة الماء (ماء التبلور) في النموذج.

الحل :

الكتلة المولية لـ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

$$\begin{aligned} M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) &= 1 \times 64 + 1 \times 32 + 4 \times 16 + 5(2 \times 1 + 1 \times 16) \\ &= 250 \text{ g/mol} \end{aligned}$$



باستخدام نفس القانون

$$\left(\frac{64}{250} \right) \times 10 = 2.56 \text{ g} = \text{كتلة النحاس}$$


$$\left(\frac{18 \times 5}{250} \right) \times 10 = 3.6 \text{ g} = \text{كتلة الماء في 10 g من النموذج}$$

تمرين (8-1)

احسب كتلة الصوديوم وكتلة الماء الموجودة في 25 g من كلاربونات الصوديوم المائية $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$



البنزين



سكر الكلوكوز

12-1 الصيغ الكيميائية Chemical Formula

يمثل التركيب الكيميائي للمركبات بـ "صيغ" والتي هي مجموعة رموز العناصر المكونة لها مع عدد نرات تلك العناصر في الجزيء الواحد ويمكن التعبير عن تركيب مادة كيميائية معلومة بصيغ مختلفة منها:-

Empirical Formula 12-1-1 الصيغة الوضعية

وهي أبسط صيغة تعطي الحد الأدنى من المعلومات المجردة عن المركب، اذا انها تقرر العدد النسبي لذرات العناصر المشتركة في تركيب المركب. فمثلاً ان الجزيء الواحد من البنزين يتكون من 6 نرات كاربون و 6 نرات هيدروجين فعليه ان القاسم المشترك الاعظم لهذه الارقام هو العدد 6 وبقسمة عدد الذرات على 6 نحصل على الصيغة الوضعية للبنزين هي CH

وكذلك ان الجزيء الواحد من الماء يتكون من نرتين من الهيدروجين مع نرة واحدة من الاوكسجين فتكون الصيغة الوضعية للماء H_2O . وكذلك ان الجزيء الواحد من سكر الكلوكوز يتكون من 6 نرات كاربون و 12 نرة هيدروجين و 6 نرات اوكسجين وعليه ان القاسم المشترك الاعظم لهذه الارقام هو العدد 6 ، وبقسمة عدد الذرات على 6 فان الصيغة الوضعية لسكر الكلوكوز هي CH_2O .

كيفية ايجاد الصيغة الوضعية للمركبات :-

لتعيين وايجاد الصيغة الوضعية للمركبات نتبع الخطوات

الآتية :

أ) تعيين العناصر الداخلة والمشتركة في تركيب المركب بطرق التحليل الكيميائي

ب) تحسب كتل العناصر الداخلة في تركيب كتل معينة من المركب او تحسب بشكل نسبة مئوية.

ج) تقسم كل كتلة او نسبة مئوية لعنصر على كتلته الذرية للحصول على نسب عدد الذرات ، اي ان:

$$\text{نسبة عدد ذرات عنصر} = \frac{\text{كتلة عنصر او النسبة المئوية للعنصر}}{\text{كتلة الذرية}}$$

د) تقسم نسبة عدد ذرات عنصر على اصغر نسبة منها وتقارب الى اقرب عدد صحيح وذلك للحصول على ابسط نسبة لعدد الذرات، اي ان :

$$\text{ابسط نسبة لعدد ذرات عنصر} = \frac{\text{نسبة عدد ذرات كل عنصر}}{\text{اصغر نسبة}}$$

ومن ذلك نستنتج الصيغة الوضعية للمادة

مثال 16-1 :

وجد ان احد الغازات يتكون من 20 % هيدروجين و 80 % كاربون جد الصيغة الوضعية للغاز ؟

الحل :

1) نقسم كل نسبة مئوية للعنصر على كتلته الذرية اي ان نسبة عدد ذرات عنصر = النسبة المئوية للعنصر \ كتلته الذرية

$$\text{نسبة عدد ذرات الهيدروجين} = \frac{20}{1} = 20$$

$$\text{نسبة عدد ذرات الكاربون} = \frac{80}{12}$$

2) نقسم النسب السابقة على اصغرها نسبة ونقرب لاقرب عدد صحيح ابسط نسبة لعدد ذرات عنصر = نسبة عدد ذرات كل عنصر \ اصغر نسبة

$$\text{ابسط نسبة لعدد ذرات الهيدروجين} = \frac{20}{6.60} = 3$$

$$\text{ابسط نسبة لعدد ذرات الكاربون} = \frac{6.60}{6.60} = 1$$

الصيغة الوضعية للغاز هي CH_3

مثال 1-17 :

الكوليستيرول مركب عضوي ، يوجد تقريباً في جميع انسجة الجسم وهو المسؤول عن مرض تصلب الشرايين يتكون من 83.87 % كاربون و 11.99 % هيدروجين و 4.14 % اوكسجين، اوجد الصيغة الوضعية للكوليستيرول؟

الحل :

(1) نقسم كل نسبة مئوية للعنصر على كتلته الذرية اي ان نسبة عدد نرات العنصر = النسبة المئوية للعنصر / كتلته الذرية

$$\text{نسبة عدد نرات الهيدروجين} = \frac{11.99}{1}$$

$$\text{نسبة عدد نرات الكاربون} = \frac{83.87}{12}$$

$$\text{نسبة عدد نرات الاوكسجين} = \frac{4.14}{16}$$

(2) نقسم النسب السابقة على اصغرها نسبة ونقرب لاقرب عدد صحيح ابسط نسبة لعدد نرات العنصر = نسبة عدد نرات كل عنصر / اصغر نسبة

$$\text{ابسط نسبة لعدد نرات الهيدروجين} = \frac{11.99}{0.258}$$

$$\text{ابسط نسبة لعدد نرات الكاربون} = \frac{6.989}{0.258}$$

$$\text{ابسط نسبة لعدد نرات الاوكسجين} = \frac{0.258}{0.258}$$

الصيغة الوضعية للكوليستيرول هي $C_{27}H_{46}O$

تمرين (9-1)

في اغلب الاحيان تستعمل الصيغة البيضاء في عملية الطلاء (الدهان) والتي تحتوي على التيتانيوم والاوكسجين فقط، حيث تتكون من 59.9 % جزءاً بالكتلة تيتانيوم ، اوجد الصيغة الوضعية لهذه الصيغة.

تمرين (10-1)

نفترض انك كيميائي، وقد دعيت لتحديد الصيغة الوضعية لعقار طبي، فعند حرقه وجد ان نتائج الحرق توضح ان هذا العقار الطبيعي يحتوي على 74.27 % كاربون و 7.47 % هيدروجين و 12.99 % نيتروجين و 4.95 % اوكسجين. ما هي ابسط صيغة لهذا العقار الطبيعي؟

Molecular formula

1-12-2 الصيغة الجزيئية

هي الصيغة الكيميائية التي تبين العدد الحقيقي لنرات العناصر المشتركة في تركيب جزيء واحد من المادة. فمثلاً ان الجزيء الواحد من الايثان يتكون من 2 نرة كاربون و 6 نرات هيدروجين ولذلك فان صيغته الجزيئية (C_2H_6) ، وعليه فأن صيغته الجزيئية اكبر من صيغته الوضعية (CH_3) بمرتين. وكذلك ان الصيغة الجزيئية للماء هي (H_2O) بمعنى ان جزيء الماء يتركب من اتحاد نرتين هيدروجين بذرة اوكسجين واحدة، وهي نفسها الصيغة الوضعية للماء (H_2O) وعليه تكون:

$\text{الصيغة الجزيئية} = \text{الصيغة الوضعية} \times \text{وحدات الصيغة الوضعية}$

لتعيين وايجاد الصيغة الجزيئية للمادة نتبع الخطوات الآتية:-

- أ- نستخرج الصيغة الوضعية للمادة كما مر بنا سابقاً.
- ب- نحسب الكتلة المولية للصيغة الوضعية، وذلك من جمع الكتل الذرية لعناصرها.
- ج- إيجاد الكتلة المولية للمادة (الصيغة الجزيئية).
- د- تقسيم الكتلة المولية للصيغة الجزيئية على الكتلة المولية للصيغة الوضعية لنحصل على وحدات الصيغة الوضعية . ووحدات الصيغة الوضعية يمكن الحصول عليها باستخدام العلاقة الآتية :

$$\text{وحدات الصيغة الوضعية} = \frac{\text{الكتلة المولية للصيغة الجزيئية}}{\text{الكتلة المولية للصيغة الوضعية}}$$

هـ- ثم يضرب حاصل القسمة في الصيغة الوضعية للحصول على الصيغة الجزيئية.

مثال 18 :

حامض عضوي كتلته المولية = g/mol 60 ويحتوي على 40% كاربون و 6.7% هيدروجين والباقي اوكسجين فأوجد الصيغة الجزيئية للحامض العضوي؟

الحل :

$$\text{النسبة المئوية للاوكسجين} = \frac{60 - (40 + 6.7)}{100} = 53.3\%$$

1) نقسم كل نسبة مئوية للعنصر على كتلته الذرية اي ان نسبة عدد ذرات العنصر = النسبة المئوية للعنصر / كتلته الذرية

$$\text{نسبة عدد ذرات الهيدروجين} = \frac{6.7}{1}$$

$$\text{نسبة عدد ذرات الكاربون} = \frac{40}{12}$$

$$\text{نسبة عدد ذرات الاوكسجين} = \frac{53.3}{16}$$

2) نقسم النسب السابقة على اصغرها نسبة ونقرب لاقرب عدد صحيح .

أبسط نسبة لعدد نرات العنصر = نسبة عدد نرات كل عنصر \ أصغر نسبة

$$2 = \frac{6.7}{3.3}$$

أبسط نسبة لعدد نرات الهيدروجين =

$$1 = \frac{3.3}{3.3}$$

أبسط نسبة لعدد نرات الكاربون =

$$1 = \frac{3.3}{3.3}$$

الصيغة الوضعية هي CH_2O

الكتلة المولية للصيغة الوضعية CH_2O

$$M(\text{CH}_2\text{O}) = (1 \times 12) + (2 \times 1) + (1 \times 16) = 30 \text{ g/mol}$$

$$\text{وحدات الصيغة الوضعية} = \frac{\text{الكتلة المولية للصيغة الجزيئية}}{\text{الكتلة المولية للصيغة الوضعية}}$$

$$\frac{60}{30} = 2$$

الصيغة الجزيئية = الصيغة الوضعية × وحدات الصيغة الوضعية



الصيغة الجزيئية هي $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

تمرين (11-1)

الكافيين مادة منبهة موجودة في القهوة والشاي والشوكولاتة، تحتوي 49.48% كاربون و 15.15% هيدروجين و 28.87% نتروجين و 16.49% أوكسجين فإذا علمت أن كتلته المولية 194 g/mol فما هي الصيغة الجزيئية للكافيين.



الكافيين

مثال 19-1 :

مركب عضوي صيغته الوضعية $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ وكتلته المولية 88 g/mol. اوجد صيغته الجزيئية ؟

الحل :

الكتلة المولية للصيغة الوضعية $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$

$$M(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}) = (2 \times 12) + (4 \times 1) + (1 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$$

$$\text{وحدات الصيغة الوضعية} = \frac{\text{الكتلة المولية للصيغة الجزيئية}}{\text{الكتلة المولية للصيغة الوضعية}}$$

$$\frac{88}{44} = 2$$

الصيغة الجزيئية = الصيغة الوضعية × وحدات الصيغة الوضعية



الصيغة الجزيئية هي $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$




اسئلة الفصل الاول

ملاحظة: عند الحاجة للكتل الذرية في بعض الاسئلة راجع ذلك في جداول نهاية الكتاب

- 1.1 ما هي فرضيات نظرية دالتون الذرية وما علاقتها بقانون حفظ الكتلة .
- 6.1 عرف المصطلحات الآتية:
التكافؤ، وحدة الكتلة الذرية (وكذ)، الكتلة المكافئة، الكتلة الذرية، فرضية افكاردو.
- 7.1 سخن 1.55 g من الفضة في تيار من غاز الكلور فتكون 2.05 g من كلوريد الفضة. فإذا علمت أن الكتلة المكافئة للكلور 35.5 . احسب الكتلة المكافئة للفضة؟
- 8.1 وضع 0.72 g من الخارصين في محلول خلات الرصاص فترسب الرصاص وبعد غسله وتجفيفه وجد أن كتلته 2.29 g . ما هي الكتلة المكافئة للرصاص علمًا بأن الكتلة المكافئة للخارصين $= 32.5$ ؟
- 9.1 عنصر تكافؤه 2 وكتلته المكافئة 32.7 احسب كتلته الذرية؟
- 10.1 عنصر كتلته الذرية 55.85 وتكافئة 3 ما هي كتلته المكافئة؟
- 11.1 كم عدد المولات الموجودة في كل مما ياتي:
أ- 7 g من بيكلاربونات الصوديوم الهيدروجينية
 NaHCO_3
ب- 10 mg من الحديد
ج- 16 g من ثنائي اوكسيد الكاربون
- 12.1 أ - احسب عدد نرات الفضة وعدد مولات الفضة الموجودة في 5 g من الفضة.
ب - تحتوي قطعة من الماس على $10^{21} \times 5.0$ نرة من الكاربون . ما عدد مولات الكاربون وكتلته بالغرام في قطعة الماس؟
- 2.1 عند تفاعل مزيج من غاز H_2 وغاز الكلور Cl_2 كان الغاز الناتج محتوياً على نسب ثابتة من العناصر المكونة له بغض النظر عن كميات الغازين H_2 و Cl_2 المتفاعلة. كيف تفسر النتائج الحاصلة على ضوء قانون النسب الثابتة .
- 3.1 عينتان من كلوريد الصوديوم تم تفكيكها إلى عناصرها المكونة لها. احتوت العينة الأولى على 4.65 g من الصوديوم و 7.16 g من الكلور. بينما احتوت العينة الثانية 7.45 g من الصوديوم و 11.5 g من الكلور . بين هل هذه النتائج تتطابق مع قانون التراكيب الثابتة .
- 4.1 نسبة كتلة الصوديوم إلى كتلة الفلور في فلوريد الصوديوم 1.21 . احتوت عينة من فلوريد الصوديوم 34.5 g من الصوديوم عند تفككها . ما مقدار الفلور (بالغرامات) الذي ستحتويه العينة ؟
- 5.1 عينتان من رابع كلوريد الكاربون تتفكك لعناصرها المكونة منها . احتوت العينة الأولى 32.4 g من الكاربون و 373 g من الكلور . بينما احتوت العينة الأخرى 12.3 g من الكاربون و 112 g من الكلور هل تتوافق ام لا هذه النتائج مع قانون التراكيب الثابتة .

- 13.1** احسب الكميات فيما ياتي:
- أ - كتلة 3.8×10^{20} جزيء من NO_2 ?
 ب - عدد مولات من ذرات الكلور الموجودة في $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ g 0.0425 .
- 14.1** احسب الكتلة المولية للمركبات الاتية
- أ - NaClO_3
 ب - $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
 ج - $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$
 د - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
 هـ - $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$
- 15.1** احسب النسب المئوية للعناصر المكونة للمركبات الاتية:
- أ - $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
 ب - CH_2FCF_3
 ج - Na_2HPO_4
- 16.1** احسب النسبة المئوية للمغنيسيوم و ماء التميؤ في كبريتات المغنيسيوم المائية $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- 17.1** نموذج من اليوريا يحتوي على N 1.121 g و O 0.640 g و H 0.161 g و C 0.4808 g اوجد الصيغة الوضعية لليوريا؟
- 18.1** مركب يحتوي على كاربون وهيدروجين ونتروجين عند حرق 35 mg منه نتج 33.5 mg CO_2 و 41.1 mg H_2O . اوجد الصيغة الوضعية لهذا المركب؟
- 19.1** لو طلب اليك ايجاد الصيغة الوضعية والجزئية لمسحوق ابيض يتكون من 31.9% كتلة بوتاسيوم ، 39.2% كتلة اوكسجين و 28.9% كتلة كلور فكيف تجد هذه الصيغ اذا علمت ان الكتلة المولية لصيغته الجزيئية تسلوي 122.5 g/mol .
- 20.1** اوجد الصيغة الجزيئية لمركب يتكون من 24.27% كتلة كARBون و 4.07% كتلة هيدروجين و 71.65% كتلة كلور علما ان الكتلة المولية للمركب = 99 g/mol .
- 21.1** مركب يحتوي على 52.2% كاربون و 13.1% هيدروجين والباقي اوكسجين ما هي الصيغة الجزيئية لهذا المركب اذا علمت ان كتلته المولية تسلوي 46 g/mol .
- 22.1** احسب
- أ - عدد مولات الاوكسجين في 7.2 moles من H_2SO_4 .
 ب - عدد الذرات في عينة من الخارصين كتلتها 48.3 g .
 ج - كتلة الالمنيوم بالغرام في 6.73 moles من الالمنيوم .
 د - عدد غرامات Fe الموجودة في 79.2 g من Fe_2O_3 .

Gases



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

- يتعرف بصورة دقيقة عن الحالة الغازية وما تتصف به.
- يدرك العوامل المؤثرة في الحالة الغازية.
- يفهم القوانين المتحكمه في الغازات.
- يفسر خاصية الانتشار بين الغازات.
- يميز بين الغاز المثالي والغاز غير المثالي (ال حقيقي).
- يبين تأثير الضغط على بخار السائل ودرجة الغليان.




مقدمة 1-2

نحن نعيش في اسفل طبقة من الغلاف الجوي والتي تدعى طبقة تروبوسفير اذ يتكون حجمها من 78% من غاز N_2 و 21% من غاز O_2 و 1% من غازات مختلفة تقريباً، يشكل غاز CO_2 النسبة العظمى فيها. بالإضافة الى ذلك يوجد العديد من المواد في الحالة الغازية تحت ظروف (ضغط 1 atm ودرجة حرارة 25°C) ندرج قسماً من هذه المواد ورموزها الكيميائي في الجدول (1-2) :

الجدول 2 - 1 بعض المواد الغازية في الظروف الاعتيادية

المركب	الصيغة الكيميائية	العنصر	الرمز الكيميائي
فلوريد الهيدروجين	HF	هيدروجين	H_2
كلوريد الهيدروجين	HCl	نتروجين	N_2
بروميد الهيدروجين	HBr	أوكسجين	O_2
يوديد الهيدروجين	HI	فلور	F_2
احادي أوكسيد الكاربون	CO	كلور	Cl_2
ثنائي أوكسيد الكاربون	CO_2	نيون	Ne
امونيا	NH_3	اركون	Ar
احادي اوكسيد النتروجين	NO	كوبتون	Kr
ثنائي اوكسيد النتروجين	NO_2	زينون	Xe
اوكسيد النتروز	N_2O	رادون	Rn
ثنائي اوكسيد الكبريت	SO_2		
كبريتيد الهيدروجين	H_2S		

ان الحالة الغازية كانت اخر حالة من حالات المادة التي توجد في الظروف الاعتيادية امكن التعرف اليها تاريخياً، الا انها في الواقع هي الأبسط والأفضل تفهماً لأن اوضاع تعريف للجزئيات هو عندما تكون المادة في الحالة الغازية وأن كثيراً مما نفهمه بخصوص الجزيئات يكون تماماً فقط في حالة الغازات. تشتمل الجزيئات الغازية في الظروف القياسية فقط 0.1% من الحيز الذي تتحله أما الباقى فيكون فراغ لذلك فإن كل جزء من الغاز يتصرف بشكل مستقل تقريباً، ونتيجة لذلك يمكن للغاز ان يُضغط ويصغر حجمه بشكل كبير وبالضغط والتبريد يُسال الغاز فيصبح حجمه صغيراً مقارنة بحجمه وهو غاز. اذن تتأثر حجوم الغازات كثيراً بالضغط وبدرجة الحرارة وبعوامل اخرى.



الغازات التي يتالف منها الغلاف الجوي تسلط ضغطاً قدره 1atm على المتر المربع .



هل تعلم

ان متسلقي الجبال العالية يحملون على ظهورهم قناني تحتوي على الهواء لتعويض الاوكسجين الذي تكون نسبة قليلة في تلك الاماكن .

هل تعلم

توجد حالة رابعة للمادة يمكن ان تتواجد فيها ولكن في ظروف معينة تدعى البلازما .

الحجم Volume 2 - 2

يمثل حجم المادة مقدار الحيز الذي تشغله تلك المادة، وان حجم الغاز هو نفسه حجم الإناء الذي يوجد فيه الغاز. يرمز له بالحرف V ويقاس بوحدات اللتر (L) أو مليلتر (mL) أو السنتيمتر المكعب (cm^3). ولتحويل وحدات الحجم يكون :

$$1 L = 1000 cm^3$$

$$1 L = 1000 mL$$

$$1 cm^3 = 1 mL$$

مثال 2 - 1 :

عينة من غاز NO_2 حجمها $800 cm^3$ ما هو حجمها باللتر ؟

الحل :

$$V(L) = V cm^3 \times \frac{1L}{1000 cm^3} = 800 cm^3 \times \frac{1L}{1000 cm^3} = 0.8 L NO_2$$

تمرين (1-2)

عينة من غاز O_2 حجمها $0.125 L$ ما هو حجمها بالـ mL .

هل تعلم

اعلى درجة حرارة سجلت للهواء كانت $+85^\circ C$ في المكسيك واقل درجة حرارة سجلت للهواء كانت $-88^\circ C$ في القطب الجنوبي .

درجة الحرارة Temperature 3 - 2

ان هناك وحدتان للتعبير عن درجة الحرارة هي الدرجة السيليزية $^\circ C$ ويرمز لها t ودرجة كلفن K ويرمز لها T .

ولتحويل الدرجة السيليزية الى درجة كلفن نستخدم العلاقة

الآتية :

$$T(K) = t(^\circ C) + 273$$

مثال 2 - 2 :

اناء يحتوي على ماء درجة حرارته $80^\circ C$ واناء اخر يحتوي على ماء ايضاً درجة حرارته $-13^\circ C$ - فما هي درجة حرارته في الحالتين بدرجات كلفن .

$$T(K) = t(^\circ C) + 273$$

الحل : اولاً :

$$T(K) = 80 + 273 = 353 K$$

ثانياً :

$$T(K) = t(^\circ C) + 273$$

$$T(K) = (-13) + 273 = 260 K$$

تمرين (2-2)

حول الدرجات الآتية من سيليزية الى كلفن $(-100^\circ C, 1^\circ C, 127^\circ C)$

Pressure الضغط 4 - 2

يعرف الضغط كمياً بأنه (القوة F) المسلطة على وحدة المساحة (A). ويرمز له (P)، ويقاس الضغط الجوي بمقاييس البارومتر بينما تقيس ضغوط الغازات بمقاييس المانومتر.

$$P = \frac{F (\text{Force})}{A (\text{Area})} = \frac{\text{القوة}}{\text{المساحة}} = \frac{\text{الضغط}}{\text{المساحة}}$$

$$P = \frac{1\text{N} (\text{نيوتن})}{\text{متر}^2 (\text{متر}^2)} = \text{Pa} (\text{Pascal})$$

اما الوحدات الاساسية للضغط فهي الباسكال (Pa) و الجو (atm) و التور (Torr). والعلاقة بين وحدات الضغط هي :

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr}$$

$$1 \text{ Torr} = 1 \text{ mmHg}$$

هل تعلم

تنص قوانين اتحاد كرة القدم بأن هناك قواعد أساسية لكرة القدم المستخدمة بأن تكون كتلة الكرة كحد أعلى 450 g وكحد أقل 410 g . أما ضغط الهواء المحصور في داخلها فيجب أن لا يكون أقل من 0.6 atm أو أعلى من 1.1 atm والسبب في ذلك لأن الكرة المملوءة سوف تكون أسرع مما لو كانت غير مملوءة كما أن الضغط المسموح به داخلها إذا كان أعلى من ذلك فأن الكرة سوف تنفجر عندما تضرب .

مثال 2 - 3 :

. حول ضغط غاز مقداره Torr 688 إلى وحدات atm

الحل :

$$P (\text{atm}) = P \text{ Torr} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ Torr}} = 688 \text{ Torr} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ Torr}}$$

$$P \text{ atm} = 0.905 \text{ atm}$$

تمرين (2-3)

حول ضغط غاز مقداره 1.5 atm إلى وحدات Torr .

هل تعلم

توضح الصورة المقابلة أنه في تجربة الاصطدام في السيارات على قابلية الغازات على الانضغاط حيث تقوم الوسادة الهوائية بحماية الشخص عند الاصطدام حيث ان ضغط الغاز داخل الوسادة يمتص قوة الاصطدام (ملاحظة هذه الوسادة تكون أكثر فعالية عند استخدام حزام الامان)




هل تعلم

ان الضغط المسلط علينا هو من قبل الهواء المحيط بالارض ويبلغ سمه 500 ميل وفي الواقع نحن نعيش في قاع محيط الغلاف الجوي .

2 - 5 - 1 علاقة الحجم والضغط (قانون بويل)

لقد قام العالم البريطاني (روبرت بويل) بأول تجربة لأختبار علاقه الحجم والضغط للغازات وقد استخدم انبوب على شكل حرف L مسند من جهة الساق القصيرة فيه بعض من الغاز المحصور وقام باضافة الزئبق من الطرف الاطول فبدأ الزئبق بالضغط على الغاز ليصبح حجم الغاز ذا حجم معين وعندما ضاعف كمية الزئبق (اي ضاعف الضغط) قل حجم الهواء المحصور الى النصف كما موضح في الشكل(2 - 1) :



- الشكل (1-2)
 أ - عند اضافة كمية من الزئبق لاحظ حجم الهواء المحصور .
 ب - عند مضاعفة كمية الزئبق نلاحظ تقلص حجم الهواء المحصور الى النصف .

لقد لاحظ بويل ان حجم الهواء يقل كلما زاد الضغط المسلط عليه، (عند تثبيت درجة الحرارة وكمية الغاز) ولهذا وضع بويل قانونه الشهير الذي ينص (**يتناصف حجم الغاز عكسياً مع الضغط المسلط عليه عند ثبوت درجة الحرارة وكمية الغاز**) .

وقد وضع بويل العلاقة بشكل رياضي حيث :

$$V \propto \frac{1}{P}$$

$$V = k \cdot \frac{1}{P}$$

تمرين (4-2)

منطاد جوي يحتوي على غاز يشغل حجماً قدره 50L تحت ضغط 1 atm . ما حجمه عندما يرتفع في الجو ويعرض لضغط اقل قدره 0.9 atm ؟

حيث k (ثابت التناصف)

$$PV = k$$

اي ان حاصل الضرب للضغط والحجم بآية حالة يساوي كمية ثابتة . وعندأخذ عينة من غاز ذات حجم V_1 تحت ضغط P_1 عند درجة حرارة ثابتة وقمنا بتغيير ظروف هذا الغاز ليصبح

ان عملية التنفس عند الانسان تجري وفق قانون بوييل . عندما يتحرك الحجاب الحاجز الى الاسفل يؤدي الى زيادة حجم الرئة وانخفاض الضغط داخلاها وهذا بدوره يؤدي الى دخول الهواء الى الرئة وتتم عملية الشهيق.

شهيق



الحجاب الحاجز

اما عندما يرتفع الحجاب الحاجز الى الاعلى يؤدي الى نقصان حجم الرئة وزيادة الضغط داخلاها مما يؤدي الى خروج الهواء من الرئة وتتم عملية الزفير فـ

غير



ارتفاع الحجاب الحاجز

حجم V_2 وضغط P_2 مع الاحتفاظ بدرجة الحرارة ثابتة T_1 فـ انه طبقا لقانون بويـل يـصح ان نـقول

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (\text{عند ثبوت الحرارة وكمية الغاز})$$

مثال 2 - 4 :

ضغط غاز في صفيحة معطر جو يساوي 3 atm وحجمه نصف لتر ما حجمه عندما يصبح الضغط المسلط عليه 4 atm .

الحل :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad P_1, V_1, P_2 \longrightarrow V_2$$

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{(3 \text{ atm}) \left(\frac{1}{2} \text{ L}\right)}{(4 \text{ atm})} = 0.375 \text{ L}$$

مثال 2 - 5 :


أ - غاز موضوع في اسطوانة حجمها L 1 بضغط atm 1 وضع عليه ثقل مما ادى الى تقلص حجمه الى L 0.5 احسب ضغطه الجديد على افتراض ثبوت درجة الحرارة .

ب - يسلط الضغط الجوي atm 1 على الغواص عند سطح البحر اي بعمق m 0. ما الضغط الذي سيسلط عليه عند عمق m 20 على افتراض ان كل m 10 تسلط ضغطاً اضافياً مقداره 1 atm بسبب وزن الهواء المحيط به ، على افتراض ثبوت درجة الحرارة .

الحل :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad P_1, V_1, V_2 \longrightarrow P_2 \quad \text{أ -}$$

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{(1 \text{ atm}) (1 \text{ L})}{(0.5 \text{ L})} = 2 \text{ atm}$$




ب - طالما ان كل m 10 تسلط ضغطاً مقداره 1 atm على الغواص لـذا سيكون الضغط المسلط عليه على عمق m 20 هو 2. وعليـه سـيـصـبـحـ الضـغـطـ المـسـلـطـ عليه عند هـذـاـ العـمـقـ 3 atm بـسـبـبـ وجـوبـ اـضـافـةـ الضـغـطـ الجـوـيـ عـلـيـهـ الـبـالـغـ 1 atm .



2 - 5 - 2 علاقـة الحـجم و درـجة الحرـارة (قـانون شـارـل)

هل تعلم
منفـاخ الدـراجـة تـطـبـيقـ على
قـانـون شـارـل، نـشـعـر دـائـماً
بـسـخـونـة منـفـاخ الدـraigـة عـنـد
استـعـمالـه وـذـكـ لـانـ جـزيـئـات
الـهـوـاء فـي دـاخـلـه تـرـغـمـ على
الـتـرـاـصـ فيـ حـيـزـ أـقـلـ فـتـزـدـادـ
سـرـعـةـ اـرـتـطـامـها بـجـدرـانـ المـنـفـاخـ
فـيـ سـخـنـ.

انـ جـمـيعـ الـفـلـازـاتـ تـتـمـدـدـ فيـ الـحـجـمـ عـنـدـماـ تـرـفـعـ درـجـةـ حرـارـتهاـ،ـ
وـيمـكـنـ عمـليـاـ قـيـاسـ الـزـيـادـةـ فيـ الـحـجـمـ بـزـيـادـةـ درـجـةـ الحرـارـةـ
وـذـكـ بـحـبـسـ كـتـلـةـ ثـابـتـةـ لـفـازـ فـيـ اـسـطـواـنـةـ مـزـودـةـ بـمـكـبـسـ كـمـاـ
هـوـ مـبـيـنـ بـالـشـكـلـ (2ـ 2ـ).



الشكل(2-2)

- (أ) بالتسخين يزداد حجم الغاز
فيندفع المكبـسـ نحوـ الـأـعـلـىـ .
(ب) بالتبريد يقل حجم الغاز
فيـندـعـ المـكـبـسـ نحوـ الـأـسـفـلـ .

حيـثـ انـ الـكـتـلـةـ فـوـقـ قـمـةـ الـمـكـبـسـ ثـابـتـةـ فـأـنـ الـعـيـنةـ مـنـ الـغـازـ
تـبـقـىـ عـنـدـ ضـغـطـ ثـابـتـ وـيـلـاحـظـ أـنـهـ كـلـماـ سـخـنـ الـغـازـ فـانـ الـمـكـبـسـ
يـتـحـرـكـ لـلـخـارـجـ وـيـزـدـادـ الـحـجـمـ.ـ وـيمـكـنـ أـنـ يـصـاغـ قـانـونـ شـارـلـ
كـمـاـ يـلـيـ (يتـنـاسـبـ حـجـمـ كـمـيـةـ مـحـبـودـةـ مـنـ الـغـازـ تـنـاسـبـاـ طـرـديـاـ
مـعـ درـجـةـ الحرـارـةـ المـقـاسـةـ بـالـكـلـفـنـ عـنـدـ ثـبـوتـ الضـغـطـ وـكـمـيـةـ
الـغـازـ).ـ وـيمـكـنـ التـعـبـيرـ رـيـاضـيـاـ.

$$V \propto T$$
$$V = k \times T$$

$$\frac{V}{T} = k \quad \text{حيـثـ kـ (ـ ثـابـتـ التـنـاسـبـ)}$$

وـيـ كـثـيرـ مـنـ الـاحـيـانـ نـتـعـاملـ مـعـ حـجـمـيـنـ V_1 وـ V_2 لـ كـمـيـةـ
مـعـيـنةـ مـنـ غـازـ عـنـدـ درـجـتـيـ حرـارـةـ مـخـتـلـفـتـيـنـ T_1 وـ T_2 عـلـىـ التـوـالـيـ
لـذـكـ يـمـكـنـ اـسـتـخـدـامـ الـعـلـاقـةـ الـعـامـةـ لـلـحـجـمـ وـدـرـجـةـ الحرـارـةـ عـنـدـ
ثـبـوتـ الضـغـطـ كـالـآـتـيـ:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{(عـنـدـ ثـبـوتـ الضـغـطـ وـكـمـيـةـ الـغـازـ)}$$

هل تعلم

يـنـقـبـضـ الـبـالـوـنـ الـمـمـلـوـءـ بـالـهـوـاءـ
عـنـدـ وـضـعـهـ فـيـ وـعـاءـ يـحـتـويـ
عـلـىـ مـاءـ مـثـلـاجـ فـدـرـجـةـ الحرـارـةـ
الـمـنـخـفـضـةـ جـداـ تـبـطـيـ سـرـعـةـ
جـزـيـئـاتـ الـهـوـاءـ دـاخـلـ الـبـالـوـنـ
فـيـقـلـ تـدـافـعـهـاـ وـأـرـتـطـامـهـاـ بـجـدرـانـ
الـبـالـوـنـ فـيـنـكـمـشـ .

مثال 2 - 6 :

ملئ بالون (نفاخة) بالهواء حتى اصبح حجمه L 4 بدرجة حرارة 27°C ما حجم البالون بعد وضعه في المجمدة علماً بان درجة حرارتها 0°C (الضغط ثابت في الحالتين)؟

الحل :

اولاً : نحول درجتي الحرارة من $^{\circ}\text{C}$ الى K بالقانون الاتي :

$$T (\text{K}) = t ^{\circ}\text{C} + 273$$

$$T_1 (\text{K}) = 27 + 273 = 300 \text{ K} \quad V_1 = 4 \text{ L}$$

$$T_2 (\text{K}) = 0 + 273 = 273 \text{ K} \quad V_2 = ? \text{ L}$$

ثانياً : نجد الحجم بعد تغير درجة الحرارة باستخدام قانون شارل

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad T_1, V_1, T_2 \longrightarrow V_2$$


$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{(4 \text{ L})(273 \text{ K})}{(300 \text{ K})}$$

$$V_2 = 3.64 \text{ L}$$


تمرين (5-2)

غاز CO_2 في بالون حجمه 1L في درجة حرارة 27°C ما حجم البالون عندما يوضع في حوض مبرد بدرجة حرارة -3°C ؟

3 - 5 - 2 علاقة الضغط ودرجة الحرارة (قانون غي لوساك)



عندما يسخن غاز بحجم ثابت يزداد الضغط .



وعندما يبرد غاز بحجم ثابت يقل الضغط .

عند اخذ كمية ثابتة من كتلة وحجم غاز فأن ضغط الغاز يتناوب طرديا مع درجة الحرارة بالكلفن .

$$P \propto T$$

$$P = k \times T$$

$$\frac{P}{T} = k \quad \text{حيث } k \text{ ثابت التناوب}$$

هل تعلم

الفرق في الضغط بين داخل علبة السبري والهواء الخارجي هو اساس عمل مثل هذه العلب .

الضغط على الزر



وعند استخدام غاز بدرجتي حرارة مختلفتين T_1 و T_2 عند ضغطين مختلفين P_1 و P_2 على التوالي يمكن استخدام العلاقة السابقة كالتالي :

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (\text{عند ثبوت الحجم وكمية الغاز})$$

هل تعلم

يدور سائل التبريد في أنابيب الثلاجة باستمرار وعندما يعبر فتحة ضيقة يتمدد بسرعة متحولاً إلى غاز وفي تحوله إلى الغاز يمتص الحرارة اللازمة من محیطه (أي من داخل الثلاجة) فيبرده ثم يسري الغاز إلى الضاغط الذي يحوله ثانية إلى سائل وعملية التسخين بالضغط هذه تطلق حرارة كافية لأن تشعر بها في خلفية الثلاجة.

ويمكن أن يعبر عن قانون غي لوساك كما يلي: (يتغير ضغط كتلة معينة من الغاز تغيراً طردياً مع درجة حرارته المقابلة بالكلفن اذا كانت كميته وحجمه ثابتان) .

: مثال 2 - 7

لماذا ينصح دائماً بعدم رمي علب معطرات الجو أو الجسم في النار وعلى فرض بان لديك علبة من معطر جو تحتوي على غاز تحت ضغط 3 atm ودرجة حرارة 17°C ما يحصل لها عندما تتعرض إلى حرارة قدرها 187°C ؟

الحل :

انه عندما ترتفع درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي يزداد عدد اصطداماتها بجدران العلبة مما يؤدي إلى زيادة الضغط المسلط من قبل الغاز على جدرانها وبالتالي قد تؤدي إلى انفجارها وتشظيها .

تحول درجة °C إلى K

$$T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$$

$$T_1(K) = 17 + 273 = 290 \text{ K} \quad P_1 = 3 \text{ atm}$$

$$T_2(K) = 187 + 273 = 460 \text{ K} \quad P_2 = ? \text{ atm}$$

نجد الضغط P_2 بعد تغير درجة الحرارة باستخدام قانون غي لوساك .

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad T_1, P_1, T_2 \longrightarrow P_2$$

$$P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{(3 \text{ atm})(460 \text{ K})}{(290 \text{ K})}$$

$$P_2 = 4.75 \text{ atm}$$

هل تعلم

يتوجب فحص ضغط الهواء في اطارات السيارة بانتظام لدوعي السلامة وكذلك لمنع التآكل غير المتساوي لسطح الاطارات الخارجي.

القانون الموحد للغازات The Combined Gas - law 6 - 2

کمار اینا ینص قانون بویل ریاضیاً علی انه

و كذلك قانون شارل ينص على $\frac{V}{T} = k$

من هذه القوانين الثلاثة يمكن ان يصاغ قانون موحد هو

$$\frac{PV}{T} = k$$

(حيث k = كمية ثابتة)

وفي حالة تغير ظروف الغاز (T_1 و V_1 و P_1) الى حالته الثانية (T_2 و V_2 و P_2) مع بقاء كميته ثابتة يمكن ان نكتب :

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

يطلق على المعادلة اعلاه بمعادلة الحالة (Equation of state) وهذا القانون لكمية محددة من الغاز .

مثال 2 - 8 :

فقاعة هواء صغيرة حجمها 2.1 mL أرتفعت من قاع بحيرة حيث الضغط 6.4 atm ودرجة حرارة $^{\circ}\text{C} 8$ الى سطح الماء حيث درجة الحرارة $^{\circ}\text{C} 25$ والضغط 1 atm . أحسب حجم الفقاعة على سطح الماء.

الحل:

نحو درجة °C الى K

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

$$T_1(K) = 8 + 273 = 281K$$

$$T_2(K) = 25 + 273 = 298\text{ K}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$V_2 = \frac{V_1 P_1 T_2}{P_2 T_1}$$

$$V_2 = \frac{2.1 \text{ mL} \times 6.4 \text{ atm} \times 298 \text{ K}}{1 \text{ atm} \times 281 \text{ K}}$$

حجم الفقاعة على سطح الماء = 14.25 mL

هل تعلم

فما ينفع الغاز التي ينفثها
الغواص تكبر تدريجيا كلما
ارتفعت نحو السطح فهي
صغريرة الحجم تحت ضغط
السائل الاكثر في العمق وكلما
ارتفعت نحو السطح يقل السائل
الضاغط عليها فيزداد حجمه .



(7-2) تمر بـ

عينة من غاز CO_2 حجمه L وتحت ضغط 1.2 atm وبدرجة حرارة 66°C تعرض الى تغير فاصبح حجمه L 1.7 عند درجة حرارة 42°C احسب ضغطه علماً بان عدد مولاته لم تتغير.

علاقة كمية الغاز والحجم (قانون افوكادرو)

7 - 2

وجد العالم الايطالي افوكادرو انه عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة فان حجم الغاز يتتناسب طرديا مع كميته . وكما عرفت من الفصل الاول (الفقرة 1 - 14) ان كمية الغاز تقادس بعدد مولاته (n) ولذلك حسب ما وجده افوكادور ان :

هل تعلم

عندما النجاري لو ساك اكتشفه المتضمن علاقات الحجم بالتفاعلات الكيميائية لم يقبل الكيميائيون النظرية الذرية ولم يكونوا يعرفون التركيب الصحيح للمواد لذلك لم يكن في استطاعتهم كتابة المعادلات الكيميائية وقد سمحت بدراسات كل من غي لو ساك وافوكادرو بكتابه المعادلات الكيميائية كما نكتبها حتى اليوم .

$$V \propto n$$

$$V = k n$$

حيث k ثابت التناسب


وعند استخدام غاز بكميتيين مختلفتين n_1 و n_2 تشغلان حجمين مختلفين V_1 و V_2 فانه يمكن استخدام العلاقة الآتية:

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad (\text{عند ثبوت درجة الحرارة والضغط})$$

وعليه يمكن صياغة قانون افوكادرو كالتالي :

(تحتوي الحجوم المتسلویة من الغازات المختلفة على عدد متسلوي من المولات عند ثبوت درجة الحرارة والضغط) .

ويمكن ملاحظة ذلك في الشكل (2 - 3).



الشكل (3-2)

عند سحب الغاز تقل عدد مولاته لذلك يقل حجم الغاز .
وعند اضافة كمية من الغاز تزداد عدد مولاته لذلك يزداد حجم الغاز (وهذا عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة) .

7-2 الكميات المولية

ان اي كمية تقسم على عدد المولات (n) تسمى بالكمية المولية ومثال على ذلك ان الحجم المولي V_m يساوى V مقسوم على عدد المولات n اي

$$V_m = \frac{V \text{ (L)}}{n \text{ (mol)}} = L / \text{mol}$$

والحجم المولى الذي يحتله اي غاز مقاساً عند الظروف القياسية (STP) (Standrad Temperature and Pressure) والتي تساوي ضغط 1 atm (760 Torr) ودرجة حرارة 0°C (273 K) يسلي كمية ثابتة L 22.414 cm³ (22.414 cm³) .

تمرين (8-2)
احسب الحجم المولى لغاز تشغل 37.5 L منه 3 moles .

والكتلة m بقسمتها على عدد المولات n تسمى بالكتلة المولية M (التي تعرفت عليها في الفصل الاول) وتعرف الكتلة المولية M حسب العلاقة الآتية:

$$M = \frac{m \text{ (g)}}{n \text{ (mol)}} = g / \text{mol}$$

مثال 2 - 9 :

غاز الهيدروجين يشغل حجماً قدر 22.4 L في الظروف القياسية (STP) عندما نأخذ 1 mol منه ، ما حجمه في نفس الظروف عندأخذ 3 moles .

الحل :

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \quad V_1, n_1, n_2 \longrightarrow V_2$$

$$V_2 = \frac{V_1 n_2}{n_1} = \frac{(22.4 \text{ L})(3\text{mol})}{(1\text{mol})}$$

$$V_2 = 67.2 \text{ L}$$

تمرين (9-2)
غاز حجمه 11.2 L في الظروف القياسية (STP) ماعدده مولاته 0.5 mol . ما عدد مولاته في نفس الظروف عندما يكون حجمه 16.8 L .

8 - 2 قانون الغاز المثالي The Ideal Gas Law

يمكن بشكل عام ان نحصل على علاقة رياضية من ربط قوانين الغازات الاربعة مع بعضها البعض :

$PV = k$ قانون بوويل

$\frac{V}{T} = k'$ قانون شارل

$\frac{P}{T} = k''$ قانون غي لوساك

$\frac{V}{n} = k'''$ قانون افوكادرو

وبربط هذه المعادلات مع بعضها يمكن الحصول على العلاقة

$V \propto n \cdot \frac{T}{P}$ الرياضية الآتية:

وعند تحويل التناسب الى مسلاة نحصل على

$$V = (\text{constant}) \cdot n \cdot \frac{T}{P}$$

ويرمز لثابت التناسب (constant) بالحرف R لذا تصبح المعادلة الاخيرة على الصورة الاتية:

هل تعلم

اذا عرفت قيم كل من درجة الحرارة والضغط والحجم لاي غاز تستطيع استخدام قانون الغاز المثالي لحساب عدد مولات هذا الغاز .



$$PV = nRT \quad \text{معادلة الغاز المثالي}$$

يطبق هذا القانون فقط على الغازات التي تنطبق عليها قوانين الغازات الاربعة وتسماى مثل هذه الغازات بالغازات المثالية (Ideal gases). ويمثل R ثابت يسمى الثابت العام للغازات . وعند استخدام هذه المعادلة حسابياً يجب ان تكون وحدات P بالجو (atm) و V باللتر (L) و عدد المولات (n) بالمول (mole) و T بالكلفن (K).

وعندما نريد ايجاد قيمة R نأخذ مول واحد من اي غاز مثالي (n = 1) في الظروف القياسية (STP) (درجة حرارة 0°C وضغط 1 atm) والذي يشغل حجماً قدره L 22.414 وبالتعويض

في معادلة الغاز المثالي :

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{1 \text{ atm} \times 22.414 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}}$$

$$R = 0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

وبالإمكان استخدام الوحدات الدولية (SI) للضغط (باسكال) (Pa) والحجم يساوي $101325 \text{ Pa} \times 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ وعدد المولات n يساوى 1 ودرجة الحرارة تساوي K 273 لايجاد قيمة R

بالوحدات الدولية :

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{101325 \text{ Pa} \times 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}}$$

$$R = 8.314 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{mol} \cdot \text{K}$$

والوحدة Pa تعرف بانها $\frac{\text{Kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$ وبتعويضها في الوحدة اعلاه

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{J} \cdot \text{s}^2}$$

وحدة الطاقة جول (J) هي وحدة الطاقة جول (J) وعليه
 $R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

مثال 2 - 10 :

احسب عدد مولات غاز NO في الظروف القياسية اذا كان حجمه 5.6 L.

الحل :

الظروف القياسية هي ضغط 1atm ودرجة حرارة K 273

$$PV = nRT \quad P, V, T \longrightarrow n$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{1 \text{ atm} \times 5.6 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 273 \text{ K}}$$

$$n = 0.25 \text{ mol}$$

هل تعلم

وحدة ثابت العام للغازات:

$$R = 8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

تستخدم فقط في حالة الحسابات التي تشمل على وحدات الطاقة لذا سوف لن نستخدمها هنا في هذا الفصل بل ذكرت للتعریف بها حيث سوف تستخدمها في السنين القادمة في دراستك للكيمياء.

تمرين (10-2)

ما عدد مولات غاز O₂ حجمه L 10 بالظروف القياسية (STP).

1 - 8 - 2 حساب كثافة الغاز

ان بالامكان استخدام معادلة الغاز المثالي لحساب كثافة الغاز وفق الاتي :

$$PV = nRT \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

وبما ان المول (n) يعرف بأنه

نعرض عن n بالمعادلة (1) لنحصل على

$$PV = \left(\frac{m}{M}\right)RT \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

او بصورة اخرى

$$PM = \left(\frac{m}{V}\right)RT \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (3)$$

ومن تعريف الكثافة

حيث ρ تمثل الكثافة وبتاعويضها بالمعادلة (3) نحصل على

$$PM = \rho RT \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (4)$$

وبترتيب المعادلة (4) نحصل على المعادلة التالية التي تمثل علاقة رياضية لحساب كثافة الغاز من معرفة الضغط والكتلة المولية عند درجة حرارة معينة .

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

علاقة كثافة الغاز

وبنفس الفكرة السابقة نستطيع ايجاد كتلة الغاز او كتلته المولية من المعادلة رقم (3)

$$PM = \left(\frac{m}{V} \right) RT$$

التي يمكن ترتيبها بالشكل الاتي:

$$m = \frac{PMV}{RT}$$

علاقة كتلة الغاز

مثال 2 - 11 :

يستخدم الهيدرازين (N_2H_4) وقوداً للصواريخ . احسب كثافته عند الظروف القياسية (STP) .

الحل :

تمرين (11-2)
احسب كثافة غاز الاوكسجين (O_2) بوحدات g/L في درجة حرارة K 373 وضغط 5 atm .

$$\rho = \frac{PM}{RT} \quad P, T, M \longrightarrow \rho$$

الكتلة المولية للهيدرازين

$$M(N_2H_4) = (2 \times 14) + (4 \times 1) = 32 \text{ g/mol}$$

الظروف القياسية هي ضغط 1atm ودرجة حرارة K 273 لذا

$$\rho = \frac{1 \text{ (atm)} \times 32 \text{ (g/mol)}}{0.082 \text{ (L . atm/mol . K)} \times 273 \text{ (K)}}$$

$$\rho = 1.43 \text{ g/L}$$

مثال 2 - 12 :

ما عدد مولات عينة غاز تشغل mL 700 عند ضغط قدره 0.8 atm ودرجة حرارة 27°C .

الحل :

نحو حجم الغاز من وحدة mL الى وحدة L

$$V(L) = V \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 700 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.7 \text{ L}$$

نحو درجة الحرارة من وحدة °C الى وحدة K

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

ومن معادلة الغاز المثالي

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT} \quad P, V, T \longrightarrow n$$

$$n = \frac{0.8 \text{ atm} \times 0.7 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 300 \text{ K}}$$

$$n = 0.023 \text{ mol}$$

تمرين (12-2)

غاز الميثان هو احد الغازات الناتجة من عملية تكرير النفط اخذت عينة منه قدرها 0.5 mol وتحت ضغط 3 atm بدرجة حرارة 27°C . احسب الحجم بالمليلتر (mL) الذي تشغله العينة .

مثال 2 - 13 :

وجد ان ضغط غاز في وعاء حجمه L 3 ودرجة حرارة 27°C يسلوي 5.46 atm . احسب كتلة الغاز وعدد مولاته في الوعاء علماً بان الكتلة المولية للغاز 44 g/mol

الحل :

نحو درجة الحرارة من وحدة °C الى وحدة K

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273$$

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

وباستخدام العلاقة

$$m = \frac{MPV}{RT} \quad P, V, T, M \longrightarrow m$$

$$m = \frac{44 \text{ g/mol} \times 5.46 \text{ atm} \times 3 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 300 \text{ K}}$$

$$m = 29.3 \text{ g}$$

تمرين (13-2)

عينة من غاز كتلتها 4.41 g تشغف حجماً قدره 900 mL تحت ضغط 3.65 atm بدرجة حرارة 127°C ما هي كتلتها المولية .

ولحساب عدد المولات نستخدم العلاقة الآتية :

$$n = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

$$n = \frac{29.3 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0.67 \text{ mol}$$



احسب الكتلة المولية لغاز كتلته g 0.6 في وعاء حجمه mL 500 ودرجة حرارة 227°C علماً بأن ضغط الغاز يساري Torr 748 .

الحل :

نحو حجم الغاز من وحدة mL إلى وحدة L

$$V(L) = V \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 500 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.5 \text{ L}$$

نحو درجة الحرارة من وحدة °C إلى وحدة K

$$T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$$

$$T = 227 + 273 = 500 \text{ K}$$

نحو الضغط من atm إلى Torr

$$P \text{ atm} = P \text{ Torr} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ Torr}} = 748 \text{ Torr} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ Torr}} = 0.984 \text{ atm}$$

ومن العلاقة

$$M = \frac{mRT}{PV}$$

$$M = \frac{0.6 \text{ g} \times 0.082 \text{ atm.L/mol.K} \times 500 \text{ K}}{0.984 \text{ atm} \times 0.5 \text{ L}}$$

$$M = 50 \text{ g/mol}$$

g 0.31 من غاز كتلته المولية mol/g 32 تحت ضغط 1.17 atm عند أي درجة حرارة تشغله هذه العينة حجماً مقداره L 0.23 .

الحل :

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$T = \frac{PVM}{mR} \quad P, V, m, M \rightarrow T$$

$$T = \frac{1.17 \text{ (atm)} \times 0.23 \text{ (L)} \times 32 \text{ (g/mol)}}{0.31 \text{ (g)} \times 0.082 \text{ (L.atm/mol.K)}}$$


$$T = 339 \text{ K}$$

قانون دالتون للضغط الجزئي 9 - 2 Dalton's law of partial pressures

لقد تعاملنا في ما سلف ذكره مع غاز واحد، فماذا بشأن خليط من الغازات التي لا تتفاعل مع بعضها البعض كالهواء مثلاً؟ لقد قام دالتون بدراسة الهواء ولاحظ ان الضغط الكلي للغازات يسلوي مجموع الضغوط الجزئية لكل غاز على حدة كما لو كان هذا الغاز موجوداً لوحده في الوعاء، وان ضغط كل غاز على حدة يسمى بالضغط الجزئي وينص قانون دالتون (ان الضغط الكلي لخليط من الغازات يسلوي مجموع الضغوط الجزئية لكل غاز في الخليط على شرط ان لا يحدث تفاعل بينها) ويمكن التعبير رياضياً

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

حيث P_T تمثل الضغط الكلي و P_1 و P_2 و الخ تمثل الضغوط الجزئية للغازات المكونة للخلط .



عند فتح الصمام ينتشر الغازين في كلا الدورقين لذلك سيتغير ضغط الغازين حسب قانون دالتون .

9 - 1 العلاقة بين الضغط الكلي وعدد المولات الكلية والكسر المولى

لنفرض انه لدينا خليط من غازين في انباء واحد تحت درجة حرارة وحجم معينين . بتطبيق قانون الغاز المثالي لكل غاز على حدة نحصل على ضغطهما :

$$P_1 = \frac{n_1 R T}{V} \quad \dots \quad (1)$$

$$P_2 = \frac{n_2 R T}{V} \quad \dots \quad (2)$$

ومن قانون دالتون

$$P_T = P_1 + P_2 \quad \dots \quad (3)$$

نعرض المعادلات (1) و (2) في المعادلة (3) نحصل على

$$P_T = \frac{n_1 R T}{V} + \frac{n_2 R T}{V} = (n_1 + n_2) \frac{R T}{V} \quad \dots \quad (4)$$

بقسمة معادلة (4) على معادلة (1)

$$\frac{P_1}{P_T} = \frac{\frac{n_1 R T}{V}}{(n_1 + n_2) \frac{R T}{V}} \quad \dots \quad (5)$$

وبحذف المتشابهات نحصل على

$$\frac{P_1}{P_T} = \frac{n_1}{n_1 + n_2} \quad \dots \quad (6)$$

ويمكن ان نجمع عدد المولات الجزئية حيث n_T تمثل عدد المولات الكلية لخليط الغازات اي مجموع المولات الجزئية

$$n_T = n_1 + n_2$$

وهكذا تصبح المعادلة (6) على الصورة الآتية

$$\frac{P_1}{P_T} = \frac{n_1}{n_T} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (7)$$

وبشكل مشابه للمكون 2

$$\frac{P_2}{P_T} = \frac{n_2}{n_T} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (8)$$

الكسر المولى (mole fraction) : يعرف الكسر المولى لاي مكون من مكونات المزيج 1 او 2 بانه النسبة بين عدد مولات ذلك المكون على مجموع عدد مولات المكونات (عدد المولات الكلية). يرمز للكسر المولى للمكون 1 (x_1) ويسلوبي

$$X_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{n_1}{n_T}$$

وللكسر المولى للمكون 2 (x_2) يسلوي

$$x_2 = \frac{n_2}{n_T}$$

و عند تعويض الكسر المولى بالمعادلة (7) و (8) نحصل على:

$$\frac{P_1}{P_T} = x_1 \quad , \quad \frac{P_2}{P_T} = x_2 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (9)$$

ومنها يمكننا الحصول على المعادلات الآتية:

$$P_1 = x_1 \times P_T \quad , \quad P_2 = x_2 \times P_T \quad \dots \dots \dots \quad (10)$$

وبشكل عام يمكن كتابة المعادلة (10) كالتالي

$$P_i = x_i \times P_T$$

حيث يمثل x الكسر المولى للمكون a و P ضغطه الجزيئي.
ولا بد ان نعلم ان مجموع الكسور المولية لمزيج من الغازات يساوي الواحد الصحيح ويمكن تطبيق ذلك على المثال المذكور سابقاً لمزيج مكون من غازين كما يأتي :

$$x_1 + x_2 = \frac{n_1}{n_1+n_2} + \frac{n_2}{n_1+n_2} = \frac{n_1+n_2}{n_1+n_2} = 1$$

وبشكل عام يمكن كتابة المعادلة الآتية:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \dots = 1$$

مثال 2 - 16 :

خليط من الغازات النبيلة تحتوي 4.46 mol من غاز النيون (Ne) و 0.74 mol من الأركون (Ar) و 2.15 mol من الزيون (Xe). احسب الضغط الجزئي لكل غاز علماً بـان الضغط الكلي يسلوـي 2 atm و درجة الحرارة ثابتة.

الحل :

أولاً : نجد عدد المولات الكلية

$$n_T = n_{Ne} + n_{Ar} + n_{Xe}$$

$$n_T = 4.46 \text{ mol} + 0.74 \text{ mol} + 2.15 \text{ mol}$$

$$n_T = 7.35 \text{ mol}$$

تمرين (14-2)
يحتوي أناء على خليط من الغازات الطبيعية الناتجة من تكرير النفط مقاديرها هي 6 mol من غاز الميثان و 4 mol من الإيثان و 2 mol من البروبان فـاذا علمت ان الضغط الكلي لها 6 atm .. احسب الضغط الجزئي لكل غاز.

ثانياً : نجد الكسر المولـي لـكل غاز عـلـى حـدـه

$$x_{Ne} = \frac{n_{Ne}}{n_T} = \frac{4.46 \text{ mol}}{7.35 \text{ mol}} = 0.607$$

$$x_{Ar} = \frac{n_{Ar}}{n_T} = \frac{0.74 \text{ mol}}{7.35 \text{ mol}} = 0.100$$

$$x_{Xe} = \frac{n_{Xe}}{n_T} = \frac{2.15 \text{ mol}}{7.35 \text{ mol}} = 0.293$$

ثالثاً : نجد الان الضغط الجزئي لـكل غـاز بما ان

$$P_i = x_i \times P_T$$

وبالتـعـويـض عن i بـرمـزـ الغـازـ فـيـ القـانـونـ السـابـقـ نـحـصـلـ عـلـىـ

$$P_{Ne} = P_T x_{Ne} = 2 \text{ atm} \times 0.607 = 1.214 \text{ atm}$$

$$P_{Ar} = P_T x_{Ar} = 2 \text{ atm} \times 0.100 = 0.200 \text{ atm}$$

$$P_{Xe} = P_T x_{Xe} = 2 \text{ atm} \times 0.293 = 0.586 \text{ atm}$$

وللتـاكـدـ نـجـمـعـ الضـغـوطـ الـجـزـئـيـةـ المـفـروـضـ انـهـاـ = 2

$$1.214 \text{ atm} + 0.200 \text{ atm} + 0.586 \text{ atm} = 2.000 \text{ atm}$$

حضر غاز الاوكسجين من التسخين الشديد لكلورات البوتاسيوم بوجود MnO_2 كعامل مساعد وجمع الغاز بازاحة الماء نحو الاسفل بدرجة حرارة $24^\circ C$ وتحت ضغط 762.4 mmHg وكان حجمه 128 mL . احسب كتلة الغاز بالغرام علماً بان الكتلة المولية للأوكسجين تساوي 32 g/mol وضغط بخار الماء يساوي 22.4 mmHg بدرجة حرارة $24^\circ C$.

الحل :

ان الغاز المجموع في التجربة اعلاه يكون ممزوجاً مع كمية من بخار الماء لذا يصبح لدينا خليط من الغاز مع بخار الماء موجود في قنية جمع الغاز.



يمثل الضغط 762.4 mmHg الضغط الكلي لكل من O_2 وبخار الماء . لذا علينا ايجاد ضغط O_2 الجزيئي .

$$P_T = P_{O_2} + P_{H_2O}$$

$$762.4 = P_{O_2} + 22.4$$

$$P_{O_2} = 740 \text{ mmHg}$$

نحو الضغط من atm الى mmHg

$$P \text{ atm} = P \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 740 \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 0.974 \text{ atm}$$

نحو حجم الغاز من وحدة mL الى وحدة L

$$V(L) = V \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 128 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.128 \text{ L}$$

نحو درجة الحرارة من وحدة $^\circ C$ الى وحدة K

$$T(K) = t(^\circ C) + 273 = 24 + 273 = 297 \text{ K}$$

وباستخدام معادلة الغاز المثالي

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$m = \frac{PVM}{RT}$$

$$m = \frac{0.974 \text{ atm} \times 0.128 \text{ L} \times 32 \text{ g/mol}}{0.082 \text{ L.atm/mol.K} \times 297 \text{ K}}$$

$$m = 0.164 \text{ g}$$

مثال 2 - 18 :

يحتوي دورق حجمه 2L في درجة حرارة 7°C على خليط من الغازات 3.2 g من الاوكسجين و 0.4 g من الهيليوم و 14 g من النتروجين . احسب الضغط الكلي للخليط علما بان الكتلة المولية للاوكسجين تساوي 32 والنتروجين 28 والهيليوم 4 g/mol .

الحل :

$$n_{He} = \frac{m(g)}{M(g/mol)} = \frac{0.4 \text{ g}}{4 \text{ g/mol}} = 0.1 \text{ mol}$$

$$n_{O_2} = \frac{3.2 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.1 \text{ mol}$$

$$n_{N_2} = \frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$$

نحو 7°C إلى

$$T(K) = t(°C) + 273 = 7 + 273 = 280 \text{ K}$$

نجد مجموع عدد المولات الكلية للخليط

$$n_T = n_{He} + n_{O_2} + n_{N_2}$$

$$n_T = 0.1 + 0.1 + 0.5 = 0.7 \text{ mol}$$

باستخدام معادلة الغاز المثالي

$$P_T = \frac{n_T RT}{V}$$


$$P_T = \frac{0.7 \text{ mol} \times 0.082 \text{ atm.L/mol.K} \times 280 \text{ K}}{2 \text{ L}} = 8.036 \text{ atm}$$

هل تعلم

في الكثير من الاعمال المهمة تتم تحت سطح المحيطات ويقوم بمعظمها غطاسون متخصصون يستطعون اصلاح السفن وفحصها . يتعرض الغطاسون الى ضغط الماء ويكون الضغط كبيرا حتى لو كان العمق امتلاقا قليلة وان جرب احدهم ان يتنفس من انبوبة لها فتحة في اعلى سطح الماء فانه لا يستطيع لأن رئتيه لا يمكنهما التمدد لذا يستخدم الغطاسون ابوات خاصة بالتنفس في الاعماق وتكون الغازات التي يحملونها مضغوطة وهناك جهاز متصل باسطوانات الهواء التي يحملونها معهم يعرف بالمنظم ويعمل اوتوماتيكيا لضبط ضغط الهواء الخارج من الاسطوانات والذي يدخل الى الرئتين وي العمل المنظم على معادلة الضغط داخل وخارج الرئتين ويستخدم الغطاسون خليط خاص من الغازات بدلا من الهواء المضغوط وهو خليط من غازات الهيليوم والاوكسجين وكمية قليلة من غاز النتروجين يعرف هذا الخليط بالهليوكس ويستخدم هذا الخليط في عمليات الغطس العميق جدا .

وعاءان متصلان بصمam . الاول حجمه L 1 يحتوي على غاز CO_2 تحت ضغط 720 Torr والثاني حجمه L 2 يحتوي على غاز N_2 تحت ضغط 540 Torr احسب الضغط الكلي عند فتح الصمام على فرض ثبوت درجة الحرارة .

الحل :



تمرين (17-2) كم هو الضغط الكلي الناتج عن خلط 20 mL من N_2 وتحت ضغط 30 mL مع 640 Torr اذا من O_2 وعند ضغط 740 Torr تم خلطها في وعاء حجمه 50 mL علما بان درجة الحرارة ثابتة .

عند فتح الصمام سوف ينتشر الغازان ويختلطان وسيشغل كلا الغازين مجموع الحجمين وبالتالي سوف يتغير ضغط كل منهما وعليه فالحجم الكلي سيكون :

$$V_2 = V_{\text{N}_2} + V_{\text{CO}_2} = 2 + 1 = 3 \text{ L}$$

الآن نحسب الضغط الجزيئي لكل غاز باستخدام علاقة بويل $P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$

فالضغط الجزيئي لـ CO_2 في الخليط سيكون كالتالي :

$$P_1 = \frac{720 \text{ Torr} \times 1 \text{ L}}{3 \text{ L}} = 240 \text{ Torr} = P_{\text{CO}_2}$$

والضغط الجزيئي لـ N_2 في الخليط يساوي :

$$P_2 = \frac{540 \text{ Torr} \times 2 \text{ L}}{3 \text{ L}} = 360 \text{ Torr} = P_{\text{N}_2}$$

لذا فالضغط الكلي لل الخليط سيصبح :

$$P_T = P_{\text{CO}_2} + P_{\text{N}_2}$$

$$P_T = 240 \text{ Torr} + 360 \text{ Torr} = 600 \text{ Torr}$$

وقد كراهام من تجارب المختلفة ان سرعة انتشار الغازات النافذة خلال ثقب صغير تتناسب عكسيًا مع الجذر التربيعي لكتافة الغاز وكذلك توصل كراهام الى ان (سرعة الانتشار للغازات النافذة خلال الثقب الصغير تتناسب عكسيًا مع الجذر التربيعي للكتلة المولية (M) أيضًا) .


فإذا اعتبرنا سرعة نفاذ غازين من خلال نفس الثقب هي r_1 و r_2 وكانت كثافتيهما ρ_1 و ρ_2 على التوالي فانه واعتماداً على قانون كراهام يكون:

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

حيث M_1 و M_2 هي الكتل المولية للغازين على التوالي . وبتطبيق القانون على انتشار غازي الهيدروجين والأوكسجين النافذة من خلال ثقب معين نتوصل الى :


$$\frac{r_{H_2}}{r_{O_2}} = \sqrt{\frac{\rho_{O_2}}{\rho_{H_2}}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}}$$

حيث r_{H_2} و r_{O_2} هي سرعة وكثافة والكتلة المولية لغاز الهيدروجين على الترتيب اما r_{O_2} و ρ_{O_2} و M_{O_2} هي الكميات المناظرة بالنسبة الى غاز الأوكسجين .



هل تعلم

ينتشر غاز البروم في هواء الاسطوانة الموجود فيها بعد تركه لعدة ساعات ..



الكتلة المولية لغاز كلوريد الهيدروجين 36.5 g/mol ولغاز الامونيا 17 g/mol لذلك سرعة انتشار غاز الامونيا تكون اسرع من كلوريد الهيدروجين .

مثال 2 - 20 :

اذا علمت ان سرعة انتشار غاز الاوكسجين خلال حاجز مسامي يسلوي 8 mL/s فما سرعة انتشار غاز الهيدروجين خلال نفس الحاجز علماً بان كثافة غاز الاوكسجين تسلوي 1.44 g/L و كثافة غاز الهيدروجين تسلوي 0.09 g/L خلال نفس الظروف من ضغط و درجة حرارة .

الحل :

تمرين (18-2)

سرعه انتشار غاز O_2 تسلوي 8 mL/s و سرعة انتشار غاز الهيدروجين 32 mL/s . فما الكتلة المولية للهيدروجين اذا علمت ان الكتلة المولية من O_2 تسلوي 32 g/mol .

$$\frac{r_{H_2}}{r_{O_2}} = \sqrt{\frac{\rho_{O_2}}{\rho_{H_2}}}$$

$$\frac{r_{H_2}}{8 \text{ mL/s}} = \sqrt{\frac{1.44 \text{ g/L}}{0.09 \text{ g/L}}}$$

$$\frac{r_{H_2}}{8 \text{ mL/s}} = \sqrt{16}$$

$$r_{H_2} = 32 \text{ mL/s}$$

سرعه انتشار غاز الهيدروجين

مثال 2 - 21 :

عينة من غاز النتروجين انتشرت خلال ثقب صغير بمعدل انتشار مقداره 2.65 mL/s . احسب معدل سرعة انتشار غاز NH_3 عند خروجه من نفس الثقب. علماً بان الكتلة المولية من N_2 تسلوي 28 g/mol و NH_3 تسلوي 17 g/mol .

الحل :

$$\frac{r_{N_2}}{r_{NH_3}} = \sqrt{\frac{M_{NH_3}}{M_{N_2}}}$$

$$\frac{2.65 \text{ mL/s}}{r_{NH_3}} = \sqrt{\frac{17 \text{ g/mol}}{28 \text{ g/mol}}}$$

بالتربيع للطرفين نحصل على

$$\frac{7.0225}{r^2_{NH_3}} = \frac{17}{28}$$

$$r^2_{NH_3} = 11.56 \text{ (ml/s)}^2$$

$$r_{NH_3} = 3.40 \text{ ml/s}$$

بالجذر للطرفين

سرعه انتشار غاز الامونيا

2-10-1 العلاقة بين الانتشار و زمن الانتشار

عندما ينتشر حجم معين من غاز فانه يستغرق زمناً معيناً وان سرعة انتشار اي غاز في درجة حرارة وضغط معينين يتناصف عكسياً مع الزمن الذي تستغرقه عملية الانتشار لذاك الغاز اي كلما زادت السرعة قل الزمن اللازم للانتشار .

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{t_2}{t_1}$$

اي

حيث ان t_1 و t_2 هي أزمان الانتشار للغاز الاول والثاني على التوالي . ويمكن جمع قوانين كراهام بقانون واحد على الصورة الآتية :

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

مثال 2 - 22 :

تنشر عينة من غاز الهيدروجين خلال ثقب في 5 s وينتشر غاز معين آخر خلال نفس الثقب تحت نفس الظروف في 20 s احسب الكتلة المولية للغاز الثاني اذا علمت ان الكتلة المولية لغاز الهيدروجين تساوي 2 g/mol .

الحل :

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{t_2}{t_1}$$

بما ان

$$\frac{t_2}{t_1} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

وعليه

$$\frac{20 \text{ s}}{5 \text{ s}} = \sqrt{\frac{M_2}{2 \text{ g/mol}}}$$

$$4 = \sqrt{\frac{M_2}{2 \text{ g/mol}}}$$

وبالتربع للطرفين نحصل على

$$16 = \frac{M_2}{2 \text{ g/mol}}$$

$$M_2 = 32 \text{ g/mol}$$

تمرين (19-2)


عينة من غاز الزيونون يحتاج الى دقيقة و 8.3 ثانية لكي ينتشر من خلال فوهه صغيرة . احسب الكتلة المولية لغاز اذا علمت ان الزمن الذي استغرقه في الانتشار من نفس الفوهه وتحت نفس الظروف كان 57 s علماً بان الكتلة المولية من غاز الزيونون 131.3 g/mol Xe

تمرين (20-2)

على انتشار جزيئات الامونيا بسرعة اكبر من جزيئات الروائح والعطور .

النظرية الحركية للغازات 11 - 2

هل تعلم
ان جزيئات الغاز تتحرك في خطوط مستقيمة الى ان تتصادم مع بعضها او تصطدم بجدران الاناء .



ان قوانين الغازات التي شرحت سابقا كانت نتيجة اعمال تجريبية قام بها العلماء آنذاك، أي أنها لم تشقق أو توضح من خلال نظرية معينة. وقد جرت محلولات عديدة لتفسير وشرح سلوك الغازات من الناحية النظرية أنتجت علاقة بين النظرية والمعلومات التجريبية من خلال عدد من الفرضيات التي وصفت الغازات ومنها :

- 1 - أن الغازات تتكون من عدد كبير من الجزيئات، وان حجم الجزيئه صغير يمكن اهماله مقارنة بالحجم الذي يشغله الغاز. اي ان المسافة التي تفصل بين الجزيئات كبيرة نسبيا .
- 2 - جزيئات الغاز في حالة حركة سريعة وعشوائية وبخطوط مستقيمة، وهي في حركتها هذه تصطدم مع بقية جزيئات الغاز وبجدران الوعاء الحاوي لها.
- 3 - لا يوجد تجاذب أو تناحر بين جزيئات الغاز .
- 4 - ان الضغط الذي ينتجه الغاز ناتج من التصادمات التي تحدثها جزيئاته مع جدران الوعاء الذي يحتويها.
- 5 - ان لجزيئات الغاز سرع مختلفة، وان معدل سرعة حركة الجزيئات يتتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة للغاز.

الغازات الحقيقية والغازات المثالية 12 - 2

هل تعلم
ان متوسط عدد الاصطدامات بين جزيئات الهواء في ثانية واحدة قرب مستوى سطح البحر يبلغ 7 مليارات اصطدام في المتر المربع وان متوسط عدد الاصطدامات هذه يصبح على ارتفاع 600 Km من سطح البحر حوالي تصادم واحد كل دقيقة.

يطلق على الغاز الذي يطيع قوانين الغازات او المعادلة العامة للغازات تحت كل الظروف من درجة الحرارة والضغط بالغاز المثالي وفي الحقيقة لا وجود للغاز المثالي، حيث ان الغازات تعاني في سلوكها من حيود محسوس عن الحالة المثالية، وان الحالة المثلالية تظهر فقط في ظروف معينة من درجات الحرارة والضغط (ان الغازات التي تحيد عن السلوك المثالي تسمى بالغازات الحقيقة او غير المثالية) .

ان حيود الغازات الحقيقة يأتي من افتراضين خاطئين من فرضيات النظرية الحركية للغازات (وهذا لربما يكون صحيحاً عند الضغوط الواطئة) وهما :

1 - ان الحجم الذي يشغله الجزيء معدوم مقارنة بالحجم الكلي للغاز، لكن جزيئات الغاز يجب ان تشغل حجم معين في الضغوط العالية والا فانه لا يمكن تحويل الغاز الى سائل او صلب.

2 - لا وجود لقوى التجاذب بين جزيئات الغاز، لكن لجزيئات الغاز فيما بينها قوى تجاذب والا لما اقتربت جزيئات الغاز من بعضها ولم يتحول الغاز الى سائل او صلب.

ومع هذا فانه بالامكان تطبيق قوانين الغازات المثالية على الغازات الحقيقية للحصول على نسب متفوقة من الدقة تزداد بزيادة درجة الحرارة وتناقص الضغط وبالعكس.


تمرين (21-2)

فسر معنى الجملة الآتية (لا يسلك اي غاز السلوك المثالي عند جميع درجات الحرارة والضغط) عند اي ظروف تسلك الغازات الحقيقة سلوك الغازات المثالية ولماذا ؟

2 - 13 الظواهر الحرجة وتسيل الغازات

طبقاً للنظرية الحركية للغازات فان جزيئات الغاز تكون بحالة حركة عشوائية، وعندما تكون درجة الحرارة عالية والضغط منخفض فان كل جزيء من الغاز تتحرك بحرية تامة ولا تتأثر بالجزيئات الأخرى. وعند خفض درجة الحرارة، فان الطاقة الحركية لجزيئات الغاز تقل وتتصبح حركة الجزيء بطيئة، وعند الوصول الى درجة منخفضة كافية فان الغاز يتحول الى سائل. وبالمقابل فمن الممكن جعل جزيئات الغاز تقترب من بعضها اكثر فاكثر من خلال زيادة الضغط، حيث ان زيادة الضغط تؤدي الى نقصان الحجم. وباستمرار زيادة الضغط وتناقص الحجم يتحول الغاز الى سائل.

ان درجة الحرارة والضغط الذين يتحول فيها الغاز الى سائل في اعلاه يدعى بدرجة الحرارة الحرجة (Critical Temperature) والضغط الحر (Critical Pressure) وعليه يمكن تعريف درجة الحرارة الحرجة على انها تلك الدرجة الحرارية التي لا يمكن تحويل غاز درجة حرارته اعلى منها الى سائل مهما زاد الضغط المسلط عليه. اما الضغط الحر فيمكن تعريفه بأنه الضغط اللازم تسليطه على غاز في درجة الحرارة الحرجة لكي يتحول الى سائل بالإضافة الى ذلك، يوجد تعبير اخر يسمى الحجم الحر (Critical Volume) والذي يعرف بأنه حجم مول واحد من الغاز في الدرجة الحرارية الحرجة والضغط الحر.



أ - غاز مثالي (يفترض ان الجزيئات متناهية الابعد اي ليس لها حجم).

ب - غاز حقيقي (الجزيئات للغاز لها حجم).



هل تعلم

الكريوستات : هي اوعية لحفظ الغازات المسالة ونقلها ويمكن تصميمها انتقال الحرارة من الوسط المحيط الى السائل البارد جدا الذي في داخله والكريوستات الاكثر استخداما تسمى قارورات Dewar Flasks نسبة للعالم الاسكتلندي جيمس ديوار الذي قام بتصميمها في عام 1892 وهي اوعية مزدوجة الجدران يفصلها فراغ وتشبه في ذلك الترس المعروف الذي يستخدم لنقل المشروبات الباردة والساخنة.

الكريوستات اوزانها خفيفة جدا بالمقارنة باسطوانات الغاز المضغوط وحجم اي مادة معينة في الحالة السائلة اصغر بكثير منها في الحالة الغازية حتى لو كان ضغط الغاز مرتفعا لهذه الاسباب يتم تخزين الكثير من الغازات ونقلها في الحالة السائلة بدلا من كونها في الحالة الغازية.

والجدول (2-2) يعطي امثلة لدرجات الحرارة الحرجة والضغط الحرجة لعدد من الغازات.

الجدول 2-2 درجات الحرارة والضغط الحرجة لعدد من الغازات

الغاز	درجة الحرارة الحرجة (°C)	الضغط الحرج (atm)
هيليوم	- 267.9	2.26
هيدروجين	- 239.9	12.8
نتروجين	- 147	33.5
اوكسجين	- 118.4	50.1
ثنائي اوكسيد الكاربون	+31	50.1

2 - 14 ضغط بخار السائل

اذا اردنا ان نختبر سائل في حيز مغلق (شكل 2-4) (بدرجة حرارة ثابتة)، فاننا سنجد بعض جزيئات السائل تغادر السطح الى الحيز الذي فوقه تلقائيا. وبما ان الحيز مغلق فان جزيئات البخار غير قادرة على الهروب خارج الحيز، لذلك فان هذه الجزيئات تصطدم مع بعضها ومع جدار الحيز، وبالتالي فان بعض هذه الجزيئات سوف تفقد طاقتها الى جزيءة اخرى ثم ترجع الى الحالة السائلة. ان الحالة الاولى تدعى بالتبخير (Evaporation) بينما تدعى الحالة الثانية بالتكثيف (Condensation). تنتج جزيئات في الحالة البخارية ضغطاً، وعند التوازن يصبح هذا الضغط صفة مميزة للسائل يسمى الضغط البخاري (Vapour Pressure) للسائل، والذي يمكن تعريفه بأنه **الضغط الذي تنتجه جزيئات البخار التي هي في حالة توازن مع جزيئات السائل بدرجة حرارة معينة**.



الشكل 2-4

في الاناء المفتوح تغادر جزيئات السائل الاناء عند التسخين (تبخير).

بينما تبقى جزيئات السائل في الاناء المغلق داخل الاناء عند التسخين (تكثيف).

2 - 15 درجة غليان السائل

تؤدي زيادة درجة الحرارة الى زيادة في الطاقة الحركية لجزيئات السائل، وهذه الزيادة تقلل قوة التجاذب بين هذه الجزيئات فيزداد عدد الجزيئات التي تغادر سطح السائل الى الحيز الذي فوقه مما يؤدي الى زيادة الضغط البخاري للسائل. وعندما يتسلوی الضغط البخاري للسائل مع الضغط الجوي فان السائل يبدأ بالغليان وعليه فان درجة غليان السائل هي **الدرجة الحرارية التي يتسلوی عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي**.

هل تعلم

الصفر المطلق (Absolute Zero) هي درجة الحرارة التي تتسلوی -273°C . وهذه الدرجة يفترض ان يكون عندها حجم الغاز يتسلوی صفر (على الاقل من الناحية النظرية) ولكن هذا لا يدرك في الواقع العملي حيث ان الغازات تتم اسالتها قبل ذلك او تتحول احيانا الى الحالة الصلبة كما في غاز ثنائي او كسيد الكاربون. وعمليا لم يتم التوصل الى درجة الصفر المطلقة واقل درجة حرارة توصل اليها العلماء هي درجة حرارة الهيليوم السائل وتبلغ -269°C .

اسئلة الفصل الثاني

ملاحظة: عند الحاجة للكتل الذرية في بعض الاسئلة راجع ذلك في جداول نهاية الكتاب

6.2 في احدى التجارب لتحضير غاز الهيدروجين من تفاعل عنصر المغنيسيوم مع حامض الهيدروكلوريك تم جمع 45 mL من غاز H_2 فوق سطح الماء بدرجة حرارة $25^\circ C$ وتحت ضغط الماء بدرجة حرارة $25^\circ C$. اذا كان الضغط البخاري للماء (الضغط الجزئي لبخار الماء في الهواء مشبع ببخار الماء) بدرجة $25^\circ C$ هو 23.8 Torr احسب عدد مولات غاز H_2 التي تم جمعها في هذه التجربة .

7.2 خليط من الغازات يحتوي على 78% مول نتروجين و 22% مول اوكسجين. فاذا علمت ان الضغط الكلي للخليط 1.12 atm احسب الكسر المولي لكل مكون . وما هو الضغط الجزئي لكل مكون من مكونات الخليط .

8.2 لجزيئات الفلور معدل سرعة مقدارها 0.038 m/s تحت شروط معينة من درجة حرارة وضغط. ما معدل سرعة جزيئات غاز ثنائي اوكسيد الكبريت SO_2 تحت الشروط نفسها .

9.2 اختر الجواب المناسب :

1 - نموذج من غاز نقى ذو كثافة 1.6 g/L بدرجة $26^\circ C$ وضغط 680.2 mmHg . اي من الغازات الاتية هو النموذج ؟



2 - الحجم المولي لغاز He هو 51.4 L/mol عند :

1.2 اسطوانة محرك سيارة (حجرة الاحتراق) ذات حجم مقداره 0.5 L ملئت بمزيج بخار البنزين والهواء تحت ضغط 1 atm . ما هو الضغط الواجب تسليطه على هذا المزيج ليصبح حجمه 57 mL قبل اشعاله بواسطة شمعة القدح؟ (اعتبر مزيج بخار البنزين والهواء عبارة عن غاز واحد).

2.2 بالون مليء بالهيليوم حجمه 50 L عند درجة حرارة $25^\circ C$ وتحت ضغط 1.08 atm ما حجم البالون بعد ارتفاعه الى مستوى يصبح فيه الضغط 0.885 atm ودرجة الحرارة $10^\circ C$.

3.2 عينة من غاز سداسي فلوريد الكبريت SF_6 تشغف حجما قدره 200 mL بدرجة حرارة $27^\circ C$ وضغط 570 atm . احسب حجمها في الظروف القياسية (STP) .

4.2 ما هو الحجم الذي تشغله 5 g من غاز الاستيلين C_2H_2 (احد مكونات الشعلة الاوكسي استيلينية) بدرجة $50^\circ C$ وتحت ضغط 740 Torr ؟

5.2 تشغف 3.7 g من غاز معين بدرجة $25^\circ C$ نفس الحجم الذي يشغل 0.184 g من غاز الهيدروجين بدرجة $17^\circ C$ وتحت نفس الضغط. احسب الكتلة المولية للغاز ؟

7 - إناء يحتوي على ثلاثة غازات لا يحصل بينهما تفاعل حجمه L ، لذا فإن ضغط

الغاز الأول يساوي :

أ - ثلث الضغط الكلي

ب - الضغط الكلي مطروحا منه الضغوط
الجزئية للغازات الأخرى

ج - عدد جزيئاته

د - الضغط الجوي دائماً

8 - إذا علمت أن حجم كتلة معينة من
غاز يساوي cm^3 117 عند درجة $39^\circ C$ فان
حجم الغاز يساوي cm^3 213 عند درجة
حرارة :

أ - $39^\circ C$

ب - $78^\circ C$

ج - $395^\circ C$

د - $295^\circ C$

9 - غاز معين يشغل حجما قدره L 20
عند $mmHg$ 760 وعند ضغط
فانه يشغل حجما قدره :

أ - 10 L

ب - 20 L

ج - 40 L

د - 400 L

10 - في واحدة من الظروف الآتية يكون
لكتلة g 2 من غاز الهيدروجين حجما
أكبر :

أ - $1\ atm$ وضغط $0^\circ C$

ب - $273^\circ C$ وضغط $380\ mmHg$

ج - $273^\circ C$ وضغط $120\ mmHg$

د - $17^\circ C$ وضغط $700\ mmHg$

أ - درجة حرارة $25^\circ C$ وضغط $0.25\ atm$

ب - درجة حرارة $0^\circ C$ وضغط $0.50\ atm$

ج - درجة حرارة $300^\circ C$ وضغط $1.00\ atm$

د - درجة حرارة $40^\circ C$ وضغط $0.50\ atm$

3 - تحت نفس درجة الحرارة، تكون سرعة
انتشار غاز O_2 متساوية لـ :

أ - 4 أمثال سرعة غاز He

ب - 2.08 أمثال سرعة غاز He

ج - 0.35 أمثال سرعة غاز He

د - 0.125 أمثال سرعة غاز He

4 - ان عدد مولات غاز He التي تشغل L 22.4
عند درجة حرارة $30^\circ C$ وضغط $1\ atm$ هي :

أ - 0.11 mol

ب - 1.00 mol

ج - 0.90 mol

د - 1.11 mol

5 - يشغل غاز حجما مقداره mL 430 بدرجة
حرارة $28.2^\circ C$ وتحت ضغط $Torr$ 754.2 فإذا
برد الغاز إلى $20^\circ C$ ، فان ضغط الغاز مقاسا
بالـ Torr هو :

أ - 534.9 Torr

ب - 733.7 Torr

ج - 775.3 Torr

د - 842.3 Torr

6 - يمكن تطبيق قانون شارل عند :

أ - تغير الضغط

ب - ثبوت درجة الحرارة

ج - مدى معين من درجات الحرارة

د - الضغط المنخفض جداً

3 - لو سلكت الغازات جميعاً في مختلف الشروط من درجة الحرارة والضغط سلوكاً وكأنها مثالية عندها لن تكون هناك حالات سائلة أو صلبة للمادة.

4 - في درجة حرارة واحدة فان معدل انتشار احادي اوكسيد الكاربون وغاز النتروجين متماثل عملياً **14.2** تحتوي علبة ملطف جو على غازات تحت ضغط 4.5 atm وعند درجة حرارة 20°C فاذا تركت هذه العلبة في جو حار وعلى الرمل يرتفع ضغط الغازات داخل العلبة الى 4.8 atm ما درجة حرارة الرمل (بالدرجة السيليزية).

15.2 عينة من غاز الاوكسجين تحت ضغط 68°C سخنـت من 21°C الى 0.97 atm تحت حجم ثابت احسب الضغط النهائي بوحدات atm .

16.2 احسب الحجم الابتدائي لغاز تحت ضغط 0.85 atm ودرجة حرارة 66°C حيث يتمدد بالنهاية الى 94 mL عندما يكون الضغط المسلط عليه 0.6 atm ودرجة الحرارة 25°C .

17.2 خليط من ثلاثة غازات، CO_2 بضغط جزئي 289 mmHg و O_2 بضغط جزئي 342 mmHg و N_2 بضغط جزئي 122 mmHg . ما هو الضغط الكلي للخليط والكسر المولي لكل غاز في الخليط.

3.1 - ينتشر غاز (X) بسرعة تعادل 4 g/mol بقدر سرعة انتشار غاز الفلور كتلته المولية تسلوي 19 g/mol ، لذا فان الكتلة المولية التقريبية لغاز (X) هو :

- أ - 4 g/mol
- ب - 2 g/mol
- ج - 6 g/mol
- د - 10 g/mol

10.2 ما كتلة غاز Cl_2 بالغرامات موجود في خزان حجمه L عند درجة حرارة 27°C وتحت ضغط 3.05 atm علماً بأن الكتلة الذرية له تسلوي 35.5 g/mol .

11.2 ما الكتلة المولية لعينة غاز كتلتها 0.961 atm وحجمها 1.25 L تحت ضغط 27°C وعند درجة حرارة 27°C .


12.2 باللون ارصاد جوي يحتوي على 250 L غاز الهيليوم عند 22°C وتحت ضغط 740 mmHg . يتغير حجم هذا البالون تبعاً للظروف الجوية وينفجر عندما يصل حجمه 400 L وضغط 0.475 atm فعند أي درجة سيليزية سينفجر.

13.2 فسر الاجابة
1 - اذا قمت برحـلة بدرجتك في احد ايام الصيف شديد الحرارة . هل تتوقع ان يرتفع الضغط داخل اطار دراجتك في بداية الرحلة ام نهايتها .

2 - اذا سمحـت بتسريب بعض الهواء من الاطار المنفوخ تماماً في دراجتك بعد استعمالها فهل هذا الهواء سيكون بارداً ام دافئاً .

المعادلات والحسابات الكيميائية

Chemical Equations and Calculations



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

يتوصلا إلى مفهوم المعادلة الكيميائية.

يكتب المعادلة الكيميائية ويضيف الرموز التي تدل على طبيعة المواد وظروف التفاعل.

يعرف المعلومات التي تعطيها المعادلة الكيميائية المتوازنة.

يحسب عدد المولات من معادلة التفاعل.

يحسب كتل المواد من معادلة التفاعل.

يحسب حجوم الغازات من معادلة التفاعل.

يعين المادة المتفاعلة المحددة للناتج ، والمادة التي تكون بكمية كبيرة.

يحسب النسبة المئوية للناتج.

ان للحسابات الكيميائية اهمية بالغة في حياتنا ، حيث تحدد نسب المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعل الكيميائي . ان معرفتنا للنسبة التي تتفاعل فيها المواد المختلفة تمكنا من حساب كمية المواد الناتجة، او مقدار ما يلزم من احدى المواد المتفاعلة لتفاعل مع كمية معينة من مادة اخرى . يعتمد الكيميائيون في حساب كميات المواد المتفاعلة والناتجة على المعادلة الكيميائية الموزونة . وستطرق في هذا الفصل الى كيفية الاستفادة من المعادلة الكيميائية الموزونة في اجراء الحسابات الكيميائية لمعرفة النسب الكمية الصحيحة للمواد المتفاعلة بالإضافة الى حساب كميات المواد الناتجة من التفاعل .

3 - 2 المعادلة الكيميائية ومدلولها


المعادلة الكيميائية : هي طريق مختصر للتعبير عن تفاعل كيميائي بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية . ويبيّن الجدول (3-1) الرموز المستخدمة في كتابة المعادلة الكيميائية والتي بواسطتها يمكن الحصول على معلومات اضافية تساعدننا في اجراء الحسابات الكيميائية .

الجدول 1-3 الرموز المستخدمة في كتابة المعادلة الكيميائية

استخدامه	الرمز
للفصل بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لتفاعل للدلالة على المادة الصلبة، وهو مختصر لكلمة Solid	→ (s)
للدلالة على المادة السائلة، وهو مختصر لكلمة Liquid	(l)
للدلالة على المادة الغازية، وهو مختصر لكلمة Gas	(g)
للدلالة على محلول المائي، وهو مختصر لكلمة aqueous	(aq)
للدلالة على تسخين المواد المتفاعلة.	حرارة او Δ
للدلالة على استخدام عامل مساعد (البلاتين)، ويمكن كتابة العامل المساعد تحت السهم ايضاً.	Pt

3 - المعلمات التي تعطيها المعادلة الكيميائية المتوازنة

يمكن الحصول على معلومات عديدة من معادلة التفاعل الموزونة ، كما في تفاعل تحضير غاز الامونيا حسب المعادلة الآتية :



والتي نحصل منها على المعلومات المدرجة في الجدول (2 - 3) :

الجدول 2-3 المعلمات التي نحصل عليها من المعادلة

غاز النتروجين $\text{N}_2 \text{ (g)}$	غاز الهيدروجين $3\text{H}_2 \text{ (g)}$	غاز الامونيا $2\text{NH}_3 \text{ (g)}$	1- معرفة طبيعة المواد المتفاعلة والناطة
1 جزيء	3 جزيء	2 جزيء	2- معرفة العدد النسبي للجزيئات
1 مول	3 مول	2 مول	3- معرفة العدد النسبي للموارات
28 g	6 g	34 g	4- معرفة النسبة بين كتل المواد
1 حجم	3 حجم	2 حجم	- 5 معرفة النسبة بين حجوم الغازات اذا كانت جميعها مقاسة تحت نفس الظروف من ضغط ودرجة حرارة
22.4 L	67.2 L	44.8 L	معرفة النسبة بين حجوم الغازات اذا كانت مقاسة تحت الظروف القياسية (STP)

توضيح النقاط في الجدول (2 - 3) :

1- معرفة طبيعة المواد المتفاعلة والناطة

يدل الرمز (g) على ان المادة بشكل غاز ، اي ان المعادلة تعبّر عن تفاعل غاز النتروجين مع غاز الهيدروجين لتكوين غاز الامونيا.

2 - معرفة العدد النسبي للجزيئات

ان الصيغة الجزيئية تعبر عن جزيء واحد من المادة، اي ان التفاعل بين جزيء واحد من النتروجين N_2 مع ثلاث جزيئات من الهيدروجين H_2 لتكوين جزيئين من الامونيا $2NH_3$.

ان النسبة بين عدد جزيئات N_2 الى H_2 هي 1 : 3

وان النسبة بين عدد جزيئات N_2 الى NH_3 هي 1 : 2

وان النسبة بين عدد جزيئات H_2 الى NH_3 هي 2 : 3

وهكذا بقية النسب.

3 - معرفة العدد النسبي للمولات

يمكن استخدام (المول) بدل (جزيء) للتعبير عن المادة،


فتكون

النسبة بين عدد مولات N_2 الى H_2 هي 1 : 3 أو $\frac{1 \text{ mol } N_2}{3 \text{ mol } H_2}$

والنسبة بين عدد مولات NH_3 الى N_2 هي $\frac{2 \text{ mol } NH_3}{1 \text{ mol } N_2}$

والنسبة بين عدد مولات H_2 الى NH_3 هي $\frac{3 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol } NH_3}$

وهكذا بقية النسب.



ان استبدال الجزيء بالمول يمكن توضيحه كما يأتي :
نلاحظ في التفاعل ان جزيء واحد من N_2 يتفاعل مع ثلاث جزيئات من H_2 لتكوين جزيئين من NH_3 ، واذا ضربنا طرفي المعادلة بعد افوکادور فنحصل على :

تفاعل عدد افوکادور و من جزيئات N_2 مع $3 \times$ عدد افوکادور من جزيئات H_2 لتكوين $2 \times$ عدد افوکادور من جزيئات NH_3 ،
ولما كان عدد افوکادور و من جزيئات ايّة مادة يمثل مول واحد من تلك المادة لذلك يمكن القول بـ :
مول واحد من N_2 يتفاعل مع ثلاثة مولات من H_2 لتكوين مولين من NH_3 .

4 - معرفة النسبة بين كتل المواد

تحسب كتلة المادة في معادلة التفاعل من معرفة عدد المولات والكتلة المولية وبنطبيق القانون الآتي :

$$m(g) = n(mol) \times M(g/mol)$$

حيث: m = الكتلة بالغرام

n = عدد المولات

M = الكتلة المولية

حساب كتلة N_2 في معادلة التفاعل: نحسب أولاً الكتلة المولية

لـ N_2 من جدول الكتل الذرية *

$$M(N_2) = 2 \times 14 = 28 g/mol$$

ثم نحسب كتلة N_2 في معادلة التفاعل بتطبيق القانون:

$$m(g) = n(mol) \times M(g/mol)$$

$$m(g) = 1 \cancel{mol} \times 28 \frac{g}{\cancel{mol}} = 28 g N_2$$

تمرين (1-3)

احسب الكتلة بالغرام لكل مما يأتي:

أ - 1.75 mol من الماء .

ب - 14.8 mol من حامض الكبريتيك.

ولحساب كتلة H_2 في معادلة التفاعل نتبع نفس طريقة حساب كتلة N_2 ، نحسب أولاً الكتلة المولية لـ H_2 من جدول الكتل الذرية

$$M(H_2) = 2 \times 1 = 2 g / mol$$

ثم نحسب كتلة H_2 في معادلة التفاعل

$$m(g) = 3 \cancel{mol} \times 2 \frac{g}{\cancel{mol}} = 6 g H_2$$

وبنفس الطريقة نحسب كتلة NH_3 ، حيث نحسب أولاً الكتلة المولية لـ NH_3

$$M(NH_3) = (1 \times 14) + (3 \times 1) = 17 g / mol$$

ثم نحسب كتلة NH_3 من معادلة التفاعل

$$m(g) = 2 \cancel{mol} \times 17 \frac{g}{\cancel{mol}} = 34 g NH_3$$

* عزيزي الطالب يمكنك الحصول على قيم الكتل الذرية للعناصر من الجدول (3) في نهاية الكتاب عند حل للامثلة والتمارين والاسئلة .

النسبة بين كتلة NH_3 الى N_2 = $\frac{34 \text{ g NH}_3}{28 \text{ g N}_2}$ وهذا بقية النسب.
مجموع كتل المواد المتفاعلة : $28 \text{ g N}_2 + 6 \text{ g H}_2 = 34 \text{ g}$

كتلة المواد الناتجة : 34 g NH_3

.. مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة وهذا يتفق مع قانون حفظ الكتلة

5 - معرفة النسبة بين حجوم الغازات

يمكن التعبير عن حجم الغاز بأية وحدة للحجم مثل لتر(L)
او ملتر (mL) ، أو سنتيمتر مكعب (cm^3) ،

النسبة بين حجم H_2 الى N_2 = $\frac{3\text{L H}_2}{1\text{L N}_2}$ وهذا بقية النسب .

تمرين (2-3)

احسب حجم ثلات مولات من غاز ثنائي اوكسيد الكاربون و mol 2.75 من غاز كبريتيد الهيدروجين بوحدة اللتر تحت الظروف القياسية (STP).

وكما مر علينا سابقاً في الفصل الاول والثاني ان مول واحد من اي غاز يحتل حجما مقداره L 22.4 (22400 mL) تحت الظروف القياسية وعليه يحسب حجم الغاز مقاس تحت الظروف القياسية (STP) بتطبيق القانون الآتي :

$$V(L) = n(\text{ mol}) \times 22.4 \left(\frac{\text{L}}{\text{mol}} \right)$$

نحسب حجم N_2 :

$$V_{\text{N}_2} = 1(\text{ mol}) \times 22.4 \left(\frac{\text{L}}{\text{mol}} \right) = 22.4 \text{ L}$$

نحسب حجم H_2 :

$$V_{\text{H}_2} = 3(\text{ mol}) \times 22.4 \left(\frac{\text{L}}{\text{mol}} \right) = 67.2 \text{ L}$$

نحسب حجم NH_3 :

$$V_{\text{NH}_3} = 2(\text{ mol}) \times 22.4 \left(\frac{\text{L}}{\text{mol}} \right) = 44.8 \text{ L}$$

مجموع حجوم الغازات المتفاعلة :

$$22.4 \text{ L N}_2 + 67.2 \text{ L H}_2 = 89.6 \text{ L}$$

حجم الغاز الناتج

لا يشترط ان تتسلوى حجوم الغازات المتفاعلة مع حجوم الغازات الناتجة وذلك بسبب اختلاف كثافات الغازات .

3 - 4 الحسابات باستخدام المعادلات الكيميائية

3 - 4 - 1 حساب عدد المولات :

يمكن حساب عدد المولات المجهولة لايّة مادة متفاعلة او ناتجة في معادلة التفاعل من عدد مولات مادة اخرى معلومة في المعادلة الكيميائية الموزونة ، ومن نسبة عدد المولات للمادتين من معادلة التفاعل الموزونة والتي تسلوي :

$$\frac{\text{عدد مولات المادة المجهولة}}{\text{عدد مولات المادة المعلومة}}$$

مثال 3 - 1 :

للتفاعل الآتي :



احسب : أ : عدد مولات H_2 الناتجة من تفاعل Na 0.145 mol

ب : عدد مولات H_2O اللازمة لتكوين 0.75 mol NaOH

الحل :

المعلوم : 0.75 mol NaOH و 0.145 mol Na

المجهول : mol H_2O و mol H_2

أ - معامل التحويل :



$$\frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Na}}$$

عدد مولات H_2 الناتجة من تفاعل 0.145 mol Na تسلوي

$$= 0.145 \text{ mol Na} \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Na}} = 0.072 \text{ mol H}_2$$

ب - معامل التحويل :



$$\frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{2 \text{ mol NaOH}}$$

عدد مولات H_2O اللازمة لتكوين 0.75 mol NaOH تسلوي

$$= 0.75 \text{ mol NaOH} \times \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{2 \text{ mol NaOH}} = 0.75 \text{ mol H}_2\text{O}$$



تفاعل تقطير الماء على الصوديوم،
تفاعل شديد يؤدي إلى تحرر غاز
الهيدروجين واحتراقه مباشرة .

يتكون كلوريد الصوديوم بواسطة التفاعل التالي الحاصل بين الصوديوم والكلور :




ما عدد مولات NaCl الناتجة من تفاعل 3.4 mol من الكلور تفاعلاً تماماً مع الصوديوم .

الحل :

المعلوم : 3.4 mol Cl_2

المجهول : mol NaCl

معامل التحويل :



$$\frac{2 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ mol Cl}_2}$$

عدد مولات NaCl تسلوي

$$= 3.4 \cancel{\text{ mol Cl}_2} \times \frac{2 \text{ mol NaCl}}{1 \cancel{\text{ mol Cl}_2}} = 6.8 \text{ mol NaCl}$$

مثال 3 – 3 :

كم عدد مولات اوكسيد الصوديوم التي يمكن تحضيرها من تفاعل 4.8 mol من الصوديوم حسب المعادلة الموزونة الآتية :



الحل :

المعلوم : 4.8 mol Na

المجهول : $\text{mol Na}_2\text{O}$

معامل التحويل :



$$\frac{2 \text{ mol Na}_2\text{O}}{4 \text{ mol Na}}$$

عدد مولات Na_2O الناتجة من تفاعل 4.8 mol من الصوديوم تسلوي

$$= 4.8 \cancel{\text{ mol Na}} \times \frac{2 \text{ mol Na}_2\text{O}}{4 \cancel{\text{ mol Na}}} = 2.4 \text{ mol Na}_2\text{O}$$



3 - 4 - 2 : حساب كتل المواد

نحتاج الى تطبيق ثلاث خطوات هي:

الخطوة الاولى :

نحسب عدد مولات المادة التي كتلتها معلومة في المعادلة ولنفترض انها المادة A ، وذلك من حساب كتلتها المولية او لاً من جدول الكتل الذرية للعناصر، ثم نطبق القانون الآتي لحساب

عدد مولاتها :

$$n \text{ (mol)} = \frac{m \text{ (g)}}{M \text{ (g/mol)}}$$


الخطوة الثانية :

نحسب عدد المولات المجهولة للمادة الاخرى ولنفترض انها B من عدد مولات المادة المعلومة A وبتطبيق القانون الآتي:

$$\text{مولات المادة} = \text{المولات المعلومة للمادة} \times \text{نسبة المولات}$$

او حسب المخطط الآتي :

النسبة المولية



الخطوة الثالثة :

نحسب الكتلة المجهولة للمادة B وذلك من حساب كتلتها المولية او لاً من جدول الكتل الذرية ومن عدد مولاتها المحسوبة في الخطوة الثانية وبتطبيق القانون الآتي:


$$m \text{ (g)} = n \text{ (mol)} \times M \text{ (g/mol)}$$

ملاحظة :

1 - يمكن الاستغناء عن تطبيق الخطوة الاولى والبدء بتطبيق الخطوة الثانية مباشرة، اذا كان المعلوم في المعادلة عدد مولات المادة بدلاً من كتلتها.

2 - يمكن الاستغناء عن تطبيق الخطوة الثالثة اذا كان المجهول في المعادلة عدد مولات المادة وليس كتلتها.

احسب عدد غرامات CO_2 الناتجة من حرق 500 g من C_8H_{18} حسب المعادلة الآتية :



الحل :

تمرين (4-3)

يحترق ثنائي كبريتيد الكربون في الأوكسجين حسب المعادلة الآتية :
 $\text{CS}_{2(l)} + 3\text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{SO}_{2(g)}$
 كم مولاً يتكون من كل ناتج عند تفاعل 48.0 g من O_2 ؟

المعلوم : كتلة C_8H_{18} تساوي 500 g

$$\frac{16 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}} = \text{نسبة المولات}$$

المجهول: عدد غرامات CO_2

الخطوة الأولى : نحسب اولاً الكتلة المولية لـ C_8H_{18} من جدول الكتل الذرية للعناصر.

$$M(\text{C}_8\text{H}_{18}) = (8 \times 12) + (18 \times 1) = 114 \text{ g/mol}$$

ثم نحسب عدد مولات C_8H_{18} بتطبيق القانون الآتي :

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{500 \cancel{\text{g}}}{114 \cancel{\text{g/mol}}} = 4.39 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}$$

الخطوة الثانية: نحسب عدد مولات CO_2 الناتجة من تفاعل 4.39 mol من C_8H_{18} و بتطبيق القانون :

مولات CO_2 = عدد مولات C_8H_{18} × نسبة عدد المولات للمادتين

$$n(\text{mol}) = 4.39 \text{ mol C}_8\text{H}_{18} \times \frac{16 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol C}_8\text{H}_{18}} = 35.12 \text{ mol CO}_2$$

الخطوة الثالثة: نحسب اولاً الكتلة المولية لـ CO_2 من جدول الكتل الذرية

$$M(\text{CO}_2) = (1 \times 12) + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$$


ثم نحسب كتلة CO_2 من تطبيق القانون

$$m(\text{g}) = n(\text{mol}) \times M(\text{g/mol})$$

$$m(\text{g}) = 35.12 \text{ mol CO}_2 \times 44 \frac{\text{g}}{\text{mol CO}_2} = 1545 \text{ g CO}_2$$

مثال 3 - 5 :

احد مكونات الامطار الحامضية هو حامض النتریک الذي يتكون نتيجة تفاعل NO_2 مع الاوكسجين وماء الامطار وحسب التفاعل الاتي :



ما هي كمية HNO_3 الناتجة من تفاعل g 1500 من NO_2 مع كمية كافية من الاوكسجين والماء ؟

الحل :

المعلوم : كتلة NO_2 تساوي g 1500

$$\frac{4 \text{ mol HNO}_3}{4 \text{ mol NO}_2} = \text{نسبة المولات}$$

المجهول: كتلة HNO_3

الخطوة الاولى: نحسب اولاً الكتلة المولية لـ NO_2 من جدول الكتل الذرية للعناصر.

$$M(\text{NO}_2) = (1 \times 14) + (2 \times 16) = 46 \text{ g/mol}$$

ثم نحسب عدد مولات NO_2 بتطبيق القانون الاتي :

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{1500 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 32.6 \text{ mol NO}_2$$

الخطوة الثانية: نحسب عدد مولات HNO_3 المتفاعلة مع 32.6 من NO_2 وبنفس طريقة المقادير :

نسبة عدد المولات للمادتين $\times \text{NO}_2$ عدد مولات HNO_3 = مولات

$$n(\text{mol}) = 32.6 \text{ mol } \cancel{\text{NO}_2} \times \frac{4 \text{ mol HNO}_3}{4 \text{ mol } \cancel{\text{NO}_2}} = 32.6 \text{ mol HNO}_3$$

الخطوة الثالثة: نحسب كتلة HNO_3 من كتلته المولية (63 g/mol)

وعدد مولاته وحسب الاتي :

$$m(\text{g}) = 32.6 \text{ mol } \cancel{\text{HNO}_3} \times 63 \frac{\text{g}}{\text{mol } \cancel{\text{HNO}_3}} = 2054 \text{ g HNO}_3$$

تمرين (5-3)

يحضر الفسفور صناعياً من تفاعل فوسفات الكالسيوم وثنائي اوكسيد السليكون والفحم في فرن كهربائي حسب المعادلة الآتية :




احسب :

أ: عدد غرامات P_4 الناتجة من تفاعل

$$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \text{ من 1.0 mol}$$

ب: عدد مولات P_4 الناتجة من تفاعل

$$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \text{ من 62.0 g}$$



احسب عدد مولات O_2 الناتجة من تسخين g 1.65 من $KClO_3$

حسب المعادلة الآتية :




الحل :

المعلوم : 1 - كتلة $KClO_3$ تسلوي g 1.65

$$\frac{3 \text{ mol } O_2}{2 \text{ mol } KClO_3} = \frac{\text{نسبة عدد المولات}}{\text{الجهول: عدد مولات } O_2}$$

المجهول: عدد مولات O_2

الخطوة الاولى: نحسب او لا الكتلة المولية لـ $KClO_3$ من جدول الكتل الذرية



$$\begin{aligned} M(KClO_3) &= (1 \times 39) + (1 \times 35.5) + (3 \times 16) \\ &= 122.5 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

ثم نحسب عدد مولات $KClO_3$ من تطبيق القانون:

$$n(\text{mol}) = \frac{m(\text{g})}{M(\text{g/mol})}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{1.65 \text{ (g)}}{122.50 \text{ (g/mol)}} = 0.013 \text{ mol } KClO_3$$

استعمال غاز الأستيلين لتوليد الشعلة الأوكسي أسيتيلينية المستخدمة في قطع ولحם المعادن .

الخطوة الثانية: نحسب عدد مولات O_2 من تطبيق القانون :

$$n(\text{mol}) = 0.013 \text{ mol } KClO_3 \times \frac{3\text{mol } O_2}{2 \text{ mol } KClO_3} = 0.02 \text{ mol } O_2$$

3 - 4 - 3 المادة المتفاعلة المحددة للناتج

علمنا بان معادلة التفاعل الموزونة تعطينا النسبة بين عدد المولات للمواد الناتجة وعدد المولات للمواد المتفاعلة، كما في التفاعل الاتي :




ان التفاعل يحصل بنسبة 11mol من N_2 الى 31mol من H_2 لتكوين 21mol من NH_3 . فعند اجراء التفاعل بخلط 11mol من N_2 مع 31mol من H_2 فان المادتين تتفاعلان بشكل كامل لأن نسبة مولاتها الموضوعة في التفاعل مطابقة الى نسبة مولاتها في المعادلة الكيميائية الموزونة، وينتج من التفاعل NH_3 من 21mol.



سحابة من غاز الامونيا المتكتف تحيط بسطح كوب زحل.

اما اذا اجري التفاعل بوضع كمية كبيرة من N_2 ، مثلاً 21mol مع 31mol من H_2 ، فان 11mol من N_2 يتفاعل فقط مع 31mol من H_2 وينتج 21mol من NH_3 ، بينما يتبقى 11mol من N_2 غير متفاعل لذلك فان N_2 يكون بكمية كبيرة لانه لا يتتفاعل بشكل كامل بينما يدعى H_2 بالمادة المتفاعلة المحددة للناتج لانه يتتفاعل بشكل كامل وان عدد مولاته الموضوعة في التفاعل تحدد عدد مولات المادة الناتجة .



يمكن تعين المادة المتفاعلة المحددة للناتج بالطريقة الاتية:

- نحسب نسبة عدد مولات المادة الناتجة الى عدد مولات كل مادة من المواد المتفاعلة المعبر عنها في المعادلة الكيميائية.
- نضرب كل نسبة من هذه النسب في عدد مولات كل مادة متفاعلة وحسب المعادلة الكيميائية الموزونة .
- المادة التي تعطي اقل عدد من مولات المادة الناتجة ستكون هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج .

استعمال املاح الامونيا كسماد نتروجيني، اذ ان عنصر النتروجين في هذه الاملاح يساهم في نمو NH_3 من H_2 في النباتات.

أ - نسبة عدد مولات NH_3 الى N_2 حسب معادلة التفاعل :

$$\frac{21\text{mol } NH_3}{11\text{mol } N_2}$$


نسبة عدد مولات NH_3 الى H_2 حسب معادلة التفاعل الموزونة:

$$\frac{21\text{mol } NH_3}{31\text{mol } H_2}$$

ب - نضرب النسب في عدد المولات الموضوعة من N_2 و H_2 وحسب الآتي :

تمرين (7-3)

يحضر نترید المغنيسيوم Mg_3N_2 من تفاعل المغنيسيوم مع النتروجين حسب المعادلة الآتية :



أ - Mg 1.0 mol و Mg_3N_2 4.0 mol غير متفاعل.

ب - N_2 2.0 mol و Mg_3N_2 2.0 mol غير متفاعل.

ج - N_2 3.0 mol و Mg_3N_2 6.0 mol غير متفاعل.

$$2 \text{ mol } N_2 \times \frac{2 \text{ mol } NH_3}{1 \text{ mol } N_2} = 4 \text{ mol } NH_3$$

$$3 \text{ mol } H_2 \times \frac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} = 2 \text{ mol } NH_3$$

ج - بما ان عدد مولات NH_3 الناتجة من تفاعل H_2 اقل من تلك الناتجة من تفاعل N_2 لذا فالهيدروجين هو المادة المتفاعلة المحددة لناتج الامونيا .

مثال 3 - 7 :

افترض التفاعل الآتي :



فإذا ماتم مزج mol 1.8 من التيتانيوم Ti و 3.2 mol من الكلور Cl_2 . ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج ؟

الحل :

المعلوم :

1 - عدد مولات Ti تساوي 1.8 mol

2 - عدد مولات Cl_2 تساوي 3.2 mol

المجهول :

المادة المتفاعلة المحددة للناتج $TiCl_4$

النسبة بين عدد مولات $TiCl_4$ الى Ti في التفاعل

النسبة بين عدد مولات $TiCl_4$ الى Cl_2 في التفاعل

عدد مولات $TiCl_4$ الناتجة من تفاعل Ti

$$1.8 \text{ mol } Ti \times \frac{1 \text{ mol } TiCl_4}{1 \text{ mol } Ti} = 1.8 \text{ mol } TiCl_4$$

عدد مولات $TiCl_4$ الناتجة من تفاعل Cl_2

$$3.2 \text{ mol } Cl_2 \times \frac{1 \text{ mol } TiCl_4}{2 \text{ mol } Cl_2} = 1.6 \text{ mol } TiCl_4$$

بما ان عدد مولات $TiCl_4$ الناتجة من تفاعل Cl_2 3.2 mol اقل من تلك الناتجة من تفاعل Ti 1.8 mol فالمادة Cl_2 هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج .



مثال 3 - 8 :

يحضر كلوريد الصوديوم من تفاعل الصوديوم مع الكلور حسب المعادلة الآتية :



أ - ما المادة المتفاعلة المحددة للناتج ، عند تفاعل 11.2 mol من Na مع 3.2 mol من Cl₂.

ب - احسب عدد مولات NaCl الناتجة.

الحل :

المعلوم :

1 - عدد مولات Na يساوي 11.2 mol

2 - عدد مولات Cl₂ يساوي 3.2 mol

المجهول :

1 - المادة المتفاعلة المحددة للناتج NaCl

2 - عدد مولات NaCl الناتجة.

النسبة بين عدد مولات NaCl إلى Na في التفاعل

$\frac{2 \text{ mol NaCl}}{2 \text{ mol Na}}$

النسبة بين عدد مولات Cl₂ إلى NaCl في التفاعل

$\frac{1 \text{ mol Cl}_2}{2 \text{ mol NaCl}}$

أ - عدد مولات NaCl الناتجة من 11.2 mol من Na

$$11.2 \text{ mol Na} \times \frac{2 \text{ mol NaCl}}{2 \text{ mol Na}} = 11.2 \text{ mol NaCl}$$

عدد مولات NaCl الناتجة من 3.2 mol من Cl₂

$$3.2 \text{ mol Cl}_2 \times \frac{2 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ mol Cl}_2} = 6.4 \text{ mol NaCl}$$

بما أن عدد مولات NaCl الناتجة من تفاعل Cl₂ أقل من تلك الناتجة من تفاعل Na فالمادة Cl₂ هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج .

ب - نحسب عدد مولات NaCl الناتجة من تفاعل 3.2 mol من Cl₂ لأنها المادة المتفاعلة المحددة للناتج وكما في اعلاه :

$$3.2 \text{ mol Cl}_2 \times \frac{2 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ mol Cl}_2} = 6.4 \text{ mol NaCl}$$

تمرين (8-3)

ثنائي أوكسيد السليكون (الكوارتز)

مادة غير نشطة عادة ، لكنها تتفاعل

بسرعة مع فلوريد الهيدروجين

حسب المعادلة الآتية :



فإذا اجري التفاعل بخلط

2.0 mol من HF مع 4.5 mol من SiO₂ .

أ - ما المادة المتفاعلة المحددة

للناتج ؟

ب - ما عدد مولات SiF₄ الناتجة ؟



٤ - ٤ : حساب حجوم الغازات

نتبع الخطوات التالية عندما نريد ان نحسب حجوم الغازات في المعادلة الكيميائية .

الخطوة الاولى : نحسب عدد مولات المادة من كتلتها التي تعطى في السؤال ، وذلك بتطبيق القانون الاتي:

$$n \text{ (mol)} = \frac{m \text{ (g)}}{M \text{ (g/mol)}}$$

او نحسب عدد مولات المادة من حجمها الذي يعطى في السؤال اذا كانت بشكل غاز وذلك بتطبيق القانون العام للغازات :

$$n \text{ (mol)} = \frac{PV}{RT}$$

او نحسب عدد مولات الغاز اذا كان حجمه مقاس تحت الظروف القياسية (STP) ، وبتطبيق القانون :

$$n \text{ (mol)} = \frac{V \text{ (L)} \text{ (at STP)}}{22.4 \text{ (L/mol)}}$$

الخطوة الثانية : نحسب عدد مولات المادة المطلوبة في السؤال من عدد مولات المادة المحسوبة في الخطوة الاولى وبنفس الطريقة السابقة.

الخطوة الثالثة : نحسب كتلة المادة المطلوبة في السؤال من عدد مولاتها المحسوبة في الخطوة الثانية ومن تطبيق

$$m \text{ (g)} = n \text{ (mol)} \times M \text{ (g/mol)}$$

او نحسب حجم الغاز من عدد مولاته المحسوبة في الخطوة الثانية ومن تطبيق القانون :

$$V \text{ (L)} = \frac{nRT}{p}$$

ويمكن حساب حجم الغاز تحت الظروف القياسية (STP) بتطبيق القانون :

$$V \text{ (L)} = n \text{ (mol)} \times 22.4 \text{ (L/mol)}$$

كما ويمكن حساب حجم الغاز المجهول في السؤال من حجم غاز آخر معلوم وذلك باستخدام النسبة بين حجمي الغازين في معادلة التفاعل الموزونة، على ان تكون الحجوم مقاسة تحت نفس الظروف من درجة حرارة وضغط .

مثال 3 - 9 :

يتحدد غاز احادي اوكسيد النتروجين NO مع الاوكسجين لتكوين غازبني اللون من ثنائي اوكسيد النتروجين NO_2 حسب المعادلة الآتية:



احسب حجم NO_2 الناتج من تفاعل L من O_2 مع كمية كافية من NO علماً بان الحجوم مقاسة تحت (STP).

الحل :

المعلوم :

حجم O_2 مقاساً في (STP) يساوي L 34

المجهول :

حجم NO_2 الناتج

النسبة بين عدد مولات NO_2 الى O_2 في التفاعل

وبما ان الحجوم تتناسب تناصباً طردياً مع عدد المولات اذا كانت جميعها مقاسة تحت نفس الظروف في (STP) لذلك فأن

النسبة بين الحجوم ستكون : $\frac{2L \text{NO}_2}{1L \text{O}_2}$

وعليه سيكون حجم NO_2 مساوياً الى :

$$V(L) = 34 L \text{O}_{2(\text{g})} \times \frac{2L \text{NO}_{2(\text{g})}}{1L \text{O}_{2(\text{g})}} = 68 L \text{NO}_{2(\text{g})}$$

مثال 3 - 10 :

احسب حجم O_2 مقاساً في (STP) الذي يمكن الحصول عليه من تسخين 3.5 mol من KNO_3 حسب المعادلة الآتية:



الحل :


المعلوم :

KNO_3 من 3.5 mol

المجهول :

حجم O_2 مقاساً في (STP)


النسبة بين عدد مولات O_2 الى KNO_3 في التفاعل



نلوث الهواء بغاز ثنائي اوكسيد النتروجين (NO_2) ذو اللون البني يشكل خطراً على الحياة.

تمرين (9-3)

يتفاعل الفسفور (P_4) مع الهيدروجين لتكوين غاز الفوسفين (PH_3) حسب المعادلة الآتية



احسب حجم PH_3 الناتج من تفاعل H_2 0.42 L

H₂ 0.42 L

لذا فعدد مولات O_2 الناتجة من تف kali KNO₃ هو :


$$n(\text{mol}) = 3.5 \text{ mol KNO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } O_2}{2 \text{ mol KNO}_3} = 1.75 \text{ mol } O_2$$

احسب حجم O_2 مقاس في (STP) من تطبيق القانون

$$V(L) = n(\text{mol}) \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 1.75 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 39.2 \text{ L}$$

مثال 3 - 11 :

احسب عدد مولات نرات النحاس التي تنتج من تفاعل 4250 mL H₂ تحت (STP) مع كمية كافية من CuO حسب المعادلة الآتية:



الحل :

المعلوم:

حجم H₂ في (STP) يساوي 4250 mL

المجهول :

عدد مولات Cu

1- تحويل حجم H₂ من وحدة mL الى وحدة L

$$V(L) = 4250 \text{ mL H}_2 \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 4.250 \text{ L H}_2$$

2- احسب عدد مولات H₂ من حجمه المقاس في (STP) وذلك

بتطبيق القانون

$$n(\text{mol}) = \frac{V(L) \text{ at STP}}{22.4 \text{ (L/mol)}}$$

$$n(\text{mol}) = \frac{4.250 \text{ L}}{22.4 \text{ (L/mol)}} = 0.19 \text{ mol H}_2$$


3- احسب عدد مولات Cu الناتجة من تفاعل 0.19 mol H₂ ومن

استخدام نسبة عدد المولات من المعادلة :

عدد المولات = عدد المولات المعلومة × نسبة عدد المولات

$$n(\text{mol}) = 0.19 \text{ mol H}_2 \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{1 \text{ mol H}_2} = 0.19 \text{ mol Cu}$$

يتفكك 0.4 mole من كلورات البوتاسيوم بالحرارة حسب المعادلة الآتية



احسب حجم O_2 المتحرر بدرجة 27°C وتحت ضغط 760 Torr

الحل :

المعلوم :

عدد مولات KClO_3 يساوي 0.4 mol

المجهول :

حجم O_2 بدرجة 27°C وتحت ضغط 760 Torr .

1 - احسب درجة الحرارة بوحدات كلفن

$$T(K) = 27^\circ\text{C} + 273 = 300 \text{ K}$$

2 - احسب عدد مولات O_2 الناتجة من تفكك 0.4 mol من KClO_3 ونسبة عدد المولات .

$$n(\text{mol}) = 0.4 \text{ mol } \text{KClO}_3 \times \frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol KClO}_3} = 0.6 \text{ mol O}_2$$


3 - احسب حجم O_2 بدرجة حرارة K 300 وضغط 1 atm (علماً أن $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr}$) من تطبيق القانون العام للغازات .

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V(L) = \frac{0.6 \text{ mol} \times 0.082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \times 300 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 14.76 \text{ L O}_2$$

تمرين (11-3)


تتفكك نترات الامونيوم بالحرارة العالية حسب المعادلة الآتية :



احسب الحجم الكلي للغازات مقاس تحت (STP) وناتجة من تفكك 34 g من NH_4NO_3 .

تمرين (12-3)

للتفاعل الآتي :



احسب

أ - عدد غرامات نترید المغنيسيوم Mg_3N_2 اللازمة لتكوين 5.75 L من الامونيا عند (STP) .

ب - عدد مولات Mg(OH)_2 الناتجة .

3-4-5 النسبة المئوية للناتج Percent yield

عند حساب كتلة المادة الناتجة من معادلة التفاعل الكيميائي الموزونة ومن الكتلة المعلوّمة لمادة متفاعلة، فإن هذه الكتلة تسمى بالنتائج النظري (Theoretical yield) ، وعند إجراء تجربة عملية لتحضيرها وقياس كتلتها عملياً، فإن هذه الكتلة تسمى بالنتائج الحقيقية (الفعلي) (Actual yield) .

يكون الناتج الحقيقي (الفعلي) دائمًا أقل من الناتج النظري
بسبب :

- 1 - عدم اكتمال التفاعل بين المواد المتفاعلة .
- 2 - عند استعمال مواد غير نقيّة تحصل تفاعلات جانبية ينتج عنها مواد غير مرغوب فيها .
- 3 - فقدان كمية من المادة الناتجة عند اجراء عملية الترشيح أو عند نقلها من وعاء الى آخر .
- 4 - عدم دقة قياس كتل المواد المتفاعلة والناتجة .

تحسب النسبة المئوية للناتج من تطبيق القانون الاتي :

$$\text{percent yield} = \frac{\text{Actual yield}}{\text{Theoretical yield}} \times 100\%$$



انتاج الحقول يقاس بالنسبة المئوية للإنتاج، لأن ظروف الانتاج تختلف من سنة الى اخرى وان الانتاج الفعلي يختلف عن الانتاج المتوقع (النظري).

$$\frac{\text{الناتج الحقيقي (الفعلي)}}{\text{الناتج النظري}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية للناتج}$$

مثال 3 – 13 :

افترض التفاعل الاتي :



احسب النسبة المئوية لكلوريد الالمنيوم الناتج من تفاعل 1.5 mol من Al اذا علمت ان كتلته المنتجة فعلياً تساوي g 139.

الحل :

المعلوم : Al 1.5 mol

المجهول : النسبة المئوية لانتاج AlCl_3

نحسب عدد مولات AlCl_3 باستخدام نسبة عدد المولات في المعادلة الموزونة .

$$n(\text{mol}) = 1.5 \text{ mol Al} \times \frac{2 \text{ mol AlCl}_3}{2 \text{ mol Al}} = 1.5 \text{ mol AlCl}_3$$

نحسب كتلة AlCl_3 الناتجة نظرياً من عدد المولات المعلومة

والكتلة المولية لـ AlCl_3 (M(AlCl_3) = 133.5 g/mol)

$$m(\text{g}) = n(\text{mol}) \times M(\text{g/mol}) = 1.5 \text{ mol} \times 133.5 \text{ g/mol} = 200.3 \text{ g}$$

وعليه فالنسبة المئوية للناتج هي

$$\% \text{ AlCl}_3 = \frac{139 \text{ g}}{200.3 \text{ g}} \times 100\% = 69.4\%$$

مثال 3 - :

تتفكم كاربونات الكالسيوم بالحرارة حسب المعادلة الآتية :



1 - ما كتلة CaO المحسوبة نظريا والتي تنتج من تسخين

$$\text{CaCO}_3 \text{ من } 24.8 \text{ g}$$

2 - احسب النسبة المئوية لانتاج CaO اذا كانت كتلته المنتجة فعلياً تساوي g 13.1 علماً بان الكتلة المولية لـ CaCO_3 تساوي

$$100 \text{ g/mol} \text{ و لـ } \text{CaO} \text{ تساوي } 56 \text{ g/mol} .$$

الحل :

المعلوم :

$$24.8 \text{ g} = \text{CaCO}_3 \text{ - 1}$$

$$2 - \text{الناتج الفعلي لـ } \text{CaO} \text{ يساوي } 13.1 \text{ g}$$

3 - الكتلة المولية لـ CaCO_3 تساوي g/mol 100 و لـ CaO تساوي

$$56 \text{ g/mol}$$

المجهول :

1 - الناتج النظري لـ CaO

2 - النسبة المئوية لانتاج CaO

1 - حول كتلة CaCO_3 الى مولات

$$n (\text{mol}) = \frac{24.8 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol } \text{CaCO}_3$$

2 - احسب عدد مولات CaO الناتجة من 0.25 mol من CaCO_3

باستخدام النسب المولية في المعادلة الموزونة .

$$0.25 \text{ mol } \text{CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CaO}}{1 \text{ mol } \text{CaCO}_3} = 0.25 \text{ mol } \text{CaO}$$

3 - احسب كتلة 0.25 mol من CaO (الناتج النظري)

$$m (\text{g}) = 0.25 \text{ mol} \times 56 \text{ g/mol} = 14 \text{ g } \text{CaO}$$

4 - احسب النسبة المئوية لانتاج CaO بتطبيق القانون

$$\frac{\text{الناتج الحقيقى (الفعلى)}}{\text{الناتج النظري}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية للناتج}$$

$$\% \text{ CaO} = \frac{13.1 \text{ g}}{14.0 \text{ g}} \times 100\% = 93.6\%$$

تمرين (13-3)

يتفاعل g 1.68 من الكادميوم مع حامض الهيدروكلوريك المخفف حسب المعادلة الآتية :



1 - احسب عدد غرامات الهيدروجين الناتجة

2 - احسب النسبة المئوية لانتاج الهيدروجين اذا كان انتاجه الفعلي يساوي g 0.025

تمرين (14-3)

يتفاعل g 7.31 من الحديد مع 0.3 mol من حامض الهيدروكلوريك المخفف حسب المعادلة الآتية :



1 - احسب عدد غرامات الهيدروجين الناتجة .


2 - احسب النسبة المئوية لانتاج الهيدروجين اذا كان انتاجه الحقيقي يساوي g 0.22

اسئلة الفصل الثالث


ملاحظة: عند الحاجة لكتل الذرية في بعض الاسئلة راجع ذلك في جداول نهاية الكتاب

- أ- ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج
عند تفاعل 5 g Mg مع 6 g HCl .
ب- ما عدد مولات $MgCl_2$ الناتجة .
ج- ما حجم H_2 الناتج في (STP) .
د- احسب كتلة $MgCl_2$ الناتجة .
هـ- ما حجم H_2 الناتج عند درجة حرارة 2.5 atm وضغط $37^\circ C$


5.3 يحترق الاستيلين بتفاعله مع الاوكسجين لتوليد الشعلة الاوكسي استيلينية، حسب المعادلة الآتية :



- أ- حجم O_2 مقاس في (STP) اللازم للتفاعل مع 55 g من الاستيلين .
ب- عدد جزيئات CO_2 الناتجة من التفاعل .
جـ- كتلة CO اللازم لتفاعل الآتي 6.3



7.3 يحضر كحول الميثيل CH_3OH صناعياً من تسخين غاز احادي اوكسيد الكاربون مع الهيدروجين تحت ضغط عالٍ وبوجود عامل مساعد من اوكسيد الكروم Cr_2O_3 واوكسيد الخارصين ZnO وحسب المعادلة الآتية :



1.26 mol يتفاعل من النحاس مع 0.8 mol من الكبريت لتكوين كبريتيد النحاس حسب المعادلة الآتية :




- أ- ما المادة المتفاعلة المحددة للناتج .
ب- احسب عدد مولات المادة المتبقية بدون تفاعل .

2.3 يُنتج الحديد من تفاعل احتزال اوكسيد الحديد III Fe_2O_3 بواسطة غاز احادي اوكسيد الكاربون ، حسب المعادلة الآتية :



3.3 يتفاعل 50.0 g من ثنائي اوكسيد السليكون SiO_2 مع كمية كافية من الكاربون حسب المعادلة الآتية :




- أ- عدد غرامات كاربيد السليكون SiC الناتجة .
ب- عدد غرامات احادي اوكسيد الكاربون CO الناتجة .

4.3 يحضر غاز الهيدروجين من تفاعل المغنيسيوم مع حامض الهيدروكلوريك المخفف حسب المعادلة الآتية :




8.3 للتفاعل الآتي:



احسب عدد مولات KClO_3 الناتجة من تفاعل 24.7 L من الكلور مقاس في (STP).

14.3 اكتب ثلاث علاقات تعبر عن النسبة بين عدد المولات للمواد في المعادلة الآتية:



9.3 افترض التفاعل الآتي بين الرصاص الصلب و محلول نترات الفضة:



أ - احسب عدد مولات نترات الفضة اللازمة للتفاعل بشكل تام مع 9.3 mol من الرصاص.
ب - احسب عدد مولات Ag الناتجة من تفاعل 28.4 mol من الرصاص بشكل تام.

10.3 في التفاعل التالي، احسب عدد الغرامات الناتجة من كل ناتج عند تفاعل الكميات أدناه بشكل تام :



ب - 4.79 g من Fe_2O_3

11.3 افترض التفاعل الآتي:



ما هي المادة المتفاعلة المحددة للناتج عند مزج الكميات التالية من A و B ؟

أ - 3 mol B و 2 mol A
ب - 75 mol B و 24 mol A

12.3 افترض التفاعل الآتي:



عند استعمال g 11.2 من NiS_2 لتفاعل مع

g 5.43 من O_2 ثم الحصول على g 4.86 من


NiO . جد:

أ - المادة المتفاعلة المحددة للناتج.

ب - الناتج النظري لـ NiO .

ج - النسبة المئوية لناتج التفاعل.

13.3 افترض التفاعل الآتي :



خلط كيميائي g 14.4 من CaO مع g

من CO_2 ، وبعد انتهاء التفاعل جمع هذا


الكيميائي g 19.4 من CaCO_3 . اوجد المادة

المتفاعلة المحددة للناتج والناتج النظري

والنسبة المئوية لناتج لهذا التفاعل .

الكيمياء العضوية

Organic Chemistry





بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :-

- يفرق بين المركبات العضوية وغير العضوية.
- يبرز علاقة الترتيب الالكتروني لذرة الكاربون وقدرتها على تكوين اواصر تساهمية.
- يكتب الصيغة البنائية للتفريق بين المركبات العضوية المختلفة التي لها نفس الصيغة الجزيئية.
- تسمية المركبات العضوية المختلفة وفق نظام التسمية العام ايوباك IUPAC .
- يعرف الخواص الفيزيائية للالكانات والالكينات والالكيانات.
- يصف السلسلة المتتجانسة لمجموعة مركبات عضوية لها صيغة عامة و خواص كيميائية متشابهة وتظهر تدرجها في الخواص الفيزيائية.
- يميز بين المركبات المشبعة وغير المشبعة.
- يدرك اهمية بلمرة الايثيلين في الصناعة وكذلك اهمية المركبات العضوية الاخري في الحياة اليومية.

بدأ التاريخ الحديث للكيمياء العضوية مع بداية القرن التاسع عشر ، وقد وصف العالم فوهلر الذي كان ذا باع طويل في تطوير هذا العلم، بأنه غابة ذات حدود لا نهاية . لقد اتسع ميدان الكيمياء العضوية ومع ذلك أصبحت حدوده أكثر وضوحاً كما ان فهم ما يجري فيه وادراك معانيه في تناول الجميع .
تختص الكيمياء العضوية بدراسة مركبات الكاربون العضوية وطرائق تحضيرها وخصائصها والتي تمس حياتنا اليومية مباشرةً حيث ان هذه المركبات تدخل في الغذاء والدواء والكساء والوقود وتمتاز المركبات العضوية عن المركبات اللاعضوية بصورة عامة بما يأتي :


- 1 - الكاربون عنصر اساس في تركيبها ويليه الهيدروجين وعناصر اخرى مثل الاوكسجين والنتروجين و الكبريت و الفسفور .
- 2 - ان الاوصاف الكيميائية في المركبات العضوية تكون في الغالب تساهمية.
- 3 - معظم المركبات العضوية قابلة للاحتراق والتجزأ بالتسخين لذا تعتبر أهم مصدر للطاقة.
- 4 - تفاعلات المركبات العضوية بصورة عامة بطيئة وانعكاسية.
- 5 - معظم المركبات العضوية تنوب في المذيبات العضوية كالكحول والايثر والبنزين والاسيتون والكلوروفورم .
- 6 - تتميز المركبات العضوية بوجود ظاهرة الجناس وهي ظاهرة ذات اهمية كيميائية وفيزيائية .



تستخدم المركبات العضوية كوقود

2 - 4 الترتيب الالكتروني لذرة الكاربون

ان العدد الذري لذرة الكاربون هو (6) اي يوجد في غلافها الخارجي اربعة الكترونات اي انه نصف مشبع وبعبارة اخرى لا تستطيع ذرة الكاربون فقدان او اكتساب الالكترونات لاشبع غلافها الخارجي لأنها لا تميل الى تكوين آيونات رباعية موجبة



كانت او سالبة لأن ذلك يتطلب طاقة كبيرة وعليه فان نرة الكاربون تساهم بالاكترونات الاربعة لاشباع غلافها الخارجي عن طريق تكوين اربعة او اصر تساهمية وبهذه الصفة الفريدة لنرة الكاربون تصبح لها القدرة على تكوين عدد هائل من المركبات العضوية تكون إما بشكل :


- أ - سلاسل كarbonية مستمرة غير متفرعة .
- ب - سلاسل كarbonية متفرعة .
- ج - سلاسل كarbonية مغلقة حلقة .
- د - سلاسل كarbonية تحتوي على أو اصر مزدوجة .
- هـ - سلاسل كarbonية تحتوي على أو اصر ثلاثية .

ويوضح الشكل (4-1) الانواع المختلفة من السلاسل الكarbonية .

3 - 4 المركبات الوسطية النشطة (Intermediate)

خلال التفاعلات الكيميائية تنشأ او اصر وتنكسر او اصر اخرى ويؤدي انشطار الاصرة الى تكوين مركبات وسطية ذات ثبات منخفض (فعالية عالية) لا تلبث ان تتفاعل مستكملة ما تحتاج اليه من ارتباطات جديدة وعليه فان هناك نوعان من الانشطارات:

1 - الانشطار المتجانس : هو انشطار او انكسار الاصرة التساهمية بين نرتين او مجموعتين بحيث يحتفظ كل جزء بالكترون واحد من الكترونات الاصرة التساهمية وتكون دقائق غير مشحونة ويسمى كل منها بالجزر الحر (Free Radical).




2 - الانشطار غير المتجانس : هو انكسار الاصرة التساهمية بين نرتين او مجموعتين بحيث تحتفظ احداهما بزوج الالكترونات وتحمل الشحنة السالبة (ايون الكاربانيون) بينما تبقى الاخرى حاملة للشحنة الموجبة (ايون الكاربونيوم).



4 - 4 الصيغة التركيبية أو البنائية

وهي الصيغة التي تبين عدد نرات كل عنصر في الجزيء الواحد وترتيبها في الفراغ اي كيفية ارتباط الذرات ونوعها وتكافؤها وان عدد الاوامر المحيطة بكل نرة تسلوي تكافؤ تلك النرة فالصيغة الجزيئية غالباً ماتفشل في تحديد نوعية المركب لوجود اكثر من مركب واحد يشترك في صيغة جزيئية واحدة فمثلاً الصيغة الجزيئية C_2H_6O تمثل كلاً من كحول الأثيل وثنائي مثيل ايثر وهذا الاختلاف في الخواص جاء نتيجة الاختلاف في كيفية ترابط الذرات المكونة لجزيء المادة مع بعضها في الفضاء وتسمى هذه الظاهرة بالجنس ولأجل التمييز بين هذه المركبات المختلفة يجب كتابة الصيغة التركيبية .





ثنائي مثيل ايثر

كحول الايثيل

5 - 4 الهيدروكربونات Hydrocarbons


هي مركبات عضوية تتكون من الكarbon والهيدروجين فقط وتصنف (حسب كون السلسلة الكاربونية مغلقة او مفتوحة او حسب كون المركب مشبع او غير مشبع) الى ما يأتي :

- الاalkانات او البارافينات هي مركبات مشبعة ذات اصارة مفردة قانونها العام (C_nH_{2n+2}) وابسط مركباتها هو غاز الميثان $.CH_4$





جزيء غاز الميثان

2 - الألكيينات او الأوليفينات وهي مركبات غير مشبعة ذات اصارة مزدوجة قانونها العام (C_nH_{2n}) وابسط مركباتها هو الأثيلين . C_2H_4





جزيء غاز الأثيلين



جزيء غاز الاستيلين


3 - الألکاینات او الأستیلينات وهي مركبات غير مشبعة ذات اصارة ثلاثية قانونها العام (C_nH_{2n-2}) وابسط مركباتها هو الأستيلين C_2H_2 او (الايثاين) .



جزيء البنزين

4 - المركبات ذات السلسلة الكاربونية المغلقة او الحلقي منها المشبعة وتدعى الألكان الحلقي مثل الهكسان الحلقي او غير مشبعة فتدعى الکين حلقي وكذلك المركبات الأروماتية او العطرية مثل البنزين ومشتقاته وفيما يأتي مخطط عام لتصنيف الهيدروكاربونات :




الهيدروكاربونات



6-4

الألكانات أو البارافينات Alkanes

هي هيدروكاربونات مشبعة اساس تركيبها نرات الكاربون والهيدروجين التي ترتبط مع بعضها بـأواصر تساهمية مفردة وقوية والقانون العام لها هو (C_nH_{2n+2}) حيث (n) عدد صحيح يمثل عدد نرات الكاربون ومن امثلتها الميثان CH_4 والأيثان C_2H_6 والبروبان C_3H_8 كما في الاشكال التوضيحية الآتية :



پروبان

ایشان

ميثان

ويوضح الجدول 4 - 1 أسماء وتركيب الالكانات العشرة الاولى:

الجدول 4-1 أسماء والصيغ التركيبية للألكانات العشرة الأولى:


الصيغة التركيبية للمركب	اسم المركب	المقطع باللاتينية	عدد ذرات الكاربون
CH_4	ميثان	ميث	C ₁
$\text{CH}_3\text{--CH}_3$	أيثان	أيث	C ₂
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	بروبان	بروب	C ₃
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	بيوتان	بيوت	C ₄
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	بنتان	Bent	C ₅
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	هكسان	هكس	C ₆
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	هبتان	هبت	C ₇
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	اوكتان	اوكت	C ₈
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	نونان	نون	C ₉
$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	ديكان	ديك	C ₁₀

تشكل افراد الألكانات متسلسلة متراكمة وتعني مجموعة المركبات العضوية المستمرة المتشابهة في التركيب الأساس والقانون العام وطرق التحضير والخواص الكيميائية والمترددة في كتلها المولية وخصائصها الفيزيائية والتي يختلف كل فرد فيها عن سابقه او لاحقه بوحدة بنائية هي CH_2 - كما في السلسلة اعلاه .


٤-٦-١ أصناف ذرات الكarbon

تصنف نرات الكاربون حسب ارتباطها مع بعضها في المركبات الى انواع الآتية :


١- نرة الكاربون الأولية وهي الذرة التي ترتبط بها نة كاربون




2- نرة الكاربون الثانوية وهي الذرة التي ترتبط بها نترات الكاربون




حدد اصناف نرات الكاربون والهيدروجين في المركب الاتي :



3- نرة الكاربون الثالثية وهي النزة التي ترتبط بها ثلاثة نرات البروبان




4) ذرة الكاربون الرابعة وهي الذرة التي ترتبط بها أربع ذرات كاربون أخرى



ذلك فان نوع نرة الهيدروجين يرتبط بنوع نرة الكاربون المرتبطة معها، فالهيدروجين المرتبط بذرة كarbon أولية يسمى هيدروجين اولي والذى يرتبط بذرة كarbon ثانية يسمى بالهيدروجين الثانوى وبنفس الطريقة هناك هيدروجين ثالثى ولا يوجد هيدروجين رابعى ولا توجد نرة كarbon خامسية

٦١




4-6-2 تسمية الالكانات

ان الالكان الذي سلسلة الكاربون فيه مستمرة غير متفرعة له تسمية شائعة وقديمة تبدأ بالحرف n (نظامي) ثم يذكر اسم الالكان المقابل مثل :




(ن - بروبان) n - Propane

اما الالكان الذي يحتوي على المجموعة المتفرعة




له تسمية شائعة وقديمة تبدأ بكلمة آيزو(iso) ثم يذكر اسم



(آيزو بيوتان) Iso butane


اما الالكان الذي يحتوي على نرة كarbon رابعية له ايضاً تسمية شائعة وقديمة تبدأ بكلمة نيو(neo) ثم يذكر اسم الالكان المقابل مثل:



(نيوبنتان) Neo Pentane

4-6-3 مجاميع الالكيل

تعرف المجموعة المتبقية من الالكان بعد حذف نرة الهيدروجين منه بالالكيل(Alkyl) الذي قانونه العام $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ والصيغة العامة (-R) و يوضح الجدول (4-2) مجاميع الالكيل والالكانات المشتقة منها . يكتب جذر الالكيل عادة بوضع اصارة تساهمية للارتباط بدل نرة الهيدروجين الذي فقدها الالكان وعلى الصورة الآتية :



الجدول 4-2 مجاميع الالكيل و تسمياتها

الكيل Alkyl			الكان Alkane	
Methyl CH_3-	مثيل		Methane CH_4	ميثان
Ethyl C_2H_5-	اثيل		Ethane C_2H_6	ايثان
	CH_3-CH_2-			CH_3-CH_3
Propyl C_3H_7-	بروبيل		Propane C_3H_8	بروبان
n propyl $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$			n-Propane $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	
Iso Propyl $\text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3$				
	ايزوبروبيل			

هل تعلم

ان الفرق بين الالكان و مجموعة الالكيل المشتقة منه هي نرة هيدروجين واحدة، وان اسم المجموعة اشتقت من اسم الالكان بتغيير المقطع (ان) من اسم الالكان وابداله بالقطع (يل) مثل بروبان يصبح بروبيل .

مثال 4-1 :

ما الصيغة الجزيئية للالكان الذي يتكون من 4 نرات كاربون ؟

الحل :

بما ان القانون العام للالكانات ($\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$)

$n =$ عدد نرات الكاربون وتسلوبي 4 وان عدد نرات الهيدروجين

$$\text{H}_{2n+2} = 2 \times 4 + 2 = 10$$


ستكون الصيغة الجزيئية هي C_4H_{10}

4-6-4 نظام التسمية العام (ايوباك) IUPAC للالكانات


قواعد التسمية :

تمرين (4-2)
ما الصيغة الجزيئية للالكان الذي يتكون من 10 نرات كاربون ؟

- نختار اطول سلسلة كarbonية مستمرة من نرات الكاربون ونبداً بترميم نرات الكاربون من الطرف القريب لاقرب تفرع فيها ويعطى لها اسم الالكان المقابل .



- نعين موقع مجامي الالكيل او المجاميع المعوضة بارقام نرات الكاربون المرتبطة بها .



2-Methyl butane
(2 - مثيل بيوتان)


-3- عند وجود أكثر من مجموعة الكلية أو معاوضة واحدة ترتب حسب الحروف الهجائية اللاتينية عند التسمية.

٤- استخدام الفواصل بين الارقام (،) والخط (-) بين الرقم والاسم في التسمية.

5- للدلالة على عدد المجاميع المعرفة المتماثلة (المتشابهة) نستخدم المقاطع الآتية :


(mono)	حادي
(di)	ثنائي
(tri)	ثلاثي
(tetra)	رباعي
(penta)	خمساني

ولغرض فهم قواعد التسمية نورد الامثلة الآتية :




2,2–Dimethyl propane

2،2- ثنائی مثیل بروپان



2,2,3-Tri methyl pentane

3-Methyl heptane



2-Chloro-3-methyl pentane

2- کلو، و -3- مثل بنتان

اعط اسماء كل من الصيغ
التركيبية الاتية :

(1)

$$\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}} - \underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$$

(2)

$$\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_2}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}$$


اكتب الصيغ التركيبية لكل من الاسماء الاتية (4-4)

- 1- كلورو - 2- مثيل بيوتان
- 2- ثنائي مثيل بنتان

Isomerism 5-6 الجناس


هي ظاهرة وجود مركبان (أو أكثر) في الطبيعة لهما نفس الصيغة الجزيئية لكنهما يختلفان في الخواص الفيزيائية والكيميائية بسبب اختلافهما في الصيغة التركيبية (الهيكل البني). ويبتدأ الجناس من جزيء البيوتان C_4H_{10} , حيث هناك احتمالان لارتباط نرات الكربون مع بعضها

الأحتمال الأول : ارتباط نرات الكربون بسلسلة مستمرة غير متفرعة



(n - Butane) ن - بيوتان

الاحتمال الثاني : ارتباط نرات الكربون بمجموعة متفرعة



(2-Methyl propane) 2 - مثيل بروبان

اما في التسمية القديمة فيسمى آيزوبيوتان Iso butane كما تم ذكره في اعلاه ونلاحظ انه توجد صيغتان تركيبيتان مختلفتان لصيغة جزيئية واحدة للبيوتان وان المركبين الموجودين في الطبيعة يختلفان في الخواص الفيزيائية والكيميائية لاختلاف الصيغة التركيبية

مثال 4-2 :


اكتب متجانسات الالكان C_5H_{12} وسمها حسب التسمية النظامية.

الحل :

المركب C_5H_{12} له ثلاث متجانسات



(n -Pentane) ن - بنتان




(2-Methyl butane) 2 - مثيل بيوتان



(2,2 - Di methyl propane) 2، 2 - ثنائي مثيل بروبان

4-6-6 الخواص الفيزيائية للألكانات

1 - قابلية الذوبان : ان جزيئات الألكانات غير قطبية لا تذوب بالمذيبات القطبية كالماء لكنها تذوب في المذيبات العضوية (غير القطبية) كالبنزين ورباعي كلوريد الكاربون



هل تعلم

تنوب (تمتزج) الألكانات في مذيبات غير قطبية كالزيوت والدهون. ولهذا السبب يكون من الخطير التعرض لابخرة الألكانات اذا انها تسبب تلف انسجة الرئة لانها تعمل على اذابة المواد الدهنية المكونة لاغشية الخلايا .

الشكل(4-2) العلاقة بين درجة غليان الألكانات وعدد ذرات الكربون فيها .

2 - درجة الغليان : تزداد درجة غليان الألكانات بارتفاع كتلتها المولية ونجد ان الميثان والأيثان والبروبان والبيوتان غازات في درجة حرارة الغرفة في حين ان البقية سوائل. وعندما تزداد كتلتها المولية اكثراً فاكثر تزداد درجة الغليان اي عندما يصبح عدد ذرات الكربون للجزيء (18) نرة فاكثر تصبح الألكانات مواد صلبة . ان هذا التأثير في درجة الغليان يعزى الى وجود قوى تجاذب فاندرفالز الضعيفة وهذه القوى تزداد مع صغر المسافة البينية بين الجزيئات ومع ارتفاع الكتلة المولية للألكانات ذات السلسلة المستمرة تزداد المساحة السطحية للجزئيات التي تؤدي الى زيادة قوة التجاذب . ولنفس السبب تكون درجة غليان الألكان ذو السلسلة الكarbonية المستمرة (مثل البنتان المستمر) اعلى من نفس المركب ذو السلسلة الكarbonية المتفرعة مثل :

(2) - مثيل بيوتان ()

تمرين (6-4)

اي من المركبات التالية لها اعلى درجة غليان :

- 1) C_5H_{12}
- 2) CH_4
- 3) C_8H_{18}
- 4) C_2H_6


4-6-7 الخواص الكيميائية للألكانات :

هل تعلم

ان استخدام الوقود كمصدر رئيسي للطاقة ادى الى زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكربون في طبقات الجو العليا مما ادى الى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وهي ظاهرة تؤدي الى حدوث تغيرات مناخية يترتب عليها تغيرات في تركيبة الانواع الحيوانية والنباتية بالإضافة الى الاثار الصحية السلبية على الانسان.


أ) التفاعلية الكيميائية : الألكانات اقل تفاعلية من غيرها من المركبات العضوية لكونها مركبات مشبعة جميع او اصرها مفردة وقوية وتحتاج الى طاقة كبيرة لكسرها فهي لا تتفاعل في الظروف الاعتيادية مع الحوامض المركزة كحامض الكبريتيك وحامض النتريل ولا مع القواعد القوية كهيدروكسيد الصوديوم ولا مع العوامل المؤكسدة كبرمنكناط البوتاسيوم .

ب) الاحتراق Combusion : عند حرق الألكانات في الهواء حرقاً تماماً تعطي لهباً ازرقاً غير داخن وتحول الى ثاني اوكسيد الكARBون وبخار الماء ويتحرر مقدار كبير من الطاقة الشكل (3-4) وهذا هو السبب في استعمالها كوقود لوسائل النقل والمحركات في الصناعة ويمكن كتابة المعادلة العامة لاحتراق الألكانات كما يأتي :





ج) التفكك او التكسير الحراري Thermal Cracking :

تحول الألكانات بتأثير الحرارة وبمعزل عن الهواء الى مركبات مشبعة وغير مشبعة وذلك بفصم السلسلة الكARBونية او بفقدان جزيئات الهيدروجين فمثلاً يتفكك البروبان ليعطي احتمالين مختلفين كما في المعادلة الآتية :



تعتبر هذه التفاعلات من الخطوات المهمة في عملية تصفية النفط وفصله الى مكوناته النافعة كوقود الطائرات والسيارات والمحركات الاخرى .

الشكل(4-3) احتراق الألكانات في الهواء ينتج غاز CO_2 وبخار الماء H_2O .




ان هذا التفاعل هو في الحقيقة مجموعة من الخطوات الفرضية والفعلية التي تتكون بها مركبات وسطية تؤدي في النهاية الى المركب النهائي . ولمعرفة الخطوات الحقيقية للعملية لابد ان نلجم الى ما يسمى بـ ميكانيكية التفاعل وهي :


الاحتمال الاول : حصول انشطار متجانس وتكوين مایسمی

بالجذور الحرة ، ثم يعاني الجذر الاكبر عادة انشطار متجانس من نزرة الكاربون المجاورة للتي عانت الانشطار الاول ، وانتقال نزرة H الى الجذر الاخر وتكوين اصرة مزدوجة في الجذر الاكبر وعلى الصورة الاتية :

تمرين (4-7) الاتجاه الحراري





الاحتمال الثاني : انشطار الاصرة ($H-C$) لتكوين جذر حر $-H$ الذي يرتبط مع جذر حر آخر $-H$ ليكونا جزيء H_2 اما الجزء المتبقى فهو جزيء البروبين .



د) تفاعلات التعويض (الأستيدال : Substitution reactions

ونقصد به استبدال نزرة الهيدروجين في الألكان بذرة أخرى كالهالوجين (Br_2 , Cl_2) فمثلاً عند تفاعل الميثان مع الكلور بوجود ضوء الشمس وبالتحديد الاشعية فوق البنفسجية. إن هذا التفاعل لا يتوقف إلا بعد استبدال جميع نزرات الهيدروجين في الميثان بذرارات كلور




ان تفاعلات التعويض من التفاعلات الرئيسية والمميزة للالكترونات. ويمكن ايقاف هذا التفاعل باضافة بعض المواد.

4-6-8 تحضير الألكانات في المختبر


توجد عدة طرق لتحضير الألكانات في المختبر نذكر منها :

1 - بتسخين ملح الصوديوم للحامض الكاربوكسيلي $R-COONa$ مع هيدروكسيد الباريوم او هيدروكسيد الصوديوم حيث نحصل على الكان له عدد نرات كاربون اقل من عدد نرات كاربون الحامض الكاربوكسيلي بواحدة .


فمثلاً : عند تسخين خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم نحصل على غاز الميثان



ولو تم تسخين بروبانوات الصوديوم (CH_3CH_2COONa) مع هيدروكسيد الباريوم $(OH)_2 Ba$ لتم الحصول على الايثان حسب التفاعل الآتي :




2 - يحضر الألكان بطريقة كاشف كرينيارد $R-MgX$ حيث ان كاشف كرينيارد يحضر من معاملة هاليد الألكيل مع فلز المغنيسيوم في مذيب الايثر الجاف حسب المعادلة العامة الآتية :



تمرين (4-8)
حضر غاز البيوتان
من ملح الصوديوم
للحامض الكاربوكسيلي

وكمثال يحضر كاشف كرينيارد من يوديد المثيل CH_3I حسب المعادلة الآتية :




ويحضر الالكان من كاشف كرينيارد بطريقتين :


أ- اذا كان الالكان المطلوب يحتوي على نفس عدد نرات الكاربون الموجودة في كاشف كرينيارد ، يحل الكاشف مائياً لذا تسمى هذه الطريقة بالتحلل المائي لكاشف كرينيارد .



وكمثال على التحلل المائي لكافش كرينيارد تحضير غاز الميثان من كافش كرينيارد وكما يأتي :



ب- تفاعل كاشف كرينيارد مع هاليد الكيل يعطي الكان يحتوي على عدد نرات كاربون اكثر مما موجود في الكاشف بعد نرات الكاربون في هاليد الالكيل.




تمرين (٩-٤) من كلوريد الايثيل وما تحتاج إليه من مواد حضر .
أ) الايثان
ب) البروبان

مثال : 3-4

ب) 2 - مثيل بيوتان أ) ن - بيوتان

الحل:


أ) نحضر اولاً كاشف كرينيارد من كلوريد الايثيل




لزيادة عدد نرات الكاربون والحصول على ن - بيوتان تحتاج الى هاليد الكيل عدد نرات الكاربون فيه يسلوى 2 .



ب) لتحضير 2 - مثيل بيوتان نحتاج الى المركب 2 - كلورو بروبان لزيادة عدد نرات الكاربون في كاشف كريينيلارد



الالكينات Alkenes أو الاوليفينات Olefines 7 - 4




شكل جزيئ الايثيلين

وهي هيدروكربونات غير مشبعة تعتبر ثاني متسلسلة متشاكلة تحتوي افرادها على عدد اقل من نرات الهيدروجين عند مقارنتها بالالكانات . ان كل فرد من هذه المتسلسلة يحتوي على آصرة مزدوجة (Double bond) ويعبر عنها بالقانون العام C_nH_{2n} أو بالصيغ العامة الآتية :



حيث $R = R'$ يعني الكين متناظر و $R \neq R'$ يعني الكين غير متناظر . وتدخل الالكينات تفاعلات الاضافة والاكسدة والاختزال والاحتراق ومن ابسط افراد هذه المتسلسلة هو الايثيلين .



ويمكن كتابته على الصورة $CH_2 = CH_2$

تمرين (10-4)

جميع الصيغ الاتية تمثل جزيئات الکينات باستثناء واحد:-

- 1) C_4H_8
- 2) C_5H_{10}
- 3) C_7H_{16}
- 4) C_6H_{12}

4 - 7 - 1 التسمية العامة للالكينات :

تسمى الالكينات وفق القواعد الآتية :

1 - نختار اطول سلسلة كاربونية مستمرة شرط ان تحتوي على الآصرة المزدوجة.

2 - نبدأ بالترقيم من نرة الكarbon الاقرب الى الآصرة المزدوجة ونعطيها اسم الالكان المقابل . ونستبدل المقطع الاخير (ان) من اسم الالكان بالمقطع (ين) (ene) .



3 - نعين موقع الآصرة المزدوجة ب اختيار اصغر الرقمين الموجودين على الآصرة المزدوجة.

4 - نحدد مجامي الالکيل او المجاميع الأخرى حسب نرات الكarbon المرقمة.

ويبين الجدول (3-4) الاسماء النظامية والقديمة (الشائعة) لبعض الالكينات.

تمرين (11-4)

سمّ مركبات الالكين الاتية وفق نظام التسمية العام :



الجدول 4-3 الاسماء الشائعة والنظامية لبعض الالكينات


الصيغة التركيبية	الاسم النظامي	الاسم الشائع
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	ايثن	اثيلين
$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$	بروبين	بروبلين
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$	1 - بيوتين	بيوتلين
$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	2 - بيوتين	
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_3$	1 - بنتين	بنتلين
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	2 - بنتين	
$\text{CH}_3 - \underset{\substack{ \\ \text{CH}_3}}{\text{CH}} - \text{CH} = \text{CH}_2$	3 - مثيل - 1 - بيوتين	
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\substack{ \\ \text{CH}_3}}{\text{C}} = \text{CH}_2$	2 - مثيل - 1 - بيوتين	

4 - 7 - 2 الجناس الهندسي (جناس التجاور والتقابل أو جناس


سس و ترانس

ذكرنا سابقاً ان الجناس هو ظاهرة تماثل في الصيغة الجزيئية والاختلاف في الصيغة التركيبية والخواص الفيزيائية والكيميائية. يضاف الى ذلك وفي بعض الالكينات ظاهرة اخرى ناتجة عن صعوبة الدوران او البرم حول المزدوجة بسبب اختلاف نوع وترتيب المجاميع حول كل من نرتى كاربون المزدوجة وهذه الظاهرة تمثل بالأشكال الهندسية (سس (cis)، وترانس (trans)). فمثلاً الصيغة التركيبية المتوقعة في الصيغة الجزيئية C_4H_8 بما فيها المتجانسات الهندسية كالاتي:


(A)




(B)




(C)




ان الجناس 2 - بيوتين يعطي متجانسات هندسية وعلى الصورة الاتية :





2 - بيوتين



ترانس - 2 - بيوتين




سس - 2 - بيوتين



ان الشرطين الاساسيين لجعل المركب يعطي جناساً هندسياً هما ان يكون موقع الاصرة المزدوجة وسطية لا طرفية وكذلك عدم وجود تفرع على نرتى كاربون الاصرة المزدوجة، وهذا ما يتحقق 2 - بيوتين .

4 - 7 - 3 الخواص الفيزيائية للألكينات

- 1 - الأفراد الثلاث الأولى منها غازات والبقية سوائل.
 - 2 - تزداد درجة غليانها بزيادة الكتلة المولية لها .
 - 3 - لا تذوب في الماء لكنها تذوب في المذيبات العضوية .
- ويبيّن الشكل (4 - 7) العلاقة بين درجات غليان الألكينات وعدد نرات الكربون في صيغها الجزيئية .



تمرين (4-12)
اكتب متجانسات الألكين C_5H_{10}
وحدد ايهما يعطى متجانسات
هندسية .

الشكل (4-4) العلاقة بين درجات
غليان الألكينات وعدد نرات
الكاربون في صيغتها الجزيئية .

4 - 7 - 4 الكواشف الباحثة عن :

1 - الالكترونات (الكتروفيل Electrophile)

2 - النواة (النيوكلوفيل Neucleophile)


تدعى الدقائق (نرات، أو جزيئات أو أيونات) التي تستطيع استيعاب زوج واحد من الالكترونات اي انها تمتلك اوربيتال فارغ بالكواشف الباحثة عن الالكترونات وتسمى الكتروفيل (Electrophile) أو (حوماض لويس) أما الدقائق (نرات أو جزيئات أو أيونات) التي تستطيع هبة زوج من الالكترونات والمشاركة فيها فتعرف بالكواشف الباحثة عن النواة وتسمى نيوكلوفيل (Neucleophile) أو (قواعد لويس) والجدول 4 - 4 يبين أمثلة عن النوعين من الكواشف.

الجدول 4-4 أمثلة عن الكواشف الباحثة عن الالكترونات والباحثة عن النواة

كواشف بباحثة عن النواة (نيوكلوفيل) (قواعد لويس)	كواشف بباحثة عن الالكترونات (كتروفيل) (حوماض لويس)
آيون الهيدريدي السالب H^- آيون الهايد X^- (F ⁻ , I ⁻ , Cl ⁻ , Br ⁻) آيون الهيدروكسيد OH^- آيون الكاربانيون السالب $-\overset{\text{C}}{\underset{\text{C}}{ }}^-$ الآصرة المزدوجة $-\overset{\text{C}}{\underset{\text{C}}{=}}-$ الآصرة الثلاثية $-\text{C}\equiv\text{C}-$ الامونيا : NH_3	آيون الهيدروجين الموجب H^+ آيون كاربونيوم $-\overset{\text{C}}{\underset{\text{C}}{+}}$ فلوريد البورون BF_3 مجموعة الكاربونيل المستقطبة $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{C}}{=}}-$ كلوريد الالمنيوم AlCl_3

استقرارية آيون الكاربونيوم الموجب :


ان آيون الكاربونيوم الموجب يكون أكثر استقراراً كلما ازدادت عدد المجاميع الدافعة للالكترونات المرتبطة بذرة الكاربون الموجبة. حيث يعتبر آيون الكاربونيوم الثالثي أكثر الانواع استقراراً.



٤ - ٧ - ٥ الخواص الكيميائية للالكينات

الخواص الكيميائية للالكينات هي خواص الأصرة المزدوجة (المجموعة الفعالة التي تعزى إليها التفاعلات الكيميائية للالكينات) وتميل الالكينات لأنشباع الأصرة المزدوجة للوصول إلى حالة أكثر استقراراً وهي حالة المركب المشبع (الالكان) ذو الأصرة التساهمية المفردة. وتحصل حالة الاشباع باضافة نرتين أو مجموعتين إلى نرتين كarbon الأصرة المزدوجة لذلك هناك تفاعلات الاضافة وتفاعلات الاكسدة والاحتراق تدخل الالكينات التفاعلات الآتية :


أ - تفاعلات الاضافة : قبل التطرق إلى تفاعلات الاضافة يجب معرفة قاعدة ملوكوفنيكوف (Markovnikov's rule) ووفق هذه القاعدة يضاف الايون الموجب أولاً إلى نرة الكاربون المرتبطة بالأصرة المزدوجة والحلوية على اكبر عدد من نرات الهيدروجين لتكون آيون كاربونيوم اكثر استقراراً ثم يضاف الايون السالب إلى نرة الكاربون الأخرى.



ومن تفاعلات الاضافة الاتواع الآتية :


١ - اضافة جزيء الهيدروجين (الهدرجة Hydrogenation)

تشبّع الالكينات بتفاعلاتها مع الهيدروجين بوجود عامل مساعد كالبلاتين أو البلاديوم والنحاس وبوجود الحرارة والضغط وحسب التفاعل الآتي :




وهي طريقة صناعية لتحضير الالكانات وهدرجة الزيوت النباتية .

و ميكانيكية تفاعل اضافة الهيدروجين لالكين تكون بتأثير البلاتين فتنشر جزيئه الهيدروجين الى ايون الهيدروجين الموجب و ايون الهيدريد السالب حيث يضاف ايون الهيدروجين الموجب او لاً مكوناً ايون الكاربونيوم ثم يضاف ايون الهيدريد السالب كما موضح كالتالي :




٢ - اضافة الاهلوجينات (الهاجنة) Halogenation

عند اضافة محلول البروم في رابع كلوريد الكاربون (احمر اللون) الى الاصرة المزدوجة نلاحظ اختفاء اللون الاحمر دلالة على تفاعل البروم مع الاصرة المزدوجة وتكوين مركب ثنائي الهاليد وتعتبر هذه العملية طريقة للكشف عن الاصرة المزدوجة. او للتمييز بين الالكان والالكين .



3- اضافة هاليد الهيدروجيني (HCl أو HBr)

وتكون الاضافة حسب المعادلة الآتية :




(13-4) تمرن


ان تفاعل بروميد الهيدروجين مع البروبين يعطي 2 - برومoproبان وليس 1 - برومoproبان، وذلك

4 - اضافة حامض الكبريتيك المركز الى الالكين ثم التحلل المائي للناتج

عند امرار احد الالكينات مثل غاز الايثيلين في حامض الكبريتيك المركز وتحلل الناتج مائياً يتكون الكحول المقابل (كحول الايثيل) وحسب معادلة التفاعل المبسطة الآتية :





يُستعمل هذا التفاعل في الصناعة النفطية لفصل الالكينات عن الالكانات وبعد عملية التكسير الحراري وتعتبر طريقة تجارية لتحضير الكحولات حيث أن المركب الوسطي (كبيريات الايثيل الهيدروجينية) يتحلل مائيًا ليعطي كحول وحامض الكبريتيك المخفف .



هل تعلم
لتفاعل البلمرة اهمية صناعية كبيرة وخاصة الصناعات البلاستيكية كما هو الحال في تحضير المطاط الصناعي والكثير من البوليمرات .

5- **البلمرة**


وهو نوع من تفاعلات الاضافة للالكينات حيث تتضاعف جزيئات الالكين المنفردة والتي تدعى مونمر (Monomer) بالاتحاد مع بعضها بوجود عامل مساعد مناسب (مثل حامض الكبريتيك) لتكوين جزيء واحد مشبع ذا كتلة مولية كبيرة تدعى بوليمر (Polymer) حيث تنتج مادة بلاستيكية فمثلاً ينتج من تفاعل جزيئات الايثيلين مادة بولي اثيلين .



ب - الاحتراق: تحرق الالكينات في الهواء بلهب داخن (لان نسبة الكاربون في الالكين اكبر مما في الالكان) مكونه CO_2 وبخار الماء ومحررة طاقة .



ج - الاكسدة: عند مزج محلول مائي مخفف(بلارد) لبرمنكناط البوتاسيوم KMnO_4 (بنفسجي اللون) مع الالكينات يختفي اللون البنفسجي بسرعة نتيجة لأكسدة الاصرة المزدوجة جزئياً من قبل العامل المؤكسد القوي (برمنكناط البوتاسيوم) الى مشتق ثنائي الهيدروكسيل الذي يعرف بـ (الكلايكول) ويظهر راسببني هو ثنائي أوكسيد المنغفنيز.



اما اذا استعمل محلول برمونكناط البوتاسيوم المركز الساخن في تأكسد الايثيلين بشكل تام كما في المعادلة الاتية :




تستخدم هذه الطريقة للتمييز بين الالكانات والالكينات اضافةً
لطريقة تفاعل اضافة البروم المذكورة في الفقرة 2 .

٦ - ٧ - ٤ تحضير الالكينات في المختبر

١- سحب جزئية ماء من الكحول :

يتم ذلك باستعمال عوامل مساعدة مختلفة نذكر منها حامض الكبريتيك المركز فعند مزج الحامض مع الكحول وتسخينهما الى درجة حرارة 165°C يتحرر الاولفين (الاثيلين).




لابد ان نشير الى ان نرة الهيدروجين تحذف من على نرة الكاربون المجاورة لنرة الكاربون الحلوية على OH . وستتعرف على ميكانيكية هذا التفاعل بالتفصيل في المراحل القادمة .

مثال 4-4

حضر البروبين من كحول مناسب وما تحتاج اليه .

الحل :

بما اننا نريد تحضير البروبين $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ فلا بد ان نختار
كحول يحتوي على ثلاثة نرات كاربون وفي هذه الحالة نختار
كحول البروبيل $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$. ويجري التفاعل وفق المعادلة
الاتية :




تمرين (4-14) توضيح بمعادلات كيميائية كيف يمكنك تمييز المركب 2 - مثيل بروبيين عن المركب بيوتان باستخدام محلول البروم المذاب في CCl_4 .

110


2- سحب جزيئة HX من هاليد الألكيل :

يحضر الألكين من تسخين هاليد الألكيل $\text{R}-\text{C}\equiv\text{CH}_2$ مع قاعدة قوية مثل هيدروكسيد البوتاسيوم KOH المذاب في كحول (حيث يستعمل الكحول كعامل مساعد) يتحرر الألفين بسهولة.



2- كلورو بروبان

ميكانيكية التفاعل :



لاحظ هنا ايضاً ان نرة الهيدروجين حذفت من نرة الكاربون المجاورة لنرة الكاربون الحاملة للهاليد (الكلوريد) .

تمرين (4-16)

حضر 1- بيوتين من هاليد الكيل مناسب و ما تحتاج اليه .

الألكاينات (الاستيلينات)

8 - 4



قاناني غاز الاستيلين

وهي المتسلسلة المتراكمة الثالثة من الهيدروكاربونات قانونها العام $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ والصيغة العامة $\text{R}-\text{C}\equiv\text{CH}_2$ أو $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}$ و تتميز بأحتواها على الأصارة الثلاثية $(-\text{C}\equiv\text{C}-)$ و اول افرادها هو الاستيلين ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) ومنه جاء اسمها بالاستيلينات حيث تكون الازواج الالكترونية الثلاثة بين نرتي الكاربون الأصارة الثلاثية للاستيلينات. والاستيلينات كالأوليفينات تعاني تفاعلات اضافة. والظاهر ان هناك فرقاً بين الأصارة الثلاثية والمزدوجة في فعاليتها تجاه الكواشف الباحثة عن الالكترونات ولذلك يلزم في الغالب استعمال العوامل المساعدة في تفاعلات الاضافة للاستيلينات اضف الى ذلك ان نرة الهيدروجين المرتبطة بذررة كاربون الأصارة الثلاثية اكثر فعالية من تلك المرتبطة بذررة كاربون الأصارة المزدوجة فهي قابلة للحلال بفلز وتعتبر نرة هيدروجين حامضية.

٤ - ٨ - ١ نظام التسمية العام للالكاینات

قواعد التسمية :

- ١ - تنتخب اطول سلسلة مستمرة من نرات الكاربون التي تضم نرتی کاربون الاصرة الثلاثية، ثم ترقم نرات کاربون السلسلة من الطرف الذي يعطى نرتی کاربون الاصرة الثلاثية اصغر الارقام. ويعطى اسم الالکان المقابل ويستبدل المقطع(ane) من اسم الكان بالقطع (أین) (yne) الدال على وجود أصرة الثلاثية. ويعين موقع الاصرة الثلاثية ب اختيار اصغر الرقمين.
- ٢ - تعطى الفروع الجانبية اسمائها وتعين مواقعها بارقام نرات الكاربون التي تحملها السلسلة. والامثلة التالية توضح تسمية بعض الالکاینات.


ايثاين



بروباین




١ - بیوتاين



٢ - بیوتاين




٣ ، ٣ - ثنائی مثيل - ١ - بیوتاين



٤ - ٨ - ٢ الخواص الفيزيائية للالکاینات

- ١ - تزداد درجة غليانها بزيادة الكتلة المولية، والافراد الاربعة الاولى غلات والبقية سوائل.
- ٢ - قليلة الذوبان في الماء والمذيبات القطبية ولكنها تذوب في المذيبات العضوية



الشكل (٤-٥) العلاقة بين درجات غليان الالکاینات وعدد نرات الكاربون فيها

4 - 8 - 3 الخواص الكيميائية للالكاینات

تحتوي الالكاینات ذات الصيغة التركيبية $(R - C \equiv C - H)$ على مجموعتين فعاليتين هما :


- 1- المجموعة الفعالة الاولى وهي الاصرة الثلاثية
- 2- المجموعة الفعالة المتماثلة بالهيدروجين الحامضي الضعيف والقابل للاستبدال لتكوين استيليد مثل استيليد الصوديوم.

أ - تفاعلات الاضافة Addition Reactions

ان وجود الاصرة الثلاثية غير المشبعة في الالكاینات يجعلها تسلك سلوكاً كيميائياً مشابهاً للالكينات (الاولفينات) حيث انها تحاول اشباع هذه الاصرة جزئياً او كلياً. ومن تفاعلات الاضافة.


1- الهرجة (اضافة الهيدروجين)

من الممكن اشباع الاصرة الثلاثية في الالكاینات بتفاعلاتها مع غاز الهيدروجين بوجود النيكل او البلاطين كعامل مساعد على مرحلتين وفي المرحلة الاولى يتكون الالكين (اولفين) وفي المرحلة الثانية يتحول الالكين الى الالكان.




2- اضافة جزيء هاليد الهيدروجين

ان اضافة الحوامض مثل اضافة هاليدات الهيدروجين (HX) مشابه لما مر سابقاً في تفاعلات الاضافة للالكينات ولكن على مرحلتين ويكون مركب مثل تكوين ثنائي الهايلد (Br_2 ، $2-Br$ ، Br). بروموبربان).



3- اضافة الهايلوجين (الهالجنة) (Br_2 ، Cl_2)


من السهولة اضافة جزيئه هالوجين للاصرة الثلاثية وتكوين الکين (اولفين) مهلكن اولاً، وباضافة جزيئه اخرى من الهايلوجين يتم اشباع الاصرة المزدوجة للالكين المهلكن .



ب - تفاعلات الازاحة وتكوين الاستيليدات

وهي تفاعلات نرة الهيدروجين الحامضية المتصلة بذرة كARBON الاصحه والاستيليد هو ملح مشتق من فلز فعال مثل الصوديوم والكابين واثناء تحلله المائي يحرر الalkain



الاصلي:



استيليد ثنائي الصوديوم

٤ - ٤ التمييز بين الكابين حامضي والكابين غير حامضي


يمكن التمييز بين الكابين حامضي والكابين غير حامضي وبالتحديد بين ١ - بيوتاين و ٢ - بيوتاين باستخدام كاشف تولن وهو هيدروكسيد الفضة الامونياكي $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2 \text{OH}]$ حيث يتفاعل كاشف تولن مع ١ - بيوتاين ويعطي راسب ابيض من استيليد الفضة في حين لا يتفاعل مع ٢ - بيوتاين لانه لا يحتوي على نرة هيدروجين حامضية فعالة .



٤ - ٥ تحضير الalkainات

أ - تحضير غاز الاستيلين صناعياً ومختربياً

١ - من التحلل المائي لكاربيد الكالسيوم كما موضح في المعادلة الاتية :




2- يحضر غاز الاستيلين بالتسخين الشديد لغاز الميثان


بمعزل عن الهواء كما في المعادلة:

تمرين (17-4)

في التفاعل الاتي




- أ) $\text{CH}_3\text{CBr}_2\text{CH}_3$
- ب) $\text{CH}_3\text{CHBrCH}_2\text{Br}$
- ج) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBr}_2$
- د) $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$



ب - تحضير (الالكاینات) ذات الكتلة المولية العالية

تحضر الاستيلينات من غاز الاستيلين نفسه بعد تحويله الى استيليد الصوديوم ثم بتفاعل استيليد الصوديوم مع هاليد الالكيل المناسب. وكمثال على ذلك تحضير 1 - بيوتاين و 2 - بيوتاين من غاز الاستيلين .



مثال 4-5 :

حضر 2- بنتاين من بروباين ويوديد الايثيل .

الحل :

نفاعل البروبين مع الصوديوم لتحضير بروبيد الصوديوم



وبمفعالة بروباينيد الصوديوم مع يوديد الايثيل نحصل على

2- بنتاين وحسب التفاعل الاتي :



اسئلة الفصل الرابع

ما هي الصيغ التركيبية للألكانات
(البلارافينات) ذات الصيغة الجزيئية



10.4 ما هي الالكينات الممكنة ذات الكتلة المولية 70 g/mol علمًا ان الكتل الذرية

١١.٤ أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها:

- 1 - القانون العام للالكانيات
..... والالكينات والالكايئنات
..... 2 - الصيغة العامة للالكانيات
..... والالكينات والالكايئنات
..... 3 - المجموعة العاملة أو الفعالة في
..... والالكينات والالكايئنات

12.4 علل ما یأتی:

أ) لماذا نضطر أحياناً إلى كتابة الصيغة التركيبة.

ب) لا توجد نرة هيدروجين رابعية ولا نرة كاربون خامسية.

ج) تزداد درجة غليان الالكان بزيادة الكتلة المولية.

د) الالكانات لا تذوب في الماء.

هـ) الالكانات مركبات غير فعالة.

و) عند اضافة HBr الى البروبين يتكون

2 - برومو بروبان ولیس 1 - برومو بروبان

ز) عملية اضافة حامض الكبريتيك المركزى الى الالكين ثم التحلل المائى للناتج مهمه تجارياً ومهمة صناعياً.

ح) يتفاعل كاشف تولن مع 1 - بيوتاين ولا يتفاعل مع 2 - بيوتاين.

1.4 ما هي اهم صفات المركبات العضوية
وبماذا تختلف عن المركبات غير العضوية؟

تصنف؟




3.4 ما هي الصفة الفريدة لذرة الكاربون؟

فوانيدها؟ 4.4 مَاذَا نعْنِي بِالْمُتَسَلِّلَةِ الْمُتَشَكِّلةِ وَمَا هِيَ


5.4 ما المقصود بـ

ب - الصيغة التوكيلية.

6.4 اعط الاسماء النظمية لكل من الصيغ
التركيبة الآتية :



7.4 ما هي الاسماء الشائعة أو القديمة لكل مما يأتي :



٨.٤ اكتب الصيغ التركيبية لكل من الأسماء الآتية:

أ - مثيل - 2 - بيوتين

ب) - مثیل - 1 - بنتین

ج) 2،2 - ثنائي مثيل بروبان

17.4 اختر الجواب الصحيح لكل مما يأتى:

1- الالكانات :

أ) دائماً غازات.

ب) تذوب في الماء.

ج) تحتوي على او اصر تساهمية مفردة.

2- اي الجزيئات الاتية ينطبق عليها

القانون العام للالكانات:

أ . C_3H_8

ب) C_3H_6

ج) C_3H_4

3- اي الكواشف الاتية تستخدم للتمييز بين

غاز الايثيلين والايثان:

أ) ماء البروم الاحمر.

ب) ماء الجير.

ج) محلول نترات الفضة.

18.4 اي من الجزيئات الاتية الakan ؟

أ . $C_{15}H_{32}$

ب) $C_{20}H_{38}$

ج) C_9H_{20}

19.4 ما الصيغة الجزيئية للألكين يتكون من 4

نرات كاربون ؟

20.4 ان عدد الاوامر التساهمية في الصيغة

الجزئية للاستيلين ($H-C\equiv C-H$) يسلوي:

أ) 3

ب) 2

ج) 5

21.4 اكتب معادلة تمثل تفاعل إضافة تامة

للهيدروجين الى 2 - بيوتاين بوجود العامل

المساعد ؟

13.4 كيف يمكنك اختيار طريقة تحضير

واحدة لكل مما يأتي:

البروبان ، البروبين ، البروبالين .

14.4 ابتداء من كلوريد الايثيل وما تحتاج

اليه كيف يمكنك تحضير :

أ - الايثان

ب - الايثيلين

وكيف تميز بينهما عمليا في المختبر.

15.4 ابتداء من كاربيد الكالسيوم وما تحتاج

اليه كيف يمكنك تحضير :

أ) البروبالين

ب) 2 - بيوتاين

وكيف تميز بينهما عمليا.

16.4 عبر عن التفاعلات الاتية بصيغ

تركيبية:

1- اضافة بروميد الهيدروجين الى

البروبين

2- سحب HCl من كلوريد الايثيل بواسطة

KOH الكحولي مع التسخين .

3- سحب الماء من كحول الايثيل بواسطة

حامض الكبريتيك المركز مع التسخين

الى $165^{\circ}C$.

4 - اكسدة الايثيلين بواسطة برمونكنا


البوتاسيوم المركز الساخن.

5 - تفاعل استيليد الصوديوم مع 2 كلورو

بروبان .

Nuclear Chemistry


5



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

- يعرف النوية و أهميتها في التفاعلات النووية .
- يعرف النظائر و أنواعها و الأفاده منها في مجال الطب و العلوم والآثار .
- يشرح كيفية تحديد عمر النصف للنظائر و علاقته بالنظير C^{14} .
- يعرف النشاط الأشعاعي و يعدد أنواعه .
- يستطيع كتابة المعادلة النووية وكيفية موازنتها .
- يميز بين الانشطار النووي والاندماج النووي وفائدة كل منهما .
- يقدر خطورة الأشعاعات المؤينة وتأثيراتها على الأجسام الحية وكيفية الوقاية منها.

توصل العلماء الى ان الكون الذي نعيش فيه تكون نتيجة ما يسمى بالانفجار العظيم (Big Bang) وكانت درجة الحرارة فيه تقدر بbillions عديدة من الدرجات السليلية ونتج عن هذا الحدث كمية كبيرة من الطاقة يصعب تقديرها، واعداد هائلة من الجسيمات الدقيقة (البروتونات والنيوترونات والالكترونات) والتي تكونت منها العناصر المختلفة. كانت المادة تأخذ شكل البلازما (وهو ما يمثل الحالة الرابعة للمادة) وهي بحر من النوى الموجبة والالكترونات السالبة .



انفجار العظيم

نواة 2-5 Nucleus

عند دراسة العلماء للعناصر المختلفة وجدوا انها تتكون من جسيمات صغيرة تدعى الذرات (Atoms) وهذه بدورها تتتألف من جسيمات اساسية تتمثل بالنواة (Nucleus) وهي المحور الذي تدور حوله الكيمياء النووية. وهذا الجسيم المتناهي بالصغر(النواة) تتمركز فيه معظم كتلة الذرة والتي تكون اكبر بكثير من كتلة الالكترونات (Electrons) وهي جسيمات صغيرة تدور حول النواة بسرعة كبيرة وتحمل شحنة سالبة (e^-). وفي الذرة يكون عدد الشحنات الموجبة مسلياً لعدد الشحنات السالبة لذا تكون متعادلة كهربائياً. ان سبب الشحنة الموجبة للنواة هو وجود جسيمات فيها تدعى البروتونات (Protons) وهي جسيمات موجبة الشحنة يرمز لها (p^+). وتوجد جسيمات اخرى في النواة متعادلة الشحنة تدعى النيوترونات (neutrons) ويرمز لها (n^0), ويطلق على هذين الجسيمين معاً بنويات.

ان عدد النويات في النواة يمثل مجموع عدد (البروتونات + النيوترونات) ويدعى عدد الكتلة (Mass number) يرمز له بالرمز (A) ، ويدعى عدد البروتونات في النواة بالعدد الذري (Atomic number) يرمز له بالرمز (Z) وهو يسلوي ايضاً عدد الالكترونات في الذرة المتعادلة الشحنة والذي يحدد ترتيب العنصر في الجدول الدوري للعناصر ويمكن تمثيل هذه الاعداد برمز العنصر بالترتيب الآتي :

هل تعلم

ان كلمة نرة في اللغة العربية نسبة الى نوع ضئيل الحجم جداً من النمل الاحمر، وهو أصغر أنواع النمل وتطلق على ما يرى من هباء والجسيمات الدقيقة التي تبدو لنا في اشعة الشمس عندما تدخل من النافذة او اي ثقب ضيق .





اذا علمنا عدد الكتلة و العدد الذري لعنصر نستطيع ان نستنتج عدد النيوترونات (N) عن طريق المعادلة الآتية :-

$$N = A - Z$$

3-5 النظائر Isotopes


قد تختلف نرات العنصر الواحد في عدد الكتلة لكنها تشتهر في العدد الذري لذا تدعى بالنظائر Isotopes وتعني كلمة نظير (المكان نفسه) اي ان لها نفس المكان في الجدول الدوري، حيث ان نرات النظائر للعنصر الواحد تحتوي في نواتها على نفس العدد من البروتونات لكنها تختلف في عدد النيوترونات. ان العناصر في الطبيعة على نوعين : نوع له نظائر والآخر ليس له نظائر فمثلا لعنصر الهيدروجين ثلاثة نظائر هي :

الهيدروجين الاعتيادي ^1_1H

والهيدروجين الثقيل او الديوتيريوم ^2_1H او D

والنوع الثالث الهيدروجين الاثقيل او التريتيوم ^3_1H او T


والشكل (1-5) يوضح هذه النظائر . وتختلف هذه النظائر في نسب وفرتها في الطبيعة والجدول (1-5) يوضح هذه النسب في الطبيعة.



تتوارد معظم نرات الهيدروجين في الماء على هيئة H_2O إلا اننا نجد ان بين كل 6000 جزيء ماء عادي جزيء واحد فقط على هيئة D_2O (ماء ثقيل) ، ويتم الحصول على الماء الثقيل باستخدام التحليل الكهربائي للماء العادي حيث يتحرر

تمرين (1-5)

ادرس رموز العناصر الآتية ، ثم اجب عن الاسئلة التي تليها :



1- ماذا يمثل الرقم السفلي على يسار رمز كل عنصر ؟

2- ماذا يمثل الرقم العلوي على يسار رمز كل عنصر ؟

3- اوجد عدد النيوترونات N لكل عنصر ؟

الشكل(1-5) نظائر الهيدروجين في الطبيعة .

بروتون	
الكترون	
نيوترون	

الهيدروجين العادي من الماء بسهولة أكثر من الهيدروجين الثقيل وباستمرار التحليل الكهربائي للماء يزداد تركيز D_2O الذي يفاد منه في مجالات عديدة منها كمهدٍ للفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

لابد ان تعلم ان النظائر لها نفس العدد من الالكترونات ونفس العدد من البروتونات اي العدد الذري نفسه فهي متماثلة في خواصها الكيميائية لأن عدد الالكترونات يحدد الخواص الكيميائية للذرة ، اما اختلافها في عدد الكتلة اي تختلف في مجموع عدد النيوترونات وعدد البروتونات فيؤدي الى اختلاف في خواصها النووية لأنهما يحددان الخواص النووية للنواة .

الجدول 1-5 رموز نظائر عنصر الهيدروجين ووفرتها في الطبيعة

اسم النظير	عدد	n°	رمزه	الوفرة النسبية في الطبيعة
هيدروجين	صفر		1_1H	%99.984
ديوتيريوم	1		2_1H او 1_2D	%0.015
تريتيوم	2		3_1H او 3_2T	نادر جداً ومشع

ومثال اخر على ذلك يوجد لليورانيوم ثلاثة نظائر :



تتوافر معظم العناصر بشكل خليط من نظيرين او اكثر وتخالف نسب وجود هذه النظائر للعنصر الواحد والتي يعبر عنها (الوفرة الطبيعية النسبية لكل نظير) . ومن معدل كتل جميع نظائر العنصر الواحد نحصل على الكتلة الذرية (Atomic mass) وهي تعبر عن متوسط اعداد الكتلة لنظائر العنصر الواحد مضروبًا في وفرتها النسبية في الطبيعة، وتقاس بوحدة كتلة ذرية (وكذ) (atomic mass unite) مختصرها (amu) ، حيث ان 1 وكم (amu) يساوي

$$1\text{amu} = 1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$$


والجدول (5-2) يبين اعداد الكتلة لنظائر بعض العناصر.

الجدول 5-2 النظائر الطبيعية المهمة لعدد من العناصر

العنصر	النوعية	كتلة النظير الذرية (وكذ)	الوفرة الطبيعية النسبية
هيدروجين	^1_1H	1.0078	%99.984
	^2_1H	2.0141	%0.015
	^3_1H	2.0160	نطفة
كاربون	$^{12}_6\text{C}$	12.000	%98.893
	$^{13}_6\text{C}$	13.0033	%1.1070
	$^{14}_6\text{C}$	14.0032	نطفة
نتروجين	$^{14}_7\text{N}$	14.0031	%99.634
	$^{15}_7\text{N}$	15.0001	%0.366
أوكسجين	$^{16}_8\text{O}$	15.9949	%99.759
	$^{17}_8\text{O}$	16.9991	%0.0674
	$^{18}_8\text{O}$	17.9992	%0.0239
الفلور	$^{19}_9\text{F}$	18.9984	%100
النيون	$^{20}_{10}\text{Ne}$	19.9924	%90.48
	$^{21}_{10}\text{Ne}$	20.9937	%0.27
	$^{22}_{10}\text{Ne}$	21.99014	%9.25
الصوديوم	$^{23}_{11}\text{Na}$	22.9868	%100
الفسفور	$^{31}_{15}\text{P}$	30.9738	%100
الكلور	$^{35}_{17}\text{Cl}$	34.9689	%75.53
	$^{37}_{17}\text{Cl}$	36.9659	%24.47
البروم	$^{79}_{35}\text{Br}$	78.9184	%50.54
	$^{81}_{35}\text{Br}$	80.9163	%49.46
اليود	$^{127}_{53}\text{I}$	126.9045	%100
الرصاص	$^{204}_{82}\text{Pb}$	203.9731	%1.48
	$^{206}_{82}\text{Pb}$	205.9745	%23.6
	$^{207}_{82}\text{Pb}$	206.9759	%22.6
	$^{208}_{82}\text{Pb}$	207.9766	%52.3
التوريوم	$^{232}_{90}\text{Th}$	232.0382	%100

وقد اختير نظير الكاربون C^{12} كنيرة قياسية في اغلب التطبيقات لأن كتلتها المكونة من 12 وحدة احتسبت بدقة شديدة باستخدام اجهزة دقيقة ومنها مطياف الكتلة (الشكل 5-2) فتم قياس باقي العناصر بنسبة (متوسط كتلة الذرة) الى $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة نظير الكاربون C^{12} (راجع الفصل الاول لتعريف وحدة الكتلة الذرية).

الشكل(5-2) جهاز مطياف الكتلة



ويمكن حساب الكتلة الذرية من نسب الوفرة الطبيعية لنظائر العنصر الواحد باستخدام العلاقة الآتية :

$$\text{الكتلة الذرية للعنصر} = \frac{\text{كتلة النظير الاول} \times \text{وفرته النسبية} + \text{كتلة النظير الثاني} \times \text{وفرته النسبية} + \dots}{100}$$

مثال 5 - 1 :

يشكل Cl^{35} نسبة 75.53% من مجموع الكلور في الطبيعة أما الكلور Cl^{37} فيشكل ما نسبته 24.47%. احسب الكتلة الذرية للكلور ؟

الحل :

بما ان للكلور نظيرين فقط فتكتب العلاقة على الصورة الآتية:

الكتلة الذرية للكلور



$$\text{الكتلة الذرية للكلور} = \frac{\text{كتلة النظير الاول} \times \text{وفرته النسبية} + \text{كتلة النظير الثاني} \times \text{وفرته النسبية}}{100}$$

$$= \frac{(34.9689 \times 75.53) + (36.9659 \times 24.47)}{100}$$

$$= 35.4576 \text{ amu}$$


وللنظائر عدة تطبيقات في مجال الطب في تشخيص وعلاج كثير من الامراض، حيث يستخدم نظير الكوبالت(^{60}Co) في معالجة الأورام السرطانية ويستخدم نظير اليود (^{131}I) في معالجة تضخم الغدة الدرقية [الشكل (3-5)].

استخدم العلماء نظائر اليورانيوم ^{235}U و ^{238}U والثوريوم ^{232}Th لمعرفة وتقدير اعمار الصخور والنيلزك والمحجرات. وكذلك تستعمل النظائر المشعة في المجال الصناعي وفي صناعة اجهزة السيطرة كاجهزة قياس سمك الصفائح او تدفق السوائل والغازات، وكذلك تستعمل في تشخيص موقع تسرب السوائل والغازات الخطيرة في الخزانات والانابيب وتسرب مياه الشرب تحت الارض دون حفرها . وفي المجال الزراعي تستخدم النظائر المشعة في ابحاث خصوبة التربة والاسمدة .



4-5 حجم وكتلة النواة

على الرغم من صغر الذرة فقد أمكن قياس حجمها بدقة ، اذ يبلغ قطر الذرة جزءاً من مئة مليون من السنتمتر $\frac{1}{100000000}$. كأنك تضع مليون ذرة على رأس دبوس قطره حوالي 0.001 cm . اما النواة فتعتبر مركز ثقل الذرة ومخزن طاقتها علماً ان ابعادها صغيرة بصورة غير اعتيادية مقارنة ببعاد الذرة اذ يبلغ حجمها $\frac{1}{10000}$ من حجم الذرة لأن الغلاف المحيط بالنواة يتكون من مدارات حول النواة تدور فيها الالكترونات. ويمكن تشبيه الهيئة البنائية للذرة بالمجموعة الشمسية فالشمس تمثل النواة والكواكب التي تدور في مدارات حولها تمثل الالكترونات وهذه الكواكب تبعد عن الشمس بمسافات بعيدة نسبياً لكنها ترتبط بالمجموعة الشمسية بفعل تأثير قانون الجاذبية. وهكذا الالكترونات فانها تبتعد عن النواة بمسافات بعيدة جداً نسبياً ولكن بفعل قوى التجاذب التي تعمل على جعل النواة والالكترونات وحدة واحدة وهي الذرة، ويبيّن الجدول(3-5) بعض خواص مكونات الذرة التي تعرفت عليها في المرحلة المتوسطة .




ترسيم الذرة

الجسم	n°	رمزه	نوع الشحنة	الكتلة \ g
الإلكترون	e⁻	-1		9.11×10^{-28}
البروتون	p⁺	+1		1.672×10^{-24}
النيوترون		متعادل 0		1.674×10^{-24}

5-5 الاستقرار النووي Nuclear Stability

ان النظائر غير المشعة تكون مستقرة اما المشعة فهي نظائر غير مستقرة . ويوجد في الطبيعة 280 نظير من بينها حوالي 50 نظير مشع، كما تمكן الانسان من صنع عدد كبير من النظائر يصل الى 500 نظير وذلك بعد قذف ذرات بعض العناصر بالنيوترونات.



الشكل (5-5) تجمع النيوترونات والبروتونات في النووية والقوى المؤثرة فيها .

يعود عدم استقرارية بعض النظائر المشعة الى نسبة عدد النيوترونات الى عدد البروتونات ($\frac{n}{p}$) في نواتها. وتكون هذه النسبة 1:1 اي الواحد الصحيح في حالة النوى المستقرة. اما اذا كانت هذه النسبة اكبر من الواحد الصحيح فتكون النوى غير مستقرة ، مما يجعلها تلجأ الى اطلاق اشعاعات لتسתרق وهذا ما يسمى بالنشاط الاشعاعي .

تكون نوى الذرات الاكثر استقرارا هي التي تمتلك اعداداً ذرية صغيرة والتي تقارب فيها النسبة ($\frac{n}{p}$) الواحد الصحيح . وبزيادة العدد الذري تزيد نسبة النيوترونات الى البروتونات عن الواحد الصحيح، ويعود السبب في ذلك الى العلاقة بين قوى التجاذب النووية (قوى تجاذب تؤثر على البروتونات والنيوترونات بشكل متماثل ، وتعتبر اقوى القوى في الطبيعة) وقوى التناافر الكهربائية الساكنة بين البروتونات. حيث تتناافر البروتونات في النواة بسبب تشابه شحنتها الكهربائية الساكنة. وكلما زاد العدد الذري زاد عدد البروتونات في النواة ، فتزداد قوى التناافر الساكنة بين البروتونات ، لكن وجود عدد اكبر من النيوترونات يزيد القوة النووية للتغلب على التناافر وبالتالي عدم استقرار النواة لاحظ الشكل (5-5).

تتألف نواة نزرة الهيليوم من بروتونين ونيوترونين :

$$\text{كتلة البروتون} : p^+ \text{ amu} = 1.00728 \text{ amu}$$

$$\text{كتلة النيوترون} : n^0 \text{ amu} = 1.00866 \text{ amu}$$

لذا يمكن حساب كتلة نواة الهيليوم على النحو الآتي:

$$\text{كتلة بروتونين} = 2 \times 1.00728 \text{ amu} = 2.01456 \text{ amu}$$

$$\text{كتلة نيوترونين} = 2 \times 1.00866 \text{ amu} = 2.01732 \text{ amu}$$

مجموع كتل البروتونات والنيوترونات =

$$4.03188 \text{ amu} = 2.01732 + 2.01456$$

تبلغ كتلة نواة الهيليوم المقاسة (بوحدة وكم) :

وبمقارنة كتلة الهيليوم الفعلية (4.00151 amu) بمجموع كتل مكونات نواتها يلاحظ أن هناك فرقاً في الكتلة = 0.03037 amu.

وباستخدام جهاز مطياف الكتلة المتطرفة وجد أن هذا الفرق في الكتلة (الكتلة المفقودة) تحولت إلى طاقة E حسب معادلة انشتاين ($E=mc^2$)

وتسمى هذه الطاقة طاقة الارتباط النووية وتعبر بانها الطاقة اللازمة للتغلب على التناقض بين البروتونات الموجبة والمحافظة على البروتونات والنيوترونات سوية داخل النواة ضمن حجمها الصغير جداً جداً . ولحساب الطاقة الناتجة

من تحول فرق الكتلة إلى طاقة نتبع خطوات المثال الآتي :

مثال 5 - 2 :

إذا علمت أن فرق الكتلة المقاسة عن الفعلية لنواة الهيليوم هي 0.03037 amu . احسب طاقة الارتباط النووية لنواة الهيليوم . علماً أن سرعة الضوء ($C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

الحل :

نحو الكتلة من وحدة amu إلى kg

$$m = 0.03037 \text{ amu} \times \frac{1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}}{1 \text{ amu}} = 0.050414 \times 10^{-27} \text{ kg}$$


نستخدم معادلة انشتاين لحساب طاقة الارتباط

$$E = mc^2 = 0.050414 \times 10^{-27} \text{ kg} \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2$$

$$= 0.454 \times 10^{-11} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$$

ومن تعريف الجول (J) بأنه يساوي (kg . m² / s²) فعليه

$$E = 0.454 \times 10^{-11} \text{ J}$$



معادلة انشتاين $E = mc^2$

E = الطاقة

m = كتلة المادة

c = سرعة الضوء تبلغ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

تمرين (3-5)

احسب طاقة الارتباط النووية لنواة عنصر الرصاص التي تمتلك 82 بروتوناً و 125 نيوتروناً . علماً أن كتلة البروتون 1.00728 amu وكتلة النيوترون 1.00866 amu والكتلة الذرية للرصاص 207.2 amu .



7-5 النشاط الاشعاعي Radioactivity

في عام 1896 اكتشف العالم هنري بيكرل تضليل صفائح فوتوغرافية في إدراك محتوى على بعض خامات اليورانيوم فاستنتج أن إشعاعاً غير مرئياً انطلق من اليورانيوم وأثر على اللوح الفوتوغرافي وكانت مدام كوري تعمل مع زوجها في مختبر بيكرل وقد درساه هذه الظاهرة مفصلاً ونجح الاثنان بتقديم أدلة لوجود عناصرتين جديدين (الراديوم والبولونيوم) وتوفرت لديهما كميات قابلة للوزن خلال 10 سنوات لاحقة.


وقد سميت وحدة النشاط الاشعاعي بـ (الكوري) تقديراً لعمل مدام كوري . إن لبعض النوى الذرية غير المستقرة القدرة على الانحلال تلقائياً مكونةً نوى نظائر جديدة مستقرة وهذا ما يدعى بالنشاط الاشعاعي (Radioactivity) وهو عملية تحول فيها نوى أحد العناصر بانبعاث الأشعاعات النووية ذات طاقة عالية إلى نوى جديدة أكثر استقراراً ، لاحظ الشكل (5-6).



ماري كوري
1867-1934م




بيير كوري
1859-1906م



الشكل(5-6) النشاط الاشعاعي
لنواة نزرة مشعة .

ومثال ذلك نزرة نزرة نظير اليورانيوم غير المستقرة (مشعة) والتي تخضع للانحلال الاشعاعي. حيث تعتمد سرعة انحلال النزرة على مكوناتها ومستوى طاقة النزرة . وقد بينت الدراسات وجود ثلاثة أنواع من الأشعاعات المؤينة تختلف في القابلية على اختراع المواد وقد سميت بالأحرف الثلاثة الأولى من الأبجدية اليونانية (الفاء وبيتا وكماء) .

تنتفوت أنواع الأشعاعات في اختراعها للمواد وحسب ما موضح في الشكل (7-5) .




الشكل(5-7) انواع الاشعة وقابلية اختراعها للمواد .

١ . دقائق ألفا (Alpha particles) α


دقايق موجبة الشحنة تتالف كل دقيقه من بروتونين ونيوترونين فهي تمثل نواة نرة الهيليوم يرمز لها ^4_2He او وهي أثقل أنواع الأشعة ومن خواصها :

1. شدة تأثيرها على المواد الكبير حيث تعمل عند اصطدامها بالمواد على ازاحة الکترونات المادة مما يؤدي الى تأينها .
 2. مدى تأثيرها على المواد قصير جدا سرعان ما يتحد مع دقائقها الکترونيين من الالکترونات المزاحة نتيجة تأين المادة فتحتتحول الى نرة غاز الهيليوم حسب معادلة التفاعل الآتي :




ويمكن لنظير اليورانيوم $^{238}_{92}\text{U}$ ان ينحل (نتيجة النشاط الاشعاعي) فيتحول الى نظير الشوريوم $^{234}_{90}\text{Th}$ باعتماد قيافة الفا.

. (8-5) لاحظ الشكل




ويمكن إيقاف مسار أشعة ألفا بوساطة قطعة رقيقة من الورق . الشكل (7-5)




الشكل(5-8) انباع دقيقة الفا من نواة نظر الورانوم المشع.

2. دقائق بيتا (Beta particles) β^-

هي عبارة عن سيل من الالكترونات تتميز بمدى أكبر لاختراق المواد قياساً باشعة الفا لأن حجم الالكترون صغير جداً مقارنة بحجم ذرة الماء مما يمكنه من النفاذ إلى مدى أكبر عبر مدارات الكترونات نزرة المادة ويرمز لها أيضاً (${}_{-1}^0 e$)، لا يمكن ايقاف مسارها بقطعة ورق وإنما بقطعة خشب لاحظ الشكل (5-7). والمعادلة التالية تبين انبعاث دقائق بيتا من النيوترون اضافة لتكوين بروتون :




مثلاً انبعاث دقائق بيتا من خلال اتحلال نظير الكاربون ${}^{14}_6 C$ إلى نظير النتروجين ${}^{14}_7 N$. لاحظ أن العدد الذري يزداد بمقدار (1) ويبقى العدد الكتلي دون تغيير، الشكل (5-9).



الشكل (5-9) انبعاث دقائق بيتا من خلال اتحلال نظير الكاربون




وهي موجات كهرومغناطيسية عديمة الشحنة ذات سرعة عالية جداً تسلوي سرعة الضوء، وهذا النوع من الأشعة أقوى أنواع الأشعة تأثيراً وأكثرها قدرة على اختراق المواد المرور فيها إلى مدى أكبر من قدرة دقائق الفا بيتا، وتعتبر أخطر أنواع الأشعاعات، ويمكن اضعاف سريانها بواسطة حاجز من الكونكريت (خرسانة مسلحة)، الشكل (5-7) والمعادلة التالية تبين اتحلال نظير اليورانيوم ${}^{238}_{92} U$ بانبعاث أشعة كاما والفا وتكون نظير الثوريوم .



كما ويوضح الشكل (5-10) تأثير المجال المغناطيسيي والمجال الكهربائي على جميع أنواع الانحلال الشعاعي .

* ان المعادلة غير كاملة لأن انبعاث دقيقة بيتا يتولد معه ما يدعى نيوترينوس يتم التطرق إليه في مراحل دراسية لاحقة .



الشكل (5-10) تأثير المجال المغناطيسي والكهربائي على انواع الانحلال الاشعاعي من المصدر المشع .

و يبين الجدول (4-5) انواع الانحلال الاشعاعي و خواص كل

منها .

الجدول 5-4 انواع ورموز الانحلال الاشعاعي و خواص كل نوع

نوع الانحلال	الطبيعة	السرعة الضوء	الشحنة	تأثيرها بال المجال الكهربائي	تتوقف بوساطة
الفاء α	نواة الهيليوم ${}^4_2\text{He}$	سرعة الضوء 10%	موجبة +2	تنحرف مقتربة من الصفيحة السالبة .	ورقة ، ملابس
بيتا β	الكترون ذا سرعة عالية ${}^0_{-1}\text{e}$	سرعة الضوء 90%	سالبة -1	تنحرف مقتربة من الصفيحة الموجبة .	حاجز من الخشب او الالمنيوم
كاما γ	موجة كهرومغناطيسية ذات طاقة عالية	سرعة الضوء	عديمة 0	لاتتاثر	لاتوقفها بل تقلل من تأثيرها كونكريت او حواجز من الرصاص بسمك 10 cm

ومن خواص العناصر المشعة هي :


1. العنصر المشع تكون جميع مركباته مشعة .
2. العنصر المشع يكون مشعاً في جميع حالاته (صلبة - سائلة - غازية) .
3. نواة العنصر المشع لا تصدر جسيمات ألفا وجسيمات بيتا معاً، ولكن قد تصدر ألفا أو بيتا، وقد يصاحب كلاً منهما انطلاق اشعة كاما .
4. معدل النشاط الإشعاعي لعينة مشعة لا يتأثر بالظروف الخارجية من ضغط أو درجة حرارة ولكنه يتوقف فقط على نسبة العنصر المشع في العينة .
5. انبعاث جسيم بيتا أو جسيم ألفا من نواة العنصر المشع يحولها إلى نواة عنصر آخر .

الشدة الإشعاعية 8-5

تمثل عدد الانحلالات التي تحدث في الثانية . فعندما يقال ان مصدر كوبلت شدته (50) الف بكرل فهذا يعني انه ينحل في هذا المصدر في كل ثانية (50) الف نواة وحدات قياسها البكرل (Bq) ويعرف بأنه عبارة عن انحلال واحد في الثانية والكوري (Ci) يساوي 37 مليون بكرل .

زمن عمر النصف 9-5 (Half - life time)

يرمز له ($t_{1/2}$) يمثل الوقت اللازم لانحلال نصف كمية المادة اشعاعياً اي استهلاك نصف ما كان موجوداً اصلاً من نوبيات المادة المشعة. وان لكل نظائر من نظائر العناصر المختلفة له عمر نصف ثابت طبيعي معروف وان معظم النظائر المشعة يتحلل في عدة خطوات (سلسلة متتابعة من التحلل) الى عناصر مستقرة تسمى بعنصر البنت (الوليدة) بينما النظائر الاصلية قبل التحلل تسمى بعنصر الام . ويبين الشكل (11-5) منحنى انحلال العناصر المشعة وعدد اعمار النصف لها .



الشكل(5) منحنى انحلال للعناصر المشعة وعدد اعمار النصف لها.

في اغلب الحالات يكون عمر النصف للنظائر معتمدا على خصائص الذرات المكونة لها ولا تؤثر عليه العوامل الخارجية من درجة الحرارة والضغط والوسط الكيميائي المتواجد فيه والحقول المغناطيسية والكهربائية لذلك فان عمر النصف للنظائر لا يتغير حسب الوقت بل هو قيمة ثابتة طبيعيا لكل نواة مشعة عمر نصف خاص بها وتنيات الاكثر استقرار تنحل ببطئ ولها عمر نصف اطول اما الاقل استقرار فتنحل بسرعة ويكون لها عمر نصف قصير جدا لا يتعدى بضع اجزاء من الثانية فالكاربون ^{14}C له عمر نصف يقدر ب 5730 سنة ولليورانيوم ^{238}U 4.46×10^9 سنة والبوتاسيوم ^{40}K عمر النصف له 1.3×10^9 سنة . بينما البولونيوم ^{218}Po له عمر نصف 3 دقائق والاستاتين ^{218}At عمر النصف له قصير جدا هو 1.6 ثانية.


تستخدم العناصر المشعة ذات عمر النصف القصير في الطب النووي في معالجة بعض الامراض ومنها الورام السرطانية (والتي هي تغير في تركيب الخلايا يؤدي الى انقسام سريع وتلف الخلايا عند تعرضها للإشعاع لفترة طويلة) لكي لا تتشكل مصدرا مشعا خطرا على المدى البعيد للمرضى كما ويستخدم زمن عمر النصف في تقدير اعمار الاشجار ورفات الموتى. يتكون معظم ثنائي اوكسيد الكاربون CO_2 الموجود في الجو من ^{12}C وقسم قليل من ^{13}C وهو عنصران غير نشيطان اشعاعيا وبالاضافة الى ذلك هنالك كميات قليلة جدا من النظير

هل تعلم

لو كان لدينا كيلو غرام واحد من عنصر $^{238}\text{U}_{92}$ فان نصف كيلو غرام من هذا العنصر يتحول الى عنصر الرصاص $^{206}\text{Pb}_{82}$ المستقر بعد مرور 4.5 بليون سنة .

^{14}C المشع الذي يكون انحلاله ثابت وتبقي كميته ثابتة ايضاً بسبب تأثير الاشعة الكونية على النيتروجين ^{14}N الموجود في الجو الذي ينحل ليكون ^{14}C ، وكما هو معلوم ان النباتات تمتص غاز CO_2 من الجو في عملية البناء الضوئي ومادامت هذه النباتات باقيه حية فان نسبة نرات ^{14}C الى ^{12}C في النباتات والكربوهيدرات تكون مسؤولة لنسبتها في الجو ولكن هذه النسبة تبدا بالتناقص عند انقطاع دورة الحياة (قطع الاشجار) (موت الكائن الحي) ولكون نرات ^{14}C نشطة اشعاعياً اي انها تعاني من انحلال مستمر (عمر النصف ^{14}C هو 5730 سنة) كما في الشكل (12-5). لذلك في نهاية هذه المدة تصبح نسبة ^{14}C الى ^{12}C نصف ما كانت عليه في الجو ولا يجد اعمار مختلفات اخشاب الاشجار المقطوعة او رفاة الاموات او المتحجرات تحرق عينه منها لتكون غاز CO_2 وتحسب نسبة ^{14}C الى ^{12}C ومن هذه النسبة وبحسابات خاصة تقدر اعمارها وهذا أدى الى تطوير دراسة الاثار والاكتشافات الاثرية .

الشكل (12-5) .
كاربون - 14 وكيفية تكونه في جسم الكائن الحي .



مثال 5 - 3 :

لنظير الكاربون¹⁴ الذي يتحلل تلقائياً باعثاً دقائق بيتاً عمر نصف ($t_{1/2}$) قدره 5730 سنة، مبتدأ بكتلة ($2 \times 10^{-2} \text{ g}$) من النظير أُوجد :-

- 1 - كم الفترة الزمنية لثلاثة اعمار نصف (three half-lives)
- 2 - كم عدد الغرامات المتبقية من النظير بعد مرور ثلاثة اعمار النصف .

الحل :

يمكن حل مثل هذه الأسئلة باستخدام العلاقة الآتية :

$$N_t = \frac{N_0}{2^{(t/t_{1/2})}}$$

حيث N_0 الكمية الابتدائية للمادة المشعة و N_t كمية المادة المشعة المتبقية بعد فترة زمنية مقدارها t و $t_{1/2}$ زمن عمر النصف .

- 1 - يتم حساب زمن اعمار النصف الثلاثة بحاصل ضرب عمر النصف بعد اعمار النصف

$$\text{اعمار النصف} = 3 \times 5730 \text{ سنة} = 17190 \text{ سنة}$$

- 2 - أيجاد كمية النظير المتبقية بعد مرور ثلاثة اعمار النصف ($t = 17190 \text{ سنة}$) بتطبيق العلاقة اعلاه

$$N_t = \frac{N_0}{2^{(t/t_{1/2})}} = \frac{2 \times 10^{-2} \text{ g}}{2^{(17190/5730)}} = 0.25 \times 10^{-2} \text{ g}$$

تمرين (4-5)

- 1 - لنظير المنغنيز Mn⁵⁶ والذي يتحلل فيعطي دقائق بيتاً عمر نصف قدره 2.6 ساعة ما هي كتلة المنغنيز 56 المتبقية في نموذج 1 بعد نهاية 10.4 ساعة؟
- 2 - لنظير الفسفور P³² عمر نصف مقداره 14.3 يوماً . ما كتلة نظير الفسفور 32 المتبقية بعد 57.2 يوماً اذا ابتدأت بـ 4 g من النظير ؟

10-5 المعادلات النووية Nuclear Equations

ان التغيرات التي تحصل في النواة والتي تؤدي الى تحولها من نوية الى اخرى تعرف بالتفاعلات النووية فمثلاً انبعث اشعة الفا من نظير اليورانيوم U²³⁸₉₂ يقود الى تكوين نظير الثوريوم Th²³⁴₉₀ وكما هو الحال في التفاعلات الكيميائية التي يعبر عنها بالمعادلات الكيميائية الحسابية، فإن التفاعلات

النووية يعبر عنها بمعادلات مشابهة تدعى المعادلات النووية
فيتمكن التعبير عن التفاعل بالمعادلة الآتية:



في المعادلات النووية يجب أن يكون (المجموع الجبri للإعداد الذري واعداد الكتلة متسلوي في طرفي المعادلة). والجدول (5-5) يبين الجسيمات القاخصة او المنبعثة في المعادلات النووية.

الجدول 5-5 الجسيمات القاخصة او المنبعثة في المعادلات النووية

اسم الجسيم	رمزه وعدد الذري وعدد الكتلة له
نيوترون	^1_0n
بروتون	$^1_1\text{H} (p^+)$
الكترون	$^0_{-1}\text{e}$
الفا	^4_2He
بيتا	$\beta^- (^0_{-1}\text{e})$
كاميرا	$^0\gamma$

تمرين (5-5)

أ) اوجد اسم الجسيم المضاف لنظير $^{22}_{11}\text{Na}$ في المعادلة النووية الآتية :

$$^{22}_{11}\text{Na} + x \longrightarrow ^{22}_{10}\text{Ne}$$

ب) جد العدد الذري وعدد الكتلة للعنصر X في المعادلة النووية الآتية :

$$^{253}_{99}\text{Es} + ^4_2\text{He} \longrightarrow ^1_0\text{n} + x$$

مثال 5 - 4 :

جد العدد الذري وعدد الكتلة للعنصر X في المعادلة النووية الآتية :




الحل :

عدد الكتلة لنظير عنصر البولونيوم يساوي 212 والعدد الذري 84 وعندما تتبعد دقة الفاينتج عنصر X كما في المعادلة :

$$\text{عدد الكتلة للعنصر } X = 208 = 212 - 4$$

$$\text{العدد الذري للعنصر } X = 82 = 2 - 84$$



11-5 أنواع التفاعلات النووية

يمكن تقسيم التفاعلات النووية الى أربعة أقسام وهي :

1. الانحلال النووي التلقائي . Radioactive spontaneous disintegration
2. التفاعل النووي غير التلقائي . Nonspontaneous nuclear reaction
3. الانشطار النووي . Nuclear Fission
4. الاندماج النووي . Nuclear Fusion

11-1 الانحلال النووي التلقائي

يتمثل انحلال أنوية العناصر الثقيلة غير المستقرة تلقائياً الى أنوية اخف واكثر استقراراً وينبعث منها دقائق الفا او بيتاً او اشعة كما بالانحلال الاشعاعي كما ورد ذكره سابقاً ، ومن امثلة ذلك تحول نظير اليورانيوم تلقائياً الى نظير الثوريوم واطلاق دقائق الفا.

11-2 التفاعل النووي غير التلقائي


ويتم بقصف النواة بجسيمات او نوى خفيفة

1 - قصف نواة ببنيوترون (انبساط بروتون) كما في المعادلة

الاتية :



2 - قصف نواة بدقيقة الفا كما في المعادلة الاتية :




3- الانشطار النووي Nuclear fission




لو تأملت الصورة اعلاه هل فكرت بضخامة هذا الانفجار وكيف يحدث؟

في عام 1934 اكتشف عالم الماني ان انشطار نزرة اليورانيوم يحدث بسرعة مولداً كمية هائلة من الطاقة يمكن استخدامه باحداث انفجاراً هائلاً فالانشطار النووي هو انشطار نواة ثقيلة الى نواتين متوسطتي الكتلة وتكوين عناصر جديدة مع تولد كميات ضخمة من الطاقة الحرارية والشعاعية ويستخدم نظيري اليورانيوم $^{235}_{92}\text{U}$ والبلوتونيوم $^{239}_{94}\text{Pu}$ كمواد نوية انشطارية كما في الشكل (13-5) . وقد يؤدي الانشطار النووي اذا ترك بدون سيطرة الى انفجار هائل وهذا ما يحصل في انفجار القنبلة الذرية، والصورة اعلاه تبين الطاقة الهائلة المتولدة من انفجار القنبلة الذرية.



الشكل(13-5) انشطار نواة نظير اليورانيوم $^{235}_{92}\text{U}$.

من تطبيقات الانشطار النووي المفاعل النووي لانتاج الطاقة الكهربائية من خلال السيطرة على كمية الطاقة المتولدة اثناء حدوث الانشطار، والشكل (14-5) يوضح احدى المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.




الشكل(14-5) محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية .



كلنا يعرف ان الشمس تمدنا بالطاقة الازمة للحياة ولكن

كيف تتكون هذه الطاقة؟

تحدث في الشمس تفاعلات عديدة ومنها تفاعل يسمى (الاندماج النووي) فمثلاً نجد ان بعض الانوية الثقيلة قابلة على الانشطار فأن بعض الانوية الخفيفة قابلة على الاندماج فالاندماج النووي هو تفاعل يتم فيه اندماج نوى خفيفة لتكوين نوى اثقل ويحدث الاندماج للانوية الخفيفة لنظائر الهيدروجين الديوتيريوم D_1^2 والтриتيوم T_1^3 لانتاج نرة الهيليوم He_2^4 مع تحرر طاقة هائلة جداً وكما موضح في الشكل (15-5) .



التفاعلات الحاصلة في الشمس




الشكل(15-5) الاندماج النووي وتكوين نوة نرة الهيليوم He_2^4 .



يحتاج الاندماج النووي الى طاقة عالية لحدوثه وعندما يحدث هذا الاندماج ينتج عنه انطلاق طاقة هائلة تظهر على شكل حرارة واشعاع كما يحدث في الشمس التي تمدنا بالحرارة والنور والحياة فبدون هذا التفاعل ما وجدت الشمس وما وجدت النجوم ولا حياة من دون تلك الطاقة المسمى طاقة الاندماج النووي ، والتي تكون اكبر بكثير مما يطلقه الانشطار النووي . والقنبلة الهيدروجينية تعتبر مثال على الاندماج النووي .

12-5 الكشف عن الاشعاع



يتم الاستدلال على وجود النشاط الاشعاعي للمواد المشعة بوسائل عديدة منها :

1-12-5 عدد كايكير Geiger Counter

يستخدم هذا العداد للكشف عن النشاط الاشعاعي للمواد المشعة في مختلف المجالات، الشكل (5-16) واساس عمل هذا الجهاز هو ان الاشعة النووية ذات الطاقة العالية تسبب تأين الغاز (غاز الارگون) الموجود في الجزء الحساس من هذا الجهاز وهذا التأين يتحول الى نبضات كهربائية تدير عدداً رقمياً او تولد صوتاً متقطعاً يشير الى النشاط الاشعاعي الصادر من المادة المشعة.

2-12-5 الفلم الفوتوغرافي (الفلم باج)

عبارة عن شريحة من البلاستيك مغطاة بمادة بروميد الفضة AgBr التي تتأثر بكمية الاشعاع المار بالشريحة ويمكن قياس كمية الاشعاع من شدة تأثر هذه الشريحة بالمادة المشعة . ان هذه الشريحة تحفظ في علبة خاصة، الشكل (5-17) وتعلق في ملابس العاملين في الاماكن التي يوجد فيها النشاط الاشعاعي.



الشكل(5-17) احد العاملين في الاماكن التي فيها اشعاع يضع الفلم باج .

13-5 الجرعة الاشعاعية Radiation Dose

تمثل كمية الطاقة الاشعاعية الممتصة في وحدة الكتلة من الجسم وتقاس بوحدة الگري (Gray)

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J / kg}$$

وفي نظام اخر تقامس بوحدة الراد (Rad) حيث :

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ Rad}$$

14-5 الاشعاع المؤين

ان جميع انواع الاشعاعات النووية ذات طاقة عالية جداً ولها قدرة على تأين المواد التي تمر بها. وعليه تعتبر اشعاعات مؤينة اضافة الى الاشعة السينية. ان الاشعاع المؤين هو شكل من اشكال الطاقة تكمن خطورته في انه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لكي يمكن تجنب التعرض له كما انه لا يمكن للانسان ان يحس به كاحساسه بحرارة الشمس او النار مثلاً فيمكنه الابتعاد عنه وانما تتسلل الاشعاعات المؤينة الخفية الى الجسم وتنتقل طاقتها اليه والتي قد تؤدي الى اضرار تتراوح بين عدة ساعات وعشرين السنين حسب الجرعة التي يتعرض لها الجسم ولهذه الاسباب كان من الضروري وضع مبادئ الوقاية من هذه الاشعاعات والتي منها اشعة اكس وكاما والاشعة الكونية وجسيمات بيتا والفا .

15-5 فعل الاشعاع المؤين على الجزيئات في الكائن الحي

1. **مخاطر جسدية** : تعمل على احداث انواع عديدة من السرطانات مثل سرطان الدم وسرطان النخاع وسرطان الغدة الدرقية وسرطان العظام وأورام خبيثة اخرى ، كما يعتبر هذا النوع من الاشعاع من العوامل التي تؤدي الى قصر العمر كما يؤدي الى اضعاف قابلية الاشخاص على مقاومة الامراض الاخري او الالتهابات وثبت ان تعرض الجنين الى جرعة اشعاع مقدارها (1-5 Rad) تعتبر مسببة لسرطان الدم بعد الولادة .

2. **مخاطر وراثية** : يؤدي التعرض للأشعاعات المؤينة الى اضعاف القابلية على الاخذاب وربما العقم التام وكذلك حدوث الطفرات الوراثية كما ان التعرض للأشعاعات المؤينة يؤثر على نسبة الذكور من المواليد .

16-5 التحلل الشعاعي للماء

يعتبر الماء المكون الاساسي للحياة والمذيب الاكثر توفرًا في الطبيعة . وان تحلل الماء بوساطة الاشعاع سوف يؤدي الى تكوين ايونات الماء الموجبة والسلبية ثم تتحلل هذه الايونات

الى ايونات اخرى وجدور حرة ذات طاقة عالية تجعلها فعالة تعمل على الاتحاد مع مكونات الخلية محدثة تغييرًا في مركباتها العضوية والاجزاء الحساسة في الخلايا (الكروموسومات). ولابعني حدوث الضرر الاشعاعي في الخلية او الانسجة بالضرورة الى تعطيل كل وظائف الخلية حيث للنسيج الحي او الخلايا القدرة على اصلاح الضرر الاشعاعي .

17-5 ارشادات الوقاية من الاشعاع

هناك ثلات مفاهيم اساسية لحماية الانسان من الاشعاعات المؤينة التي يتعرض لها :


1. **الزمن** : مقدار التعرض الاشعاعي للشخص يزداد بزيادة زمن التعرض للمصدر الاشعاعي .

2. **المسافة** : يقل مقدار التعرض الاشعاعي للشخص بزيادة المسافة بين الشخص والمصدر المشع وتحديد المسافة الآمنة يعتمد على مقدار طاقة الاشعاع ومقدار النشاط الاشعاعي للمصدر .

3. **الدرع الواقي** : يقلل التعرض الاشعاعي بزيادة سماكة الدرع الواقي حول الاشعاعات ويكون سماكة الدرع تبعاً لنوع وطاقات الاشعاع .

اسئلة الفصل الخامس

7.5 ينحل النظير المشع لعنصر الرصاص Pb ليعطي نظير عنصر البزموت Bi مع انبعاث دقائق بيتا . أكمل معادلة الانحلال واوجد العدد الذري وعدد الكتلة المفقودين ؟



8.5 اكتب رمز وشحنة كل من :

1. دقائق الفا
2. دقائق بيتا
3. اشعة كاما

9.5 العناصر المشعة الآتية تنحل بانبعاث دقائق بيتا السالبة، اكتب معادلة نووية موزونة لعملية انحلال :

1. كاربون ${}^{14}_{6} \text{C}$
2. سترونتيوم ${}^{90}_{38} \text{Sr}$
3. بوتاسيوم ${}^{40}_{19} \text{K}$
4. نتروجين ${}^{13}_{7} \text{N}$

10.5 كيف يتأثر العدد الذري وعدد الكتلة للنواة في حالة انبعاث ؟

1. دقة الفا
2. دقة بيتا
3. اشعة كاما

11.5 بين الاختلاف بين النظائر المشعة وغير المشعة ؟

12.5 شخص النظير الاكثر استقراراً في كل من الازواج الآتية :

1. ${}^{14}_{6} \text{C}$, ${}^{12}_{6} \text{C}$.
2. ${}^1_1 \text{H}$, ${}^3_1 \text{H}$.
3. ${}^{18}_8 \text{O}$, ${}^{16}_8 \text{O}$.
4. ${}^{15}_7 \text{N}$, ${}^{14}_7 \text{N}$.




1.5 عمر النصف للبولونيوم-210 هو 138.4 يوما ، ما كتلة البولونيوم-210 بـ (mg) المتبقية بعد 415.2 يوما، اذا ابتدأت بـ 2 من النظير ؟

2.5 عمر النصف للكوبالت-60 هو 5.27 سنوات، ما كتلة الكوبالت 60 المتبقية له بوحدة(mg)






بعد 52.7 سنة اذا ابتدأت بـ 10 mg منه ؟

3.5 لماذا تكون دقائق الفا ذات الشحنة والكتلة الكبيرتين اقل اختراقاً من دقائق بيتا و اشعة كاما ؟

4.5 أكمل ثم وزن المعادلات النووية الآتية وجد قيم اعداد الكتلة والعدد الذري للعنصر X في كل منها :




5.5 فيما يأتي نظائر مشعة تنحل بانبعاث دقيقة الفا، اكتب ناتج هذا الانحلال لكل نظير بمعادلات موزونة ؟





6.5 احسب طاقة الارتباط النووية لنواة عنصر البولونيوم ${}^{218}_{84} \text{Po}$ علماء كتلة البروتون 1.00866 amu و كتلة النيترون 1.00728 amu والكتلة الذرية للبولونيوم 219.213 amu .

19.5 ما هي الدقيقة التي تحتاجها المعادلة التالية لموازنتها :



20.5 سمي الدقيقة المتبعة او القاصة في كل تفاعل في المعادلات الآتية :



21.5 كيف يتم الحصول على الماء الثقيل؟

22.5 ما الفرق بين الخواص الكيميائية والخواص النووية؟

23.5 اختر الجواب الصحيح من بين الاقواس:


1. في الرمز X^A_Z ان A يمثل (العدد الذري او عدد الكتلة او عدد النيوترونات او عدد الالكترونات)

2. اليورانيوم U^{238} يمثل الرقم (عدد النيوترونات ، عدد الكتلة، عدد البروتونات، العدد الذري)

3. D^2_1 يمثل نظير الهيدروجين (الاعتيادي او الاثقل او الثقيل او ليس له علاقة)

4. يمكن ايقاف دقائق بيتا بوساطة (الورق او الهواء او قطعة من الخشب)

5. في المعادلة النووية



ان العلامة ؟ تمثل (H^1_1 او T^3_1 او n^0_0 او He^4_2)

6. عمر النصف للبولونيوم Po^{218}_{84} هو 3 دقائق فاذا كان لديك كمية من البولونيوم 218 كتلتها g 60 فكم سيبقى منها(بوحدة g) بعد مرور 9 دقائق . (60 او 7.5 او 15 او 30) .

13.5 لماذا تستخدم النظائر المشعة ذات اعمار النصف القصيرة في التشخيص والمعالجة (في الطب) ؟

14.5 اعطي مريض جرعة مقدارها mg 20 من اليود 131 (I¹³¹) كم سيبقى من هذا النظير في الجسم بعد 40 يوما اذا علمت ان عمر النصف له 8 يوم ؟

15.5 اشرح تفاعل الانشطار النووي وكيفية حلوثه ؟

16.5 ما هو الفرق بين التفاعل النووي الحاصل في الشمس والتفاعل النووي الحاصل في المفاعل النووي ؟





17.5 ما الفائدة او الغرض من استخدام الفلم باج عند العمل مع المصادر المشعة المؤينة ؟

18.5 اختر الجواب الصحيح :
1. اذا انحل عنصر مشع بانبعاث دقيقة بيتا:
أ . يتغير العدد الذري .
ب . يبقى عدد النيوترونات ثابتا .
ج . يفقد النظير بروتونا .
د . يتغير عدد الكتلة .

2. العنصر المشع رادون Rn²²² له عمر نصف 3.8 يوم . ما هي الكمية المتبقية من g 20 من هذا العنصر بعد 15.2 يوم ؟

- أ . 5.0 g
- ب . 12.5 g
- ج . 1.25 g
- د . 2.50 g

- 3 - تسمى عملية اتحاد نواتين خفيفتين لتكوين نواة ثقيلة
 4 - ان معدل النشاط الاشعاعي لعينة مشعة لايتآثر ولكنه يتوقف فقط على
 5 - تدعى عدد الانحلالات التي تحدث في الثانية من الزمن وتقاس بوحدة
 6- تتحلل النويات الاكثر استقراراً ولها عمر نصف اما الاقل استقراراً فتحلل ويكون لها عمر نصف
 27.5 اذكر اثنين من الأضرار الناتجة عن تعرض الجسم للإشعاعات النووية .
 28.5 يشكل N^{14} نسبة 99.63 % من مجموع التتروجين في الطبيعة اما N^7 فيشكل ما نسبته 0.37 %. احسب الكتلة الذرية للتتروجين ؟
 29.5 ماعدد البروتونات و النيوترونات واللكترونات في ذرة كل نظير من النظائر الآتية :



7. عندما تشع نواة عنصر ما جسيم بيتا السالب فان(عدد الكتلة ثابت و العدد الذري ينقص ، عدد الكتلة ثابت و العدد الذري يزيد – عدد الكتلة ثابت و العدد الذري ثابت – عدد الكتلة ينقص والعدد الذري ينقص) .

24.5 علل ما ياتي :

1- تؤين دقة ألفانرات الهواء عند مرورها فيه

2 - تنحرف جسيمات الفا في المجالين الكهربائي و المغناطيسي

3 - لا تتأثر اشعة كاما بالمجالين الكهربائي و المغناطيسي ولا تسبب تأين الغازات .

4 - قدرة أشعة كاما على النفاذ اكبر بكثير من قدرة نفاذ جسيمات الفا او بيتا

5 - وجود البروتونات الموجبة الشحنة ضمن النواة دون أن تتنافر .

6 - خطورة الجذور الحرة المتكونة نتيجة التحلل الاشعاعي للماء .

25.5 ما المقصود بكل من :

1) عمر النصف

2) النشاط الإشعاعي لعنصر مشع .

3) عنصر البنت الوليدة .

26.5 أكمل ما ياتي:

1 - من الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الإشعاعات النووية

2 - يتحول نظير الرصاص Pb^{210}_{82} إلى نظير البزموت Bi^{210}_{83} عندما تشع نواته

SI Units and Conversion Factors

الوحدات وعوامل التحويل (1)

الجدول (1)

الطول (Length)	النطاط (Mass)	الزمان (Time)
1 kilometer(km) =1000 meter(m)	1 kilogram =1000 grams (1 kg = 1000 g)	1 hour (h) = 60 minutes (min)
1 mile = 1.61 kilometer (km)	1 amu(واحدة كتلة ذرية)= 1.66×10^{-27} kg	1 hour (h)= 3600 seconds (s)
1 meter(m)=100 centimeter (cm)	amu (واحدة كتلة ذرية)	
الحجم (Volume)	الطاقة (Energy)	الضغط (Pressure)
1 liter (L) = 10^{-3} meter ³ (m ³)	1 Joule (J) = 1 kg . m ² /s ² (exact)	1 atmosphere (atm) = 101.325 Pascal (Pa)
1 liter(L)= 1000 milliliter(mL)	1 calorie (cal)= 4.184 Joules (J)	1 atmosphere(atm) = 760 mm Hg = 760 Torr
1 liter(L)= 1000 centimeter ³ (cm ³)		
1 milliliter (mL) =1centimeter ³ (cm ³)		
الحرارة (Temperature)	النطاط (Mass)	النطاط (Mass)
T Kelvin(K)=t Celsius (°C) +273	1 kilogram =1000 grams (1 kg = 1000 g)	1 mmHg =1 Torr
F Fahrenheit= $\frac{9}{5} \times t$ Celsius (°C) +32	1 amu(واحدة كتلة ذرية)= 1.66×10^{-27} kg	

Other Symbols and abbreviations (المختصرات العلمية)

α	alpha particals (دقائق ألفا)	h hour (ساعة)	ml milliter (volume) مليتر (حجم)
β	beta particals (دقائق بيتا)	J Joule(energy) جول (وحدة طاقة)	mm millimeter (length) ممتر (طول)
γ	gamma rays (أشعة كاما)	K Kelvin (temperature) (حرارة)	mole (amount) مول(كمية)
	atomic mass unit (amu) (وحدة كتلة ذرية)	kg kilogram (mass) كيلوغرام (كتلة)	(mp) melting point نقطة انصهار
(aq)	aqueous solution (محلول مائي)	kPa kilopascal (pressure) كيلوباسكال (ضغط)	n° neutron نيوترون
(atm)	atmosphere (pressure) (وحدة ضغط)	L liter (volume) لتر (حجم)	n number of moles عدد المولات
bp	boiling point (نقطة الغليان)	(l) liquid (سائل)	n principal quantum number عدد الأكم الرئيسي
°C	degree Celsius (temperature) (درجة سيلزية)	M molar mass الكتلة المولية	P pressure ضغط
C	Speed of light in vacumm (سرعة الضوء)	m meter (length) متر (طول)	p ⁺ proton بروتون
cm	centimeter (length) (سنتيمتر وحدة الطول)	Pa pascal (pressure) باسكال ضغط	V volume حجم
E	energy(الطاقة)	R ideal gas constant ثابت الغاز المثالي	
e ⁻	electron(الكترون)	t _{1/2} half-life time زمن عمر النصف	s second ثانية
g	gram (mass) غرام (وحدة الكتلة)	T temperature درجة حرارة	(s) solid صلب
(g)	gas (g) (غاز)	STP Standard Temperature and Pressure الذئام الدولي للوحدات	SI international System of Units النظام الدولي للوحدات

العناصر ورموزها واعدادها الذرية واعداد كتلتها

العنصر	الرمز	العدد الذري	عدد الكتلة	العنصر	الرمز	العدد الذري	عدد الكتلة
Actinium	Ac	89	227	Einsteinium	Es	99	254
Aluminium	Al	13	27	Erbium	Er	68	167
Americium	Am	95	243	Europium	Eu	63	152
Antimony	Sb	51	122	Fermium	Fm	100	253
Argon	Ar	18	40	Fluorine	F	9	19
Arsenic	As	33	75	Francium	Fr	87	223
Astatine	At	85	210	Gadolinium	Gd	64	157
Barium	Ba	56	137	Gallium	Ga	31	70
Berkelium	Bk	97	247	Germanium	Ge	32	53
Beryllium	Be	4	9	Gold	Au	79	197
Bismuth	Bi	83	209	Hafnium	Hf	72	178
Boron	B	5	11	Helium	He	2	4
Bromine	Br	35	80	Holmium	Ho	67	165
Cadmium	Cd	48	112	Hydrogen	H	1	1
Calcium	Ca	20	40	Indium	In	49	115
Californium	Cf	98	249	Iodine	I	53	127
Carbon	C	6	12	Iridium	Ir	77	192
Cerium	Ce	58	140	Iron	Fe	26	56
Cesium	Cs	55	133	Krypton	Kr	36	84
Chlorine	Cl	17	35	Lanthanum	La	57	139
Chromium	Cr	24	52	Lawrencium	Lr	103	259
Cobalt	Co	27	59	Lead	Pb	82	207
Copper	Cu	29	63	Lithium	Li	3	7
Curium	Cm	96	245	Lutetium	Lu	71	175
Dysperosium	Dy	66	163	Magnesium	Mg	12	24

العناصر ورموزها واعدادها الذرية واعداد كتلتها

العنصر	الرمز	العنصر	الرمز	العنصر	الرمز	العنصر	الرمز
عدد الكتلة	العدد الذري	الرمز	العنصر	عدد الكتلة	العدد الذري	الرمز	العنصر
101	44	Ru	Ruthenium	55	25	Mn	Manganese
150	62	Sm	Samarium	256	101	Md	Mendelevium
45	21	Sc	Scandium	201	80	Hg	Mercury
79	34	Se	Selenium	96	42	Mo	Molybdenum
28	14	Si	Silicon	144	60	Nd	Neodymium
108	47	Ag	Silver	20	10	Ne	Neon
23	11	Na	Sodium	237	93	Np	Neptunium
79	38	Sr	Strontium	59	28	Ni	Nickel
32	16	S	Sulfur	93	41	Nb	Niobium
181	73	Ta	Tantalum	14	7	N	Nitrogen
99	43	Tc	Technetium	253	102	No	Nobelium
128	52	Te	Tellurium	190	76	Os	Osmium
159	65	Tb	Terbium	16	8	O	Oxygen
204	81	Tl	Thallium	106	46	Pd	Palladium
232	90	Th	Thorium	31	15	P	Phosphorus
169	69	Tm	Thulium	195	78	Pt	Platinum
119	50	Sn	Tin	242	94	Pu	Plutonium
48	22	Ti	Titanium	210	84	Po	Polonium
184	74	W	Tungsten	39	19	K	Potassium
238	92	U	Uranium	141	59	Pr	Praseodymium
51	23	V	Vanadium	145	61	Pm	Promethium
131	54	Xe	Xenon	231	91	Pa	Protactinium
173	70	Yb	Ytterbium	226	88	Ra	Radium
89	39	Y	Yttrium	222	86	Rn	Radon
65	30	Zn	Zinc	186	75	Re	Rhenium
91	40	Zr	Zirconium	103	45	Rh	Rhodium