

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

س د

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٩

(وثيقة بحمية/محلود)

المبحث : الكيمياء (خطة ٢٠١٩)

الفرع : العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي (مسار الجامعات)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٤٥ علامة)

أ - يُبين الجدول المجاور محاليل لقواعد ضعيفة متساوية التركيز (١) مول/لتر، عند درجة حرارة (٢٥)°س، ومعلومات عنها ( $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ،  $pK_a = 7.0$ )، ادرسه ثم أجب عن الأسئلة الآتية: (٣٣ علامة)

(١) ما صيغة القاعدة الأضعف؟

(٢) ما صيغة الحمض المرافق للقاعدة التي لها أعلى pH؟

(٣) أي من المحلولين ( $N_2H_4$  أم  $CH_3NH_2$ ) يكون فيه  $[OH^-]$  أعلى؟

(٤) أي من القواعد يكون لحمضها المرافق أقل pH؟

(٥) ما قيمة pH لمحلول  $CH_3NH_2$ ؟

(٦) فسّر السلوك القاعدي لـ  $NH_3$  وفق مفهوم لويس.

منهاجي  
متعة التعليم الهادف

(٧) أي من المحلولين الملحيين ( $NH_4Cl$  أم  $N_2H_5Cl$ ) أقل قدرة على التميّه.

(٨) فسّر بمعادلة السلوك القاعدي لمحلول  $N_2H_4$  حسب مفهوم برونستد ولوري.

(٩) اكتب الأزواج المترافقة عند تفاعل  $NH_4^+$  مع  $CH_3NH_2$ .

(١٠) ماذا يحدث لتركيز  $[H_3O^+]$  عند إضافة بلورات الملح  $N_2H_5Cl$  إلى محلول  $N_2H_4$  (نقل ، تزداد)؟

(١١) احسب  $K_b$  لمحلول  $NH_3$ .

ب- احسب قيمة pH لمحلول HBr تركيزه ( $1.0 \times 10^{-2}$ ) مول/لتر. (٣ علامات)

ج- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٩ علامات)

(١) إذا كانت قيمة pH لمحلول مكون من الحمض HA والملح KA لهما التركيز نفسه تساوي (٤)،

فإن قيمة  $K_a$  للحمض تساوي:

(د) ( $1.0 \times 10^{-7}$ )

(ج) ( $1.0 \times 10^{-8}$ )

(ب) ( $1.0 \times 10^{-4}$ )

(أ) ( $1.0 \times 10^{-2}$ )

(٢) الملح الذي يُعد ذوبانه في الماء تميّهًا من الأملاح الآتية هو:

(د) NaI

(ج) NaCl

(ب) KCl

(أ) KClO

(٣) المادة التي تسلك سلوكًا مترددًا هي:

(د)  $CO_3^{2-}$

(ج)  $SO_4^{2-}$

(ب)  $H_2O$

(أ)  $H_3O^+$

السؤال الثاني: (٣٧ علامة)

أ - محلول حمض افتراضي HZ حجمه (٢) لتر، تركيزه (٠,١) مول/لتر، وقيمة pH له (٣)، أُضيفت إليه بلورات من الملح NaZ فزادت قيمة pH بمقدار (٢). ( $K_a$  الحمض =  $1 \times 10^{-٥}$ )،

أجب عن الأسئلة الآتية: (٧ علامات)

(١) ما صيغة الأيون المشترك؟ (٢) احسب عدد مولات الملح NaZ التي أُضيفت للمحلول.

ب- التفاعل الآتي يحدث في وسط حمضي، ادرسه ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: (١٢ علامة)



(١) اكتب نصف تفاعل التأكسد موزوناً. (٢) اكتب نصف تفاعل الاختزال موزوناً.

(٣) حدّد العامل المؤكسد في التفاعل. (٤) ما عدد تأكسد ذرة S في الأيون  $\text{HSO}_3^-$ ؟

ج- اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي: (٩ علامات)

(١) قطب مرجعي يُستخدم لمعرفة جهد الاختزال المعياري لقطبي الخلية الغلفانية.

(٢) الشحنة الفعلية لأيون الذرة في المركبات الأيونية.

(٣) المادة التي تتأكسد في التفاعل وتتسبب في اختزال غيرها.

د- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٩ علامات)

منهاجي  
متعة التعليم العادف



(١) المادة التي يمكن أن تسلك كعامل مؤكسد هي:

(أ)  $\text{Cl}^-$  (ب)  $\text{F}_2$  (ج) Na (د)  $\text{F}^-$

(٢) عند تأكسد HClO ينتج  $\text{ClO}_3^-$  فإن مقدار التغير في عدد تأكسد ذرة الكلور Cl يساوي:

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٥

(٣) أعلى عدد تأكسد لذرة النيتروجين N يكون في:

(أ)  $\text{N}_2\text{H}_4$  (ب)  $\text{NH}_3$  (ج)  $\text{NO}_2^-$  (د)  $\text{NO}_3^-$

السؤال الثالث: (٤٣ علامة)

أ - يُبيّن الجدول المجاور جهود اختزال معيارية لبعض المواد. ادرسه، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: (١٦ علامة)

العادة	$E^\circ$ فولت
$\text{Cr}^{3+}$	-٠,٧٣
$\text{Ag}^+$	٠,٨٠
$\text{Zn}^{2+}$	-٠,٧٦
$\text{Cu}^{2+}$	-٠,٣٤
$\text{Fe}^{2+}$	-٠,٤٤
$\text{Al}^{3+}$	-١,٦٦
$\text{Ni}^{2+}$	-٠,٢٣

(١) حدّد أقوى عامل مؤكسد.

(٢) أي الفلزين (Cu أم Ni) يُحرّر غاز  $\text{H}_2$  من محلول حمض HCl المخفّف؟

(٣) هل تستطيع أيونات  $\text{Cr}^{3+}$  أكسدة عنصر النيكل Ni؟

(٤) أي القطبين تقل كتلته في الخلية الغلفانية (Zn/Fe)؟

(٥) هل يمكن تحريك أحد أملاح الألمنيوم Al بملعقة من الكروم Cr؟

(٦) احسب جهد الخلية المعياري ( $E^\circ$ ) للخلية الغلفانية المكوّنة من (Cu, Ni).

(٧) حدّد فلزين يكوّنان خلية غلفانية لها أعلى جهد.

(٨) حدّد اتجاه حركة الإلكترونات في الخلية المكوّنة من (Cu/Ag).

الصفحة الثالثة

ب- في خلية غلفانية قطباها (Sn/Ag) يتحرف مؤشر الغلفانوميتر باتجاه قطب Ag، إذا علمت أن Sn أيون ثنائي الشحنة في مركباته، و Ag أيون أحادي الشحنة في مركباته، أجب عما يأتي: (٨ علامات)

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



- (١) حدّد المصعد في الخلية.
- (٢) اكتب معادلة موازنة تُمثل التفاعل الكلي الذي يحدث في الخلية.
- (٣) ما شحنة المهبط؟

(١٥ علامة)

ج- يُبين الجدول التالي بيانات تفاعل افتراضي عند درجة حرارة معيّنة:  
 $A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$  ، إذا علمت أن رتبة التفاعل الكلي = (٣)،

رقم التجربة	[A] مول/لتر	[B] مول/لتر	سرعة التفاعل مول/لتر.ث
١	٠,١	٠,١	$٠,٤ \times ١٠^{-٢}$
٢	٠,٣	٠,١	$١,٢ \times ١٠^{-٢}$
٣	٠,٣	٠,٤	س

- ادرسه جيداً، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
- (١) ما رتبة التفاعل للمادة A؟
  - (٢) ما رتبة التفاعل للمادة B؟
  - (٣) اكتب قانون السرعة للتفاعل.
  - (٤) ما قيمة ثابت السرعة k؟

(٥) احسب سرعة التفاعل في التجربة رقم (٣).

د - فسّر: يتم حرق نشارة الخشب بسرعة أكبر من حرق قطعة من الخشب لها الكتلة نفسها. (٤ علامات)

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



السؤال الرابع: (٤٢ علامة)

أ - في التفاعل الافتراضي  $A_2 + B_2 \xrightarrow{C} 2AB + 20KJ$ ، إذا علمت أن طاقة وضع المواد المتفاعلة = (٦٠) كيلوجول، وعند استخدام العامل المساعد C كتلته (٣) غ، انخفضت طاقة وضع المعقد المنشط بمقدار (٤٠) كيلوجول لتصبح (٨٠) كيلو جول، أجب عن الأسئلة الآتية:

(٢١ علامة)

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



- (١) ما قيمة طاقة وضع المعقد المنشط بدون العامل المساعد؟
- (٢) ما قيمة طاقة وضع المواد الناتجة؟
- (٣) ما قيمة التغير في المحتوى الحراري  $\Delta H$  للتفاعل؟
- (٤) ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد؟
- (٥) ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون وجود العامل المساعد؟
- (٦) هل التفاعل السابق ماص أم طارد للطاقة؟
- (٧) ما مقدار كتلة العامل المساعد C عند نهاية التفاعل؟

يتبع الصفحة الرابعة/ ...






منهاجي  
متعة التعليم الهادف



الصفحة الرابعة

(١٥ علامة)

ب- أكمل المعادلات الآتية وذلك بكتابة الناتج العضوي فقط:



منهاجي

متعة التعليم الهادف



(٦ علامات)


ج- اكتب الصيغة البنائية للحمض والصيغة البنائية للكحول المكونين للإستر الآتي:



السؤال الخامس: (٣٣ علامة)

أ- ادرس المخطط التالي، ثم اكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية المشار إليها بالرموز A ، B ، C ، D

(١٢ علامة)



منهاجي

متعة التعليم الهادف



ب- مبيئاً بالإيثان  $\text{CH}_3\text{CH}_3$  ومستخدماً أي مواد غير عضوية مناسبة، حضر المركب ثنائي إيثيل إيثر


(١٢ علامة)



(٩ علامات)

ج- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

(١) صيغة المركب العضوي الذي يتفاعل مع محلول تولينز ويكون مرآة فضية هي:



( أ ) الهلجنة ( ب ) الهدرجة ( ج ) الاستبدال ( د ) الحذف

(٣) عند تفاعل فلز Na مع الكحولات يتصاعد غاز:



﴿ انتهت الأسئلة ﴾



مدة الامتحان:  $\frac{1}{2}$  ساعة  
التاريخ: ١٩/٦/٢٠١٩

المبحث: الكيمياء (فصل ٢٠١٩)  
الفرع: المعادن + (الزئبق لثلاثي الفوسفات)

الإجابة النموذجية:

# منهاجي



منوعة التعليم الحادف

السؤال الأول (٢٠١٩)

رقم الصفحة  
في الكتاب

٤٠-٩

٢

١.  $C_6H_5NH_2$

٣

٢.  $C_2H_5NH_3^+$

٢

٣.  $CH_3NH_2$

٢

٤.  $C_6H_5NH_2$

لا يزال

٢

٥.  $AlCl_3$  ← المركب المتأين في الحالة السائلة

٢

٦.  $N_2O$  تمتلك زوجاً من الإلكترونات غير الرابطة يمكن أن تمنحها المادة أخرى كقوة أو تمتلك أملاكاً فارغة

٣

٧.  $NH_4Cl$

٣

٨.  $N_2H_4 + H_2O \rightleftharpoons N_2H_5^+ + OH^-$

٤

٩.  $NH_4^+ / NH_3$  ٦  $CH_3NH_2 / CH_3NH_3^+$  (كل زوج عرضي) ٤

٣

١٠. - - - - -

٣

١١.  $K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$

٣

١٢.  $1.6 \times 10^{-4} = \frac{1.6 \times 10^{-4}}{1}$

٣

١٣.  $1.6 \times 10^{-4} = \frac{1.6 \times 10^{-4}}{1}$

# منهاجي




منوعة التعليم الحادف


رقم الصفحة  
أو التاريخ

1-1

تأثير الازالة



في الماء النقي




(تأثير الازالة)

(تأثير الازالة)

# منهاجي

منعة التعليم القادف



منهاجي

متعة التعليم الهادف



السؤال الثاني

P, I, 2

رقم الصفحة  
في الكتاب

٥٢-٢٩

٢

١

١

١

١

١

١

٢

٣

٣

٣

٢

٣

$0 = pH$

$[H_3O^+] = [Z^-]$   
 $K_a = \frac{[Z^-][H_3O^+]}{[H_2Z]}$

منهاجي  
 متعة التعليم الهادف

$[Z^-] = [NaZ]$

$[Z^-] = [NaZ]$

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow HSO_4^- + H_3O^+$

$HSO_4^- + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + H_3O^+$

$2HSO_4^- + 2H_2O \rightarrow 2SO_4^{2-} + 4H_3O^+$

العملية الكلية

$2HSO_4^- + 2H_2O \rightarrow 2SO_4^{2-} + 4H_3O^+$

منهاجي

متعة التعليم الهادف



F<sub>2</sub> (ب)

(٤) (٥)

(٥) (٦)




رقم الصفحة  
رقم الكتاب

السؤال الثالث

١٠٨-١٠٩	٢	Ag <sup>+</sup>	١
	٢	Ni	٥
	٢	V	٣
	٢	Zn	٤
	٢	نعم	٥
	٢	٠.٥٧	٦
	٢	AL/Ag	٧
	٢	Ag <sup>+</sup> / Ag	٨
	٢	Sn	٩
	٤	Sn + 2Ag <sup>+</sup> → Sn <sup>2+</sup> + 2Ag	١٠
	٢		١١

منهاجي



متعة التعليم الهادف

١١٧-١٢٢	٣		١
	٣		٥
	٣	إذا، مطا ف ليست	٣
	٣	وعوضها بالتوازن	٤
	٣		٥
	٣		٥

١٣٩  
 ١٠ عدد الجزيئات المتفاعلة <sup>①</sup> وقدرها سرعة التفاعل <sup>②</sup>  
 ١١ عدد الجزيئات الناتجة <sup>①</sup> وقدرها سرعة التفاعل <sup>②</sup>  
 ١٢ عدد الجزيئات المتفاعلة <sup>①</sup> وقدرها سرعة التفاعل <sup>②</sup>

منهاجي



متعة التعليم الهادف







169-191






منهاجي



متعة التعليم الهادف



(مركب، كحول، كحول)



منهاجي



متعة التعليم الهادف