

إجابات تدريبات الدرس

نظريات النهايات

تدريب ١

إذا كان $q = 2s$ ، $h = 3s$ ، فجد كلاً مما يأتي:

$$(1) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} + h \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right)$$

$$(3) \text{ نهايا } \left(\sqrt{3 + \frac{q}{s}} + \sqrt{\frac{q}{s}} \right) \text{ نهايا } \left(\sqrt{\frac{q}{s}} \right)$$

الحل:

$$(1) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} + h \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right)$$

$$2^- \times (2^- + 2(2^-)) + 2^- \times 2 =$$

$$20 + 4^- = 2^- \times 10^- + 4^- =$$

$$16 =$$

$$(2) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right) \text{ نهايا } \left(\frac{q}{s} \right)$$

$$(3) \text{ نهايا } \left(\sqrt{3 + \frac{q}{s}} + \sqrt{\frac{q}{s}} \right) \text{ نهايا } \left(\sqrt{\frac{q}{s}} \right)$$

$$15 + \sqrt{1 + 1} \sqrt{3 + 1 \times 2} \sqrt{}$$

$$15 + \sqrt{2} \sqrt{3} + \sqrt{2} \sqrt{}$$

$$15 + \sqrt{2} \sqrt{4}$$

تدريب ٢

جد كلاً مما يأتي:

$$(2) \text{ نهايا } \left| s - 16 \right| \text{ نهايا } \left| s - 16 \right|$$

$$(1) \text{ نهايا } \left| s - 8 \right| \text{ نهايا } \left| s - 8 \right|$$

$$(3) \text{ نهايا } \left| s^2 - 16 \right| \text{ نهايا } \left| s^2 - 16 \right|$$

الحل:

$$(1) \text{ نهيا } |8 - 0| = |8 - 0|$$

$$|8 - 0| =$$

$$|8| =$$

تعويض مباشر؛ لأن الصفر ليس جذر (صفر) للاقتزان ما داخل المطلق.

$$(2) \text{ نهيا } |16 - 0| = |16 - 0|$$


$$16 - 0 = 16 = 0 \leftarrow \text{صفر} \quad 16 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 16 \leq 0, \quad 16 - 0 \\ 16 > 0, \quad 0 - 16 \end{array} \right\} = |16 - 0|$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نهيا } |16 - 0| = 0 \\ \text{نهيا } |16 - 0| = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{نهيا } |16 - 0| = 0$$

$$(3) \text{ نهيا } |16 - 4| = |16 - 4|$$

$$16 - 4 = 12 = 0 \leftarrow \text{صفر} \quad 16 - 4 = 0$$



$$\text{نهيا } |16 - 4| = 0$$

$$\text{نهيا } |16 - 4| = 0$$

$$\text{نهيا } |16 - 4| = 0$$

تدريب 3

جد كلاً من النهايات الآتية:

$$(1) \text{ نهيا } [2 - 4]$$

$$(2) \text{ نهيا } [2 - 1]$$

$$(3) \text{ نهيا } [0, 25]$$

$$(4) \text{ نهيا } [1 + 0]$$

الحل:

(١) نهيا [س - ٢] $\leftarrow_{١}$ نعيد التعريف حول النقطة س = ١

$$\leftarrow \begin{array}{c} | \\ \cdot \\ | \\ ١ \\ | \\ ٢ \\ | \\ \cdot \\ | \\ \cdot \end{array} \rightarrow \quad ١ = \frac{١}{|\text{معامل س}|} = \delta$$

$$\left. \begin{array}{l} ٢ > س \geq ١ , \quad ١ - \\ ١ > س \geq ٠ , \quad ٢ - \end{array} \right\} = [س - ٢]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نهيا } [س - ٢] \leftarrow_{١} = ١ - \\ \text{نهيا } [س - ٢] \leftarrow_{١} = ٢ - \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{نهيا } [س - ٢] \leftarrow_{١} \text{ غير موجودة}$$

$$\leftarrow \begin{array}{c} | \\ \cdot \\ | \\ ٠,٥ \\ | \\ ١ \\ | \\ ١,٥ \\ | \\ ٢ \\ | \\ \cdot \\ | \\ \cdot \end{array} \rightarrow \quad \frac{١}{٢} = \delta \quad \text{نهيا } [٢س - ٤] \leftarrow_{١,٥}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{صفر} , \quad ٢ \geq س > ١,٥ \\ ١ , \quad ١,٥ \geq س \geq ١ \end{array} \right\} = [٢س - ٤]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نهيا } [٢س - ٤] \leftarrow_{١,٥} = \text{صفر} \\ \text{نهيا } [٢س - ٤] \leftarrow_{١,٥} = ١ \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{نهيا } [٢س - ٤] \leftarrow_{١,٥} = ١ \text{ غير موجودة}$$


(٣) نهيا [س + ١] $\leftarrow_{٠,١}$

$$\leftarrow \begin{array}{c} | \\ \cdot \\ | \\ ١ \\ | \\ \cdot \\ | \\ \cdot \end{array} \rightarrow \quad ١ = \delta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{صفر} \geq س > ١ \\ ١ > س \geq ٠ \end{array} \right\} = [س + ١]$$

$$\text{نهيا } [س + ١] \leftarrow_{٠,١} = ١$$

$$\frac{1}{4} = 0,25$$



$$\varepsilon = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq s < 4 \\ 4 \leq s < 8 \end{array} \right\} = [0, 25]$$

$$1 = \text{نهايا} [0, 25]_{\leftarrow \varepsilon}$$

$$0 = \text{نهايا} [0, 25]_{\leftarrow \varepsilon}$$

$$\text{نهايا} [0, 25]_{\leftarrow \varepsilon} = \text{غير موجودة}$$

تدريب ٤

إذا كان $q(s) = [2 - s]$ ، فأجب عن كل مما يأتي:

(١) جد قيم a التي تجعل $\text{نهايا} q(s)$ غير موجودة

(٢) جد قيم a التي تجعل $\text{نهايا} q(s) = 1 - a$

الحل:

(١) قيم a هي جميع قيم a حيث:

$$a \in \mathbb{R}$$

(٢) قيم a هي $(2, 3)$

تدريب ٥

جد كلاً من النهايات الآتية:

$$(٢) \text{نهايا} \sqrt{s-7}$$

$$(١) \text{نهايا} \sqrt{s-7}$$

$$(٤) \text{نهايا} \sqrt{s^2-25}$$

$$(٣) \text{نهايا} \sqrt{s^2-25}$$


الحل:

(1) نهايا $\sqrt{s-7}$ $\leftarrow s=7$ صفر $\leftarrow s=7$ صفر

$$\left. \begin{aligned} \text{نهايا } \sqrt{s-7} &= \text{صفر} \\ \text{نهايا } \sqrt{s-7} &= \text{غير موجودة} \end{aligned} \right\} \text{نهايا } \sqrt{s-7} = \text{غير موجودة}$$

(2) نهايا $\sqrt{s-7}$ $\leftarrow s=7$ غير موجودة

(3) نهايا $\sqrt{s^2-25}$ $\leftarrow s=5$ صفر $\leftarrow s=5$ صفر $\leftarrow s=5$ صفر $\leftarrow s=5$ صفر



$$\left. \begin{aligned} \text{نهايا } \sqrt{s^2-25} &= \text{صفر} \\ \text{نهايا } \sqrt{s^2-25} &= \text{غير موجودة} \end{aligned} \right\} \text{نهايا } \sqrt{s^2-25} = \text{غير موجودة}$$

(4) نهايا $\sqrt{s^2-25}$ $\leftarrow s=7$ $\sqrt{24} = \sqrt{25-1} = \sqrt{24}$


تدريب 6

$$\left. \begin{aligned} s \leq 2 & , & |s-2| \\ s > 2 & , & [s-6] \end{aligned} \right\} = \text{إذا كان ق(س)}$$

فجد نهايا ق(س)

الحل:

$$س - ٢ = \text{صفر} \leftarrow س = ٢$$



$$\left. \begin{array}{l} ٣ \geq س > ٢ , ٣ \\ ٢ \geq س > ١ , ٤ \end{array} \right\} = [س - ٦]$$

$$\left. \begin{array}{l} ٢ < س , ٢ - س \\ ٢ \geq س > ١ , ٤ \end{array} \right\} = \text{ق(س)}$$

$$\text{نهاق(س)} = \text{صفر} \leftarrow س \leftarrow ٢ \quad \Leftrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{نهاق(س)} = ٤ \\ \text{نهاق(س)} = ٢ \end{array} \right.$$

تدريب ٧

إذا كان ق(س) = [س + ٥] ، ل(س) = [س - ٤] ، فجد كلاً مما يأتي:

(١) نهاق(س) $\leftarrow س$ (٢) نهاق(س) $\leftarrow س$ غير موجودة

(٣) نهاق(س) + ل(س) $\leftarrow س$

ماذا تلاحظ؟

الحل:

(١) نهايات (س) $1 = 1$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 > s \geq 1, \quad 6 \\ 1 > s \geq 0, \quad 5 \end{array} \right\} = [5 + s]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 6 = \text{نهايات (س)}_{+1} \\ 5 = \text{نهايات (س)}_{-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \text{نهايات (س)}_{\pm 1} = \text{غير موجودة}$$

(٢) نهايات (س)

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 \geq s > 1, \quad 2 \\ 1 \geq s > 0, \quad 3 \end{array} \right\} = [s - 4]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 = \text{نهايات (س)}_{+1} \\ 3 = \text{نهايات (س)}_{-1} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \text{نهايات (س)}_{\pm 1} = \text{غير موجودة}$$

(٣) نهايات (س) + (س) ل

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 > s > 1, \quad 8 \\ 1 > s > 0, \quad 8 \\ 1 = s, \quad 9 \end{array} \right\} = (س) ل + (س) ق$$

$$8 = \left((س) ل + (س) ق \right)_{\pm 1} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 8 = \text{نهايات (س) ل + (س) ق}_{+1} \\ 8 = \text{نهايات (س) ل + (س) ق}_{-1} \end{array} \right.$$

لاحظ أنه قد تكون نهاية أحد الاقترانين أو كلاهما غير موجودة، ولكن قد تصبح النهاية موجودة بعد

تطبيق عملية حسابية عليها.