

## إجابات الأسئلة التكامل المحدود

### السؤال الأول

احسب قيمة كل مما يأتي :

$$(أ) \int_1^6 2 - x \, dx$$

$$(ج) \int_0^6 (2x^2 + 8x^3 - 5x^4 + 7) \, dx$$

$$(ب) \int_1^8 \frac{1}{\sqrt[3]{8x}} \, dx$$

$$(د) \int_{-2}^2 (3x^2 - 2)(x + 1) \, dx$$

الحل :

$$(أ) \int_1^6 2 - x \, dx = 2x - \frac{1}{2}x^2 \Big|_1^6 = 2(6) - \frac{1}{2}(6)^2 - \left( 2(1) - \frac{1}{2}(1)^2 \right) = 12 - 18 - \left( 2 - \frac{1}{2} \right) = -4 - \frac{3}{2} = -\frac{11}{2}$$

$$(ب) \int_1^8 \frac{1}{\sqrt[3]{8x}} \, dx = \int_1^8 \frac{1}{2\sqrt[3]{x}} \, dx = \frac{1}{2} \int_1^8 x^{-\frac{1}{3}} \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} \right]_1^8 = \frac{3}{4} \left[ \sqrt[3]{x^2} \right]_1^8 = \frac{3}{4} \left( \sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{1} \right) = \frac{3}{4} (4 - 1) = \frac{9}{4}$$

$$(ج) \int_0^6 (2x^2 + 8x^3 - 5x^4 + 7) \, dx = \left[ \frac{2}{3}x^3 + 2x^4 - x^5 + 7x \right]_0^6 = \left( \frac{2}{3}(6)^3 + 2(6)^4 - (6)^5 + 7(6) \right) - 0 = \frac{2}{3}(216) + 2(1296) - 7776 + 42 = 144 + 2592 - 7776 + 42 = -5000$$

$$(د) \int_{-2}^2 (3x^2 - 2)(x + 1) \, dx = \int_{-2}^2 (3x^3 + 3x^2 - 2x - 2) \, dx = \left[ \frac{3}{4}x^4 + x^3 - x^2 - 2x \right]_{-2}^2 = \left( \frac{3}{4}(16) + 8 - 4 - 4 \right) - \left( \frac{3}{4}(16) - 8 - 4 + 4 \right) = (12 + 8 - 4 - 4) - (12 - 8 - 4 + 4) = 12 - 12 = 0$$

$$(ج) \int_0^2 (2s^2 + 8s^3 - 5s^4 + 7) ds = (2s^3 + 2s^4 - s^5 + 7s) \Big|_0^2 =$$

$$18 = 14 + 32 - 32 + 4 = (2) \cdot 7 + (2) - (2) \cdot 2 + (2) =$$

$$(د) \int_0^2 (2 - s + 3s^2) ds = \int_0^2 (2 - s + 3s^2) ds = \int_0^2 (1 + s) (2 - s) ds =$$

$$(2 - s) \times 2 - \frac{(2-s)^2}{2} + 3(2-s) = \left[ (2-s)^2 - \frac{(2-s)^2}{2} + 3(2-s) \right]_0^2 =$$

$$8 = 2 - 6 = (4 + 2 + 8) - (4 - 2 + 8) =$$

شاهد الفيديو التالي لفهم درس التكامل المحدود

### السؤال الثاني

$$\text{إذا كان } \int_1^m 4 ds = 20, \text{ فجد قيمة الثابت } m.$$

**الحل :**

$$4 = m \leq 5 = 1 + m \leq 20 = (1 + m) 4 \leq 20 = (1 - m) 4$$

### السؤال الثالث

إذا كان الاقتران  $q$  معرفاً على الفترة  $[1, 5]$ ، وكان  $q'(s) = 2s + 1$ ، فجد قيمة  $q(5) - q(1)$

**الحل :**

$$\int_1^5 q'(s) ds = q(5) - q(1)$$

$$28 = 2 - 30 = (1 + 2) - (5 + 5) = \int_1^5 (2s + 1) ds = q(5) - q(1)$$

## السؤال الرابع

احسب قيمة التكامل الآتي :  $\int_2^2 (4s - 2s^2 + 3) ds$  .

الحل :

$$\int_2^2 (4s - 2s^2 + 3) ds = \left[ 2s^2 - \frac{2}{3}s^3 + 3s \right]_2^2$$

$$= \left( 2(2)^2 - \frac{2}{3}(2)^3 + 3(2) \right) - \left( 2(2)^2 - \frac{2}{3}(2)^3 + 3(2) \right) = 0$$

وهذه من خصائص التكامل المحدود  $\int_a^a f(x) dx = 0$  .

## السؤال الخامس

احسب قيمة كل من التكاملات الآتية :-

(أ)  $\int_1^2 (4 - 2s^2) ds$

(ب)  $\int_1^2 (3 - s^2) ds$

(ج)  $\int_1^2 \frac{s^2 + 2s - 1}{s - 1} ds$

الحل :

(أ)  $\int_1^2 (4 - 2s^2) ds = \left[ 4s - \frac{2}{3}s^3 \right]_1^2 = \left( 4(2) - \frac{2}{3}(2)^3 \right) - \left( 4(1) - \frac{2}{3}(1)^3 \right) = \left( 8 - \frac{16}{3} \right) - \left( 4 - \frac{2}{3} \right) = \frac{24 - 16 - 12 + 2}{3} = \frac{2}{3}$

(ب)  $\int_1^2 (3 - s^2) ds = \left[ 3s - \frac{1}{3}s^3 \right]_1^2 = \left( 3(2) - \frac{1}{3}(2)^3 \right) - \left( 3(1) - \frac{1}{3}(1)^3 \right) = \left( 6 - \frac{8}{3} \right) - \left( 3 - \frac{1}{3} \right) = \frac{18 - 8 - 9 + 1}{3} = \frac{2}{3}$

(ج)  $\int_1^2 \frac{s^2 + 2s - 1}{s - 1} ds = \int_1^2 \left( s + 3 + \frac{2}{s-1} \right) ds = \left[ \frac{1}{2}s^2 + 3s + 2 \ln|s-1| \right]_1^2 = \left( \frac{1}{2}(2)^2 + 3(2) + 2 \ln|2-1| \right) - \left( \frac{1}{2}(1)^2 + 3(1) + 2 \ln|1-1| \right) = \left( 2 + 6 + 2 \ln 1 \right) - \left( \frac{1}{2} + 3 + 2 \ln 0 \right) = 8 - \frac{1}{2} - 2 \ln 0 = \frac{15}{2} - 2 \ln 0$

شاهد الفيديو التالي لفهم حل أسئلة درس التكامل المحدود

$$(ب) \int_1^{-1} (3 - 2s)^2 ds = \int_1^{-1} (9 + 12s - 4s^2) ds = \int_1^{-1} (9 + 12s - 4s^2) ds$$

$$(1 \times 9 + 2 \times 1 \times 6 - 4 \times \frac{1}{3}) - (1 \times 9 + 2 \times (-1) \times 6 - 4 \times \frac{1}{3}) =$$

$$\frac{62}{3} - = 18 - \frac{4}{3} - = 3 - \frac{4}{3} - 15 - \frac{4}{3} = (3 + \frac{4}{3}) - (15 - \frac{4}{3}) =$$

$$(ج) \int_1^{-1} \frac{7 - 6s + 2s^2}{1 - s} ds = \int_1^{-1} \frac{(7 + s)(1 - s)}{1 - s} ds = \int_1^{-1} (7 + s) ds$$

$$12 - = 14 - 2 = \text{صفر} - (2 \times 7 + \frac{2(-)}{2}) = \int_1^{-1} (7 + \frac{s}{2}) ds =$$