


## إجابات تمارين ومسائل الدرس

### الاتصال عند نقطة

(١) معتمداً الشكل (١-٢٧) الذي يمثل منحنى الاقتران ق، ما قيم س التي يكون عندها ق غير متصل مع ذكر السبب؟

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



الشكل (١-٢٧)

**الحل**

الاقتران ق غير متصل عند  $s = -1, 1, 3, 5$

السبب :  $s = 4$  غير معرف

منهاجي (س) غير موجوده  
١٤٥

ق  $(-1) \neq$  منهاجي (س)  
٠ - ٤٥

منهاجي  
متعة التعليم الهادف

منهاجي  
متعة التعليم الهادف



(٢) إذا كان ق(س) = [٤س - ٤]، فابحث في اتصال الاقتران ق عند س = ٢٥، ١

الحل

$$ق(س) = [٤س - ٤]$$

$$ل = \frac{1}{٤} = ٢٥$$

$$\left. \begin{array}{l} ١ < ٢٥ > ٥ \geq ١ \\ ١ < ٢٥ > ٥ \geq ١, ٢ \end{array} \right\} = (س) هـ$$

$$١ = (١) < ٢٥ > ١$$

$$\left. \begin{array}{l} ١ = (س) هـ + ١, ٢٥٤٧ \\ ١ = (س) هـ - ١, ٢٥٤٧ \end{array} \right\} = (س) هـ$$

∴ (س) هـ غير متصل عند س = ١, ٢٥



(٣) ابحث في اتصال الاقتران ق(س) =  $\frac{١-س^٢}{١-س}$  عند س = ١

الحل

ق(١) غير معرف

ق(س) غير متصل عند س = ١



(٤) ابحث في اتصال الاقتران هـ(س) =  $\frac{٤-س^٢}{٢-س}$  عند س = ٢

الحل

$$هـ(س) = \frac{٤-س^٢}{٢-س} = ٢ \text{ عند س} = ٢$$

هـ(٢) غير معرف

هـ(س) غير متصل عند س = ٢

$$(5) \text{ إذا كان } C(s) = \left. \begin{array}{l} |ظاس| \\ س \end{array} \right\} \text{ ، } s > 0$$

$$\text{ ، } s \leq 0 \text{ ، } 1 - جتاس$$

الحل

$$(1) \text{ } s > 0 \text{ ، } \frac{ظاس}{س}$$

$$(2) \text{ } s \leq 0 \text{ ، } 1 - جتاس$$

$$(1) \text{ } s > 0 \text{ ، } 1 - جتاس = 1 - 1 = 0$$

$$(2) \text{ } s \leq 0 \text{ ، } 1 - جتاس = 1 - 1 = 0$$

$$1 - = \frac{ظاس}{س} - جتاس = \frac{ظاس - جتاس \cdot س}{س}$$

$$\Leftarrow \text{ جتاس } (ظاس) \text{ غير موجودة}$$

$$\Leftarrow \text{ جتاس } (ظاس) \text{ غير متصلة عند } s = 1$$

$$(6) \text{ إذا كان } L(s) = \left. \begin{array}{l} \sqrt{3-s} \\ |اس-2-9| \end{array} \right\} \text{ ، } s < 3$$

$$\text{ ، } s \geq 3 \text{ ، } |اس-2-9|$$

فابحث في اتصال الاقتران ل عند  $s = 3$

الحل

$$(1) \text{ ل } (3) = 0$$

$$(2) \text{ ل } (3) = \frac{ظاس}{س} = \frac{ظاس - 3}{س} = \frac{ظاس - 3}{3}$$

$$(3) \text{ ل } (3) = \frac{ظاس}{س} = \frac{ظاس - 3}{س} = \frac{ظاس - 3}{3}$$

$$\text{ ل } (3) \text{ غير متصلة عند } s = 3$$

$$(7) \left. \begin{array}{l} \text{إذا كان } q(s) = \frac{|s-2|}{s-2} \\ s \neq 2, \end{array} \right\}$$

$$s = 2, \left. \begin{array}{l} \text{فابحث في اتصال الاقتران } q \text{ عند } s = 2 \\ \text{الحل} \end{array} \right\}$$

فابحث في اتصال الاقتران  $q$  عند  $s = 2$

$$\text{استأ } \left. \begin{array}{l} s \leq 2 \\ s > 2 \end{array} \right\} = \frac{s}{s-2}$$

$$s = 2 = \text{حول } s = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{وه } (s) = \frac{s-2}{s-2} \\ s \neq 2 \end{array} \right\}$$

$$s = 2 \quad 0$$

$$(1) \text{ ن } (2) = 0$$

$$(2) \text{ ن } (2) = 1$$

$$(3) \text{ ن } (2) = 1 \text{ عند } s = 2$$

$$(8) \left. \begin{array}{l} \text{إذا كان } k(s) = \frac{s+6}{s-2} \\ s \geq 2, \end{array} \right\}$$

$$s > 2, \left. \begin{array}{l} \text{فابحث في اتصال الاقتران } k \text{ عند } s = 2 \\ \text{الحل} \end{array} \right\}$$

$$s \leq 2, \left. \begin{array}{l} \text{فابحث في اتصال الاقتران } k \text{ عند } s = 2 \\ \text{الحل} \end{array} \right\}$$

فابحث في اتصال الاقتران  $k$  عند  $s = 2$

$$(1) \text{ ل } (2) = 1 - 2 \times 2 = 3$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ن } (2) = 3 \\ \text{ن } (2) = 1 - 2 \times 2 = 3 \end{array} \right\} \text{ ن } (2) = 3$$

$$\text{ن } (2) = 3 \text{ عند } s = 2$$

$$(9) \text{ إذا كان } \varepsilon (s) = \left. \begin{array}{l} \frac{1}{s} + 2s, \quad 0 < s \leq 2 \\ 3 + [s], \quad 2 < s < 3 \\ 7, \quad s = 3 \end{array} \right\}$$

متصلاً عند  $s = 2$ ، فجد قيمة الثابت أ.

الحل

$$\begin{aligned} \text{عند } (s) \text{ متصل عند } s=2 \\ \text{فيما ع } (s) = \text{فيما ع } (s) \\ +2s \quad -2s \\ 3+2 = 2+2 \\ 0 = 2+2 \\ 3=2 \quad \leftarrow 1=2 \end{aligned}$$

$$(10) \text{ إذا كان } l(s) = \left. \begin{array}{l} \frac{s^3 + 2s^2 + 2s - 4}{1-s}, \quad s \neq 1 \\ 1-s, \quad s = 1 \end{array} \right\}$$

فابحث في اتصال الاقتران ل عند  $s = 1$

الحل

$$l(1) = 1 - 1 \times 0 = 1$$

$$c \text{ فيما ل } (s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 2s - 4}{1-s} = \frac{s^3 + 2s^2 + 2s - 4}{1-s}$$

$$= \frac{(s^3 + 2s^2 + 2s - 4)(s-1)}{(s-1)}$$

$$= 7 = 2 + 2 + 1 =$$

$$l(1) \neq c \text{ فيما ل } (s) \text{، ل } (s) \text{ غير متصل عند } s=1$$

$$(11) \left. \begin{array}{l} \text{س} > 2, \quad \text{س} + 2 \\ \text{س} = 2, \quad [4 + \text{س}] \\ \text{س} < 2, \quad \sqrt{\text{س} + 5} + \frac{6}{\text{س}} \end{array} \right\} = \text{إذا كان ق(س)}$$

فابحث في اتصال الاقتران ق عند  $\text{س} = 2$

**الحل**

$$(1) \text{ هنا } \text{ق} = [4 + 2] = 6$$

$$(2) \text{ هنا } \text{ق} = \sqrt{2 + 5} + \frac{6}{2} = 3 + 3 = 6$$

$$(3) \text{ هنا } \text{ق} = 2 + 2 = 4$$

$$(4) \text{ هنا } \text{ق} = 2 + 2 = 4$$

$$(5) \text{ هنا } \text{ق} = 2 + 2 = 4$$

∴ هو متصل عند  $\text{س} = 2$

$$(12) \left. \begin{array}{l} \text{س} \geq 0, \quad \text{س} + 2 \\ \text{س} \geq 2, \quad 5 - |\text{س}| \end{array} \right\} = \text{إذا كان ل(س)}$$

فجد قيمة الثابت ب التي تجعل الاقتران ل متصلاً عند  $\text{س} = 2$

**الحل**

$$\text{هنا ل(س)} = \text{هنا ل(س)}$$

$$2 + 2 = 5 - 2 \Leftrightarrow 4 = 3 - \text{ب}$$

$$\text{ب} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س } 3 \text{ ص} \\ \text{س } 3 + 5 \\ \text{س } 2 \text{ ص } 4 - 2 \\ \text{س } 3 \text{ ص حيث ص مجموعة الأعداد الصحيحة} \end{array} \right\} = (13) \text{ إذا كان ق (س)}$$

فابحث في اتصال الاقتران ق عند س = 3

الحل

$$14 = 5 + 3 \times 3 = (3) \text{ ص (1)}$$

$$14 = (3) \text{ ص (2)}$$

$$(3) \text{ ص} = (3) \text{ ص}$$

$$\therefore \text{ن وصل عند } 3 = 3$$