


## التأين الذاتي للماء

### Autoionization of Water

ثبت عملياً أن الماء النقي موصل ضعيف جداً للتيار الكهربائي، وهذا يدل على وجود أيونات موجبة وأخرى سالبة مسؤولة عن ذلك. إن مصدر هذه الأيونات هو التأين الذاتي للماء حيث يمكن لجزيء ماء أن يمنح بروتوناً لجزيء ماء آخر، فيسلك بذلك أحدهما سلوك الحمض والآخر سلوك القاعدة.



يعبر عن ثابت الاتزان ( $K_c$ ) للتأين الذاتي للماء كالتالي:

$$\frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2} = K_c$$

ونظراً لأن الماء يتأين بدرجة ضئيلة جداً فإن تركيزه يعد ثابتاً، وحيث أن ثابت الاتزان  $K_c$  في التفاعل يعود للماء فقط، فإنه يعبر عنه باستخدام الرمز  $K_w$ ، ويسمى ثابت تأين الماء.

$$K_w = [OH^-][H_3O^+]$$

$K_w$ : ثابت تأين الماء =  $1 \times 10^{-14}$  عند درجة 25°س.

تستخدم العلاقة السابقة لحساب تركيز أيون الهيدرونيوم أو أيون الهيدروكسيد في الماء أو أي محلول آخر.

### حساب $[H_3O^+]$ و $[OH^-]$ في الماء النقي

إن التأين الذاتي للماء يعطي تراكيز متساوية من أيونات  $H_3O^+$ ،  $OH^-$ .



عند الاتزان  
س س  
مول / لتر مول / لتر

بما أن :  $[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = K_w$

$[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$  لأن  $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_3\text{O}^+] =$

$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 =$

$\sqrt{10^{-14} \times 1} = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$= 10^{-7} \text{ مول / لتر.}$

وبالطريقة نفسها:

$\sqrt{10^{-14} \times 1} = [\text{OH}^-]$

$= 10^{-7} \text{ مول / لتر.}$

وعليه نقول:

في الماء النقي يكون  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7}$  مول/لتر.

## أثر إضافة حمض أو قاعدة للماء النقي


إضافة حمض إلى الماء يزيد من  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  ويقلل من  $[\text{OH}^-]$  مع بقاء قيمة  $K_w$  ثابتة.

$$10^{-14} \times 1 = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$$

وفي هذه الحالة يكون المحلول حمضياً لأن  $[\text{H}_3\text{O}^+] > 1 \times 10^{-7}$  مول/لتر.

وكلما زاد  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  زادت قوة المحلول الحمضي.



إضافة قاعدة إلى الماء يزيد من  $[OH^-]$  ويقلل من  $[H_3O^+]$  مع بقاء قيمة  $K_w$  ثابتة.



وفي هذه الحالة يكون المحلول قاعدياً لأن  $[OH^-] > 1 \times 10^{-7}$  مول/لتر.  
وكلما زاد  $[OH^-]$  زادت قوة المحلول القاعدي.

والآن انظر إلى الجدول التالي:

المحلول حمضي	$[OH^-]$	<	$[H_3O^+]$
المحلول متعادل	$[OH^-]$	=	$[H_3O^+]$
المحلول قاعدي	$[OH^-]$	>	$[H_3O^+]$



مثال:

احسب  $[OH^-]$  في محلول يبلغ  $[H_3O^+]$  فيه  $2 \times 10^{-3}$  مول/لتر، وبين ما إذا كان المحلول حمضياً أم قاعدياً أم متعادلاً. ( $K_w = 1 \times 10^{-14}$ )

الإجابة:

$$[\text{OH}^-] [\text{H}_3\text{O}^+] = K_w$$

$$10^{-11} \times 0,5 = \frac{10^{-14} \times 1}{10^{-2} \times 2} = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = [\text{OH}^-]$$

المحلول حمضي لأن  $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$  أو لأن  $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$  أعلى من  $1 \times 10^{-7}$  مول/لتر

**سؤال (1):**

احسب  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  في محلول يبلغ  $[\text{OH}^-]$  فيه  $5 \times 10^{-6}$  مول/لتر، ويّين ما إذا كان المحلول حمضياً أم قاعدياً أم متعادلاً. ( $K_w = 1 \times 10^{-14}$ )

**سؤال (2):**

أكمل الفراغات في الجدول التالي و صنف المحاليل إلى حمضية أو قاعدية أو متعادلة:

المحلول	$[\text{H}_3\text{O}^+]$	$[\text{OH}^-]$	طبيعة المحلول
1	$10^{-3} \times 1$		
2		$10^{-4} \times 1$	
3		$10^{-7} \times 1$	

**سؤال (3):**

باستخدام الجدول أدناه، حدد أي المحلولين أكثر حمضية في كل زوج من أزواج المحاليل التالية:

التركيز (مول/لتر)	رمز المحلول
$1 \times 10^{-4} = [\text{H}_3\text{O}^+]$	A
$5 \times 10^{-6} = [\text{H}_3\text{O}^+]$	B
$3 \times 10^{-6} = [\text{H}_3\text{O}^+]$	C
$5 \times 10^{-9} = [\text{OH}^-]$	D
$7 \times 10^{-11} = [\text{OH}^-]$	E

1. A أم B ؟

2. B أم C ؟

3. D أم E ؟

4. A أم D ؟