

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

السؤال الأول:

أقارن بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء من حيث: المكونات، والوظيفة، وطبيعة الخلايا.

نسيج الخشب	نسيج اللحاء
يتكون من الجزأين الرئيسيين الآتين: القصيبات والأوعية	يتكون اللحاء من الأجزاء الرئيسة الآتية: الأنابيب الغربالية، والصفائح الغربالية التي تنتهي بها تلك الأنابيب، والخلايا المرافقة
نقل الماء والأملاح المعدنية الذائبة فيه إلى أجزاء النبات المختلفة	نقل عصارة اللحاء التي تحوي السكر (السكروز غالباً)، والحموض الأمينية، والهرمونات، من أماكن تصنيعها أو وجودها إلى جميع أجزاء النبات
خلايا ميتة	خلايا حية ينقصها العديد من مكونات الخلايا الحية، مثل: الأنوية، والرايبوسومات
المكونات	الوظيفة
طبيعة الخلايا	

السؤال الثاني:

أوضح آلية نقل السكر من خلية ورقة إلى خلية جذر وفق نظرية التدفق الضاغط.

- تحميل السكر من خلايا الورقة (المصدر) إلى الخلايا المرافقة بالنقل النشط، ومنها إلى الأنابيب الغربالية.
- تركيز السكر المرتفع في الأنابيب الغربالية يؤدي إلى دخول الماء من خلايا خشب مجاورة، مولداً ضغطاً مرتفعاً في الأنابيب الغربالية، فتندفع عصارة اللحاء من أنبوب غربالي إلى آخر.
- تفريغ السكر في خلايا الجذر (مكان الاستهلاك أو التخزين) بالنقل النشط.
- خروج السكر من الأنابيب الغربالية يؤدي إلى خروج الماء في اتجاه خلايا الخشب

المجاورة.

السؤال الثالث:

أصف توزيع نسيج الخشب واللحاء في كل من: الجذر، والساق، والأوراق.

الجذر: توجد أنسجة النقل في الجذور على شكل أسطوانة وعائية.


الساق: توجد أنسجة النقل في الساق على شكل حزم وعائية.

الأوراق: توجد أنسجة النقل في الأوراق على شكل حزم وعائية.

السؤال الرابع:

نظراً إلى صعوبة قياس معدل النتج مباشرة؛ فإنه يقاس بطرائق غير مباشرة، مثل: قياس مقدار النقص في كتلة النبات الحية، وقياس كمية الماء التي امتصها النبات.


يبين الشكل الآتي أربع أوراق من نبات، لها الحجم نفسه تقريباً، وقد ثبتت على حامل، ودهن بعض أوجهها بالجليسرول:



h إذا كان مقدار النقص في الكتلة الحيوية لهذه الأوراق بعد 24 كما في الجدول الآتي، فأجب عما يلي:

رقم الورقة				
4	3	2	1	
عدم دهن الوجه العلوي، والوجه السفلي.	الوجه العلوي.	الوجه السفلي.	الوجه العلوي، والوجه السفلي.	وجه الورقة المدهون بالجليسرول
40%	36%	4%	2%	نسبة النقص في الكتلة الحيوية للورقة

أمثل بيانياً العلاقة بين دهن أوجه أوراق النبات بالجليسرول ومقدار النقص في الكتلة الحيوية لكل منها.



أستنتج: ما الذي يمكن استخلاصه من تلك النتائج؟ أذكر دليلين لدعم استنتاجي.

أستنتج أن النبات يخسر الماء على شكل بخار من خلال الأوراق بعملية النتح.

الدليل الأول: عندما دهن وجهي الورقة بالشحم النفطي خسرت هذه الورقة جزء بسيط من كتلتها الحيوية.

الدليل الثاني: عندما لم يدهن وجهي الورقة بالشحم النفطي خسرت هذه الورقة جزء كبيراً من كتلتها الحيوية.