


مهارات التفكير العليا

تكامل اقترانات خاصة


تبرير: أجد مساحة المنطقة المظلمة في كل من التمثيلين البيانيين الآتين، مبرراً إجابتي;



$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = (-\cos x) \Big|_0^{2\pi} = (-\cos 2\pi) - (-\cos 0) = -1 - (-1) = 0$$

ملحوظة: يمكن الاستفادة من التماثل وإيجاد المساحة المطلوبة كما يأتي:

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2(-\cos x) \Big|_0^{\pi} = 2(-\cos \pi + \cos 0) = 2(1 + 1) = 4$$



$$\int_0^{2\pi} \sin 2x \, dx = \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right) \Big|_0^{2\pi} = \left(-\frac{1}{2} \cos 4\pi\right) - \left(-\frac{1}{2} \cos 0\right) = -\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

والأسهل هو الاستفادة من التماثل وإيجاد المساحة المطلوبة كما يأتي:

$$\int_0^{2\pi} \sin 2x \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin 2x \, dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right) \Big|_0^{\pi} = -2(\cos 2\pi - \cos 0) = -2(1 - 1) = 0$$

تحد: أجد كلاً من التكاملات الآتية:

$$\int_0^{\pi} (\sec x - \cos x) \, dx$$

$$\int \frac{1}{x-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+5} dx = \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

(57) تبرير: إذا كان: $\int_1^a (1-2x+3x^2) dx = 0.5 \ln a$, فأجد قيمة الثابت a , حيث: $a > 0$.

$$\int_1^a (1-2x+3x^2) dx = \left[x - x^2 + x^3 \right]_1^a = (a - a^2 + a^3) - (1 - 1 + 1) = a^3 - a^2 + a - 1$$

$$0.5 \ln a = a^3 - a^2 + a - 1$$

$$2 \ln a = 2a^3 - 2a^2 + 2a - 2$$

$$\ln a^2 = \ln(2a^3 - 2a^2 + 2a - 2)$$

$$a^2 = 2a^3 - 2a^2 + 2a - 2$$

$$0 = 2a^3 - 4a^2 + 2a - 2$$

$$0 = a^3 - 2a^2 + a - 1$$

$$(a-1)(a^2 - a + 1) = 0$$

$$a = 1$$

(58) تبرير: أثبت بطريقتين مختلفتين أن: $\int_0^{\pi/4} \sin 3x \cos x dx = \int_0^{\pi/4} \sin x \cos 3x dx$.

طريقة أولى:

$$\int_0^{\pi/4} \sin 3x \cos x dx = \int_0^{\pi/4} (18 \sin^4 x + \cos 3x) dx = 12 \int_0^{\pi/4} (\cos x \cos 0 \pi/4 \cos^3 x) dx$$

$$= 12 \int_0^{\pi/4} (\cos x \sin \pi/2) dx = (18 \sin \pi) - (0 - 0) \pi/2 - 18 \sin 4x \Big|_0^{\pi/4} = (14 \sin 2x - \cos 3x) dx = (14 \sin 2x - \cos 3x) dx = 14 - 14 = 0$$

طريقة ثانية:

$$\int_0^{\pi/4} \sin x \cos 3x dx = \int_0^{\pi/4} (\cos x \sin 3x) dx = \int_0^{\pi/4} \sin(x+3x) dx = \int_0^{\pi/4} \sin 4x dx = 14 \sin(x+3x) dx = \int_0^{\pi/4} \cos x dx = \int_0^{\pi/4} \cos x dx$$

(59) تبرير: إذا كان: $\int_0^{\pi/4} (kx) dx = \pi(7 - 62\pi/4k\pi/3k(1 - \pi \sin))$, فأجد قيمة الثابت k , مبرراً إجابتي.

$$\int_0^{\pi/4} (3 - 4k - \pi k \cos kx) dx = \pi^3 k + \pi k \cos kx \Big|_0^{\pi/4} = \pi^3 k + \pi k \cos \frac{\pi^4 k}{4} - \pi^3 k = \pi^3 k (1 - \pi \sin \frac{\pi^4 k}{4})$$

$$\pi^4 = \pi k (13 + 12 - 14 - 22) = \pi 12k (7 - 62) \Rightarrow \pi 12k (7 - 62) = \pi (7 - 62) \Rightarrow k = \cos 112$$

تحد: يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران:

$$v(t) = \begin{cases} 2t+4, & 0 \leq t \leq 6 \\ 20 - (t-8)^2, & 6 < t \leq 10 \end{cases}$$

حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا بدأ الجسيم حركته من نقطة الأصل، فأجد كلاً مما يأتي:

(60) موقع الجسيم بعد 5 ثوان من بدء الحركة.

$$v(t) = \begin{cases} 2t+4, & 0 \leq t \leq 6 \\ 16t - t^2 - 44, & 6 < t \leq 10 \end{cases} \quad s(t) = \int v(t) dt = \int (2t+4) dt = t^2 + 4t + C_1$$

$$s(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow s(t) = t^2 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 6$$

$$s(5) = 25 + 20 = 45 \text{ m}$$

(61) موقع الجسيم بعد 9 ثوان من بدء الحركة.

$$s(t) = \int (16t - t^2 - 44) dt = 8t^2 - \frac{1}{3}t^3 - 44t + C_2, \quad 6 < t \leq 10$$

لإيجاد قيمة C_2 نستعمل موقع الجسم عند $t=6$ موقعاً ابتدائياً بالنسبة للفترة $6, 10$:

$$s(6) = 8(6)^2 - \frac{1}{3}(6)^3 - 44(6) + C_2$$


ونحسب $s(6)$ من اقتران الموقع الذي وجدناه في السؤال السابق بالنسبة للفترة $[0, 6]$:

$$s(t) = t^2 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 6 \quad s(6) = 6^2 + 4(6) = 60$$

$$60 = 8(6)^2 - \frac{1}{3}(6)^3 - 44(6) + C_2$$

$$60 = -48 + C_2 \Rightarrow C_2 = 108 \Rightarrow s(t) = 8t^2 - \frac{1}{3}t^3 - 44t + 108, \quad 6 < t \leq 10$$

$$s(9) = 117 \text{ m}$$



(62) تحد: يبين الشكل المجاور المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $y=1x+3$ والمحاور x ، والمسـتـقيم: $x=0$ ، $x=45$ أجد قيمة k التي تقسم المنطقة المطلقة إلى منطقتين متساويتين في الساحة.

$$1612A = \int_0^k \frac{1}{x+3} dx = \ln|x+3| \Big|_0^k = \ln(k+3) - \ln 3$$

$$1612A = \int_0^{45} \frac{1}{x+3} dx = \ln|x+3| \Big|_0^{45} = \ln 48 - \ln 3$$

$$k+3 \Rightarrow 4 = 161/2 = \ln k+3 - \ln 3 \Rightarrow \ln k+3 = 161/2 + \ln 3 = 12 \ln 3 = \ln(k+3) - \ln 3 \Big|_0^k = \ln k+3 \Rightarrow k=9$$