

إجابات مراجعة الدرس الثاني

المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربائي

السؤال الأول:

الفكرة الرئيسية: أذكر العوامل التي يعتمد عليها مقدار المجال المغناطيسي الناتج عن مقطع صغير من موصل يحمل تياراً كهربائياً، عند نقطة بالقرب من هذا الموصل.

$$B = \frac{\mu_0 I d L \sin \theta}{2r^2}$$

يعتمد مقدار المجال المغناطيسي عند نقطة بالقرب من موصل يحمل تياراً كهربائياً على: النفاذية المغناطيسية للوسط، مقدار التيار، طول المقطع المؤثر من الموصل، جيب الزاوية بين متجه طول المقطع ومتجه بعد النقطة، مربع المسافة بين النقطة والمقطع.

السؤال الثاني:

أستنتج: يتحرك إلكترون في الفضاء في خط مستقيم؛ ما المجالات الناشئة عنه؟
ينشأ في الحيز المحيط بالإلكترون متحرك مجالان كهربائي ومغناطيسي.

السؤال الثالث:

موصلان مستقيمان متوازيان لانهائياً الطول؛ المسافة بينهما (30 cm)، يحمل أحدهما تياراً كهربائياً يساوي ثلاثة أمثال التيار الذي يحمله الموصل الثاني. أحدد نقطة على الخط العمودي الواصل بينهما؛ ينعقد عندها المجال المغناطيسي عندما يكون التياران بالاتجاه نفسه.

عندما ينعقد المجال المحصل بين السلكين يكون المجالان متساويان مقداراً ومتعاكسان اتجاهًا.

$$B_1 = B_2 \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} \rightarrow \mu_0 I_1 / 2\pi r_1 = 3\mu_0 I_1 / 2\pi r_2 \rightarrow 1/r_1 = 3/r_2 \rightarrow r_2 = 3r_1$$

$$r_1 = 30 \text{ cm}, r_2 = 7.5 \text{ cm}, r_2 = 22.5 \text{ cm}$$

السؤال الرابع:

أقارن: أبين العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي في مركز ملف دائري والعوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي داخل ملف لولبي.

$$B = \mu_0 I N^2 R, B = \mu_0 I N$$

اعتماداً على العلاقتين الخاصتين بالملف الدائري والملف اللولبي فإن العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري هي: النفاذية المغناطيسية للوسط، التيار، عدد اللفات، نصف قطر الملف.

والعوامل في الملف اللولبي هي: النفاذية المغناطيسية للوسط، التيار، عدد اللفات، طول الملف.

السؤال الخامس:

أحسب: ملف دائري من سلك نحاسي عدد لفاته (100)، نصف قطر كل منها (8.0 cm)، ويحمل تياراً كهربائياً (0.4 A). أحسب مقدار المجال المغناطيسي في مركز الملف.

$$B = \mu_0 I N^2 R = 4\pi \times 10^{-7} \times 0.4 \times 100^2 \times 0.08 = 3.14 \times 10^{-4} T$$

السؤال السادس:

أحسب: موصل مستقيم لا نهائي الطول موضوع على سطح أفقي يحمل تياراً كهربائياً (50 A) يتجه من الشمال إلى الجنوب؛ أحسب مقدار المجال المغناطيسي عند نقطة على السطح تبعد (2.5 m) إلى الشرق من السلك، وأحدد اتجاهه.

$$B = \mu_0 I 2\pi r = 4\pi \times 10^{-7} \times 50 \times 2\pi \times 2.5 = 4 \times 10^{-6} T$$