

## مفهوم التأكسد والاختزال

### Oxidation Reduction Concept

تُعد تفاعلات التأكسد والاختزال من التفاعلات المهمة في حياتنا، ومن الأمثلة عليها:

- صدأ الحديد.
- احتراق الفحم.
- تحوّل لون قطعة تفاح إلى اللون البني.

فما المقصود بكلّ من التأكسد والاختزال؟

### المفهوم القديم للتأكسد

أطلق قديماً مفهوم التأكسد على تفاعل العنصر مع الأكسجين لتكوين أكسيد العنصر.

مثال:

Cu تفاعل فلز النحاس مع غاز الأكسجين  $O_2$  لإنتاج أكسيد النحاس.



ألاحظ من خلال التفاعل أن النحاس قد اتحد مع الأكسجين، لذا أقول أن النحاس قد تأكسد.


### مفهوم التأكسد والاختزال بالاعتماد على الأكسجين

**التأكسد:** إضافة الأكسجين إلى العنصر (أو المركب).

**الاختزال:** نزع الأكسجين من المركب.

مثال (1):

تعد تفاعلات التنافس من تفاعلات التأكسد والاختزال، كتفاعل أكسيد النحاس مع فلز الخارصين:



ألاحظ من التفاعل أن الخارصين تفاعل مع الأكسجين، لذا أقول أن الخارصين قد تأكسد، والنحاس قد نُزع منه الأكسجين، لذا نقول أنه اختزل.

ويسمى التفاعل الذي يتضمن عمليتي التأكسد والاختزال بتفاعل التأكسد والاختزال.

عمليتا التأكسد والاختزال عمليتان متلازمتان؛ فلا يحدث التأكسد بمعزل عن الاختزال.

مثال (2):

يعد تفاعل التيرمايت والذي يستخدم في لحام سلك الحديد من تفاعلات التنافس، وهو أيضاً تفاعل تأكسد واختزال ويتم وفق المعادلة:




ألاحظ من خلال التفاعل أن الألمنيوم قد اتحد مع الأكسجين، لذا أقول أن الألمنيوم قد تأكسد، والحديد قد نُزع منه الأكسجين، لذا نقول أنه اختزل.

إلا أن هذا التعريف لا ينطبق على الكثير من التفاعلات، لأن كثيراً منها لا يتضمن تفاعل العنصر مع الأكسجين، لذا تمّ اقتراح تعريف جديد للتأكسد والاختزال.

## مفهوم التأكسد والاختزال بالاعتماد على انتقال الإلكترونات

**التأكسد:** عملية فقد المادة للإلكترونات في أثناء التفاعل.

**الاختزال:** عملية كسب المادة للإلكترونات في أثناء التفاعل.




يتضمن تفاعل التأكسد والاختزال جزأين، هما:



• شحنة عناصر المجموعة السابعة = 1-

مثال:

لاحظ كيف نحدد عمليتي التأكسد والاختزال في التفاعل التالي:




الكالسيوم الموجود في المتفاعلات شحنته (صفر) لأنه لم يتفاعل بعد.


الأكسجين الموجود في المتفاعلات شحنته (صفر) لأنه لم يتفاعل بعد.

بما أن الكالسيوم من المجموعة الثانية، لذا فإن شحنته تصبح عندما يتفاعل مع الأكسجين (+2)، أي أنه يميل لفقد إلكترونين.

بما أن الأكسجين من المجموعة السادسة، لذا فإن شحنته تصبح عندما يتفاعل مع الكالسيوم (-2)، أي أنه يميل لكسب إلكترونين من الكالسيوم.





وعليه نقول أن الكالسيوم قد تأكسد (فقد إلكترونات)، والأكسجين قد اختزل (اكتسب إلكترونات).



سؤال:

تأمل المعادلتين الآتيتين، ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما:





1. عين الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت في كل من المعادلتين.
2. ما عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة في عمليتي التأكسد والاختزال في كلٍّ من المعادلتين؟

**الحل:**

1. الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت في المعادلتين:

في المعادلة الأولى:

Ca الذرة التي تأكسدت هي (،) واختزلت أيونات  $(\text{Ni}^{2+})$ .

في المعادلة الثانية:

Al الذرة التي تأكسدت هي (،) واختزلت أيونات  $(\text{Fe}^{3+})$ .

2. عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة في المعادلة الأولى = 2 ، وفي المعادلة الثانية = 3