

إجابات أسئلة الدرس

التكامل غير المحدود - دليل المعلم

(١) جد كلاً مما يأتي:

(ب) $\int \frac{كس}{س} ، س \neq ٠$

(أ) $\int \frac{١}{٢س}$

(د) $\int ٣س^٢ كس$

(ج) $\int (٢س - ٢) كس$



(هـ) $\int \frac{٢-}{س-٥} كس$

الحل

(ب) $\frac{١-}{٤س} + ج$

(١) (أ) $\frac{١}{٢س} + ج$

(د) $س^٣ + ج$

(ج) $٢س - \frac{١}{٣س} + ج$

(هـ) $\frac{١-}{٣س} + ج$

(٢) جد كلاً مما يأتي:

(ب) $\int (٢س - ٢) (١ + ٤س) كس$

(أ) $\int (١٠س - ٢س + ٣س) كس$

(د) $\int \frac{٨ + ٦س + ٢س}{٢ + س} كس ، س \neq ٢$

(ج) $\int ٣ظاس جتاس كس$



الحل

(ب) $\frac{٧}{٢س} + ٢س - \frac{٤}{٣س} + ج$

(١) (أ) $\frac{٦}{٧} - ٣س - \frac{١}{٣س} + ج$

(د) $\frac{١}{٢س} + ٢س + ٤س + ج$

(ج) $٣- جتاس + ج$

$$(3) \text{ جد } \frac{ص}{س} \text{ عندما } س = 5, \text{ حيث } ص = \frac{1+س^4}{س}, س \neq 0$$



الحل

$$\frac{ص}{س} = \frac{1+س^4}{س}, \text{ ومنه: عندما } س = 5, \text{ فإن } \frac{ص}{س} = \frac{21}{5}$$

(4) إذا كان ق اقتراناً قابلاً للاشتقاق، وكان ق(س) = $س^6 - 8س^2 + 5$ ، وكان ق(1) = 2، فجد قاعدة الاقتران ق.



الحل

$$\text{ق(س)} = 3س^2 - 2س^4 + 5س + 6$$

(5) إذا كان $\text{ع(س)} = 3س^2 - 6س + 5$ ، فجد ع(1) .



الحل

$$\text{ع(س)} = 18 = 3س^2 - 6س + 5, \text{ ومنه: } \text{ع(1)} = 18$$

(6) إذا كان ق اقتراناً قابلاً للاشتقاق، وكان ق(س) = $س^2 - 5$ ، وكان ق(2) = 4، فجد قيمة



ق(1).

الحل

$$\text{ق(س)} = 3س^2 - 5س + 10, \text{ ومنه: ق(1)} = 6$$

٧) إذا كان ق اقتراناً قابلاً للاشتقاق، وكان ق(س) = ٣س(٦ - ٥س) + ٤س^٣، وكان

ق(٢) = ١ - ، فجد قيمة ق(١).
منهاجي

الحل

$$\text{ق(س)} = ٣س^٢ - ١٥س + ٤س^٣، \text{ ومنه: ق(١)} = ٨ -$$

٨) إذا كان ق اقتراناً قابلاً للاشتقاق، وكان ق(س) = $\frac{٢س^٢ + ٦س + ٨س^٣}{س}$ ، س ≠ صفراً، وكان ق(١) = ١٢، فجد قاعدة الاقتران ق.

منهاجي

الحل

$$\text{ق(س)} = \frac{١}{٢}س^٢ + ٦س + \frac{٨}{٣}س^٣ + \frac{١٧}{٦}$$

٩) إذا كان ل اقتراناً قابلاً للاشتقاق، وكان ل(س) = ٢س^٢ - ٦س^٣ - ٢س، فجد قيمة ل(٣) - ل(١).

منهاجي

الحل

$$\text{ل(س)} = ٢س^٢ - \frac{٣}{٢}س^٤ + ج$$

$$\text{ل(٣)} - \text{ل(١)} = (١٢ - \frac{٢٤٣}{٢} - ٥٤) - (٢ - \frac{٣}{٢} - ١ + ج) =$$

$$= ٧٦ - ٤٤ = \frac{٢٤٠}{٢} - ٤٤ = ١٢ - ٤٤ = ٧٦ -$$