

أدرب وأحل المسائل

التكامل بالأجزاء

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

$$\int (x \cos(x+1)) dx$$

$$u = x+1 \quad du = dx \quad v = \sin u = \sin(x+1) \quad dv = \cos(x+1) dx$$

$$\int (x+1) \cos(x+1) dx = \int (u) \cos u du = u \sin u - \int \sin u du = (x+1) \sin(x+1) + \cos(x+1) + C$$

$$\int x e^{x/2} dx$$

$$u = x \quad du = dx \quad v = 2e^{x/2} \quad dv = e^{x/2} dx$$

$$\int x e^{x/2} dx = 2x e^{x/2} - \int 2e^{x/2} dx = 2x e^{x/2} - 4e^{x/2} + C$$

$$\int (2x^2 - 1) e^{-x} dx$$

$$u = 2x^2 - 1 \quad du = 4x dx \quad v = -e^{-x} \quad dv = e^{-x} dx$$

$$\int (2x^2 - 1) e^{-x} dx = -\frac{1}{4} \int (2x^2 - 1) du = -\frac{1}{4} (2x^2 - 1) e^{-x} + \int 4x e^{-x} dx$$

$$= -\frac{1}{4} (2x^2 - 1) e^{-x} - \int 4e^{-x} dx = -\frac{1}{4} (2x^2 - 1) e^{-x} - 4e^{-x} + C = -\frac{1}{4} (2x^2 + 4x + 3) e^{-x} + C$$

$$\int x \ln x dx$$

$$u = \ln x \quad du = \frac{1}{x} dx \quad v = x \quad dv = dx$$

$$\int x \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

$$\int 5x \cos x \sin x dx$$

$$u = \sin^2 x \quad du = 2 \sin x \cos x dx \quad v = \frac{1}{2} \sin^2 x \quad dv = \sin x \cos x dx$$

$$\int 5x \cos x \sin x dx = \frac{5}{2} \int x du = \frac{5}{2} (x u - \int u dx) = \frac{5}{2} (x \sin^2 x - \int \sin^2 x dx)$$

$$= \frac{5}{2} x \sin^2 x - \frac{5}{4} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{5}{2} x \sin^2 x - \frac{5}{4} (x - \frac{1}{2} \sin 2x) + C = \frac{5}{2} x \sin^2 x - \frac{5}{4} x + \frac{5}{8} \sin 2x + C$$

$$\int 6x \tan x \sec x dx$$

$$u = \sec x \quad du = \sec x \tan x dx \quad v = \sec x \quad dv = \sec x \tan x dx$$

$$\int 6x \tan x \sec x dx = 6 \int x du = 6 (x u - \int u dx) = 6 (x \sec x - \int \sec x dx)$$

$$= 6x \sec x - 6 \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int (x \sin^2 x) dx$$

$$x \sin^2 x = -x \int x \csc^2 x dx \quad u = dx \quad v = -\cot x \quad du = dx \quad dv = \csc^2 x dx = \int x \csc^2 x \sin^2 x | + C | \sin x + \ln x dx = -x \cot x \sin x + \int \cos x dx = -x \cot x + \int \cot x \cot$$

$$\int (x^3 \ln x) dx$$

$$x - \int -12x dx = -12x - 2 \ln x \quad dv = x - 3 \quad du = 1 \quad dx \quad v = -12x - 2 \int x - 3 \ln u = \ln x^2 x^2 - 14x - 2 + C = -\ln x + \int 12x - 3 dx = -12x - 2 \ln x - 21x dx = -12x - 2 \ln -14x^2 + C$$

$$\int (x^2 \tan^2 x \sec^2 x) dx$$

$$x^2 dx du = 4x dx v = 12 \tan^2 x \tan u = 2x^2 dv = \sec^2$$

ملاحظة: لإيجاد v استخدمنا طريقة التعويض، حيث: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ، ومنه: $dx = dy \sec^2 y = \tan$

$$x^2 \int 2x^2 \sec^2 x = \int y dy = 12y^2 = 12 \tan^2 x y dy \sec^2 x dx = \int \sec^2 x \tan^2 x = \int \sec^2 x (\sec^2 x - 1) dx = \int \sec^4 x dx - \int \sec^2 x dx = \int 2x^2 \tan^2 x dx = 2x^2 (12 \tan^2 x \tan x - x) - \int 2(\tan x - (2x(\tan x dx = x^2 \tan^2 x \tan x - x \int 2x^2 \sec^2 du = 2 dx v = \tan x x - 2x \tan x - x) dx = x^2 \tan^2 x \cos x + 2x^2 + 2 \int (\sin x - 2x \tan - x) dx = x^2 \tan^2 x | + C | \cos x + x^2 - 2 \ln x - 2x \tan x | - x^2 + C = x^2 \tan^2 | \cos + 2x^2 - 2 \ln$$

$$\int (x-2)^8 dx$$

هذه المسألة يمكن حلها بالتعويض، حيث: $u = 8 - x$ أو $u = x - 8$

وحلها بالأجزاء كالآتي:

$$u = x - 2 \quad dv = (8 - x)^{12} \quad dx \quad du = dx \quad v = -\frac{1}{23} (8 - x)^{13} \quad \int (x - 2)^8 dx = (x - 2)^9 \times -\frac{1}{23} (8 - x)^{13} - \int -\frac{1}{23} (8 - x)^{13} dx = -\frac{1}{23} (x - 2)^9 (8 - x)^{13} - \frac{1}{23} (8 - x)^{14} + C$$

$$\int (2x^3 \cos x) dx$$

بالأجزاء 3 مرات، لنستخدم طريقة الجدول:

$f(x)$ ومشتقاته المتكررة

$g(x)$ وتكاملاته المتكررة

x^3	+	$\cos 2x$
$3x^2$	-	$\frac{1}{2} \sin 2x$
$6x$	+	$-\frac{1}{4} \cos 2x$
6	-	$-\frac{1}{8} \sin 2x$
0		$\frac{1}{16} \cos 2x$

$$2x + C \int 2x - 38 \cos 2x - 34x \sin 2x + 34x^2 \cos 2x dx = 12x^3 \sin x - 3 \cos f$$

$$\int (x^6 dx) (12f)$$

$$\int x^6 - x dx = -x^6 - \int x^6 dx = \int x^6 - x dx u = x dv = 6 - x dx du = dx v = -6 - x \ln \int$$

$$6) 2 + C 6 - 6 - x (\ln 6 dx = -x^6 - x \ln 6 + \int 6 - x \ln \ln$$

$$\int (2x dx) (13e^{-x} \sin f)$$

$$\int 2x dx = -12e^{-x} - \int 2x f e^{-x} \sin 2x dx du = -e^{-x} dx v = -12 \cos u = e^{-x} dv = \sin$$

$$2x dx du = -12e^{-x} dx v = 12 \sin 2x dx u = 12e^{-x} dv = \cos 2x - \int 12e^{-x} \cos$$

$$2x dx f e^{-x} \sin 2x - 14 \int e^{-x} \sin 2x - 14e^{-x} \sin 2x dx = -12e^{-x} \cos 2x f e^{-x} \sin$$

$$2x dx 2x) + C 54 \int e^{-x} \sin 2x + 2 \cos 2x dx = -14e^{-x} (\sin 2x dx + 14 \int e^{-x} \sin$$

$$2x) 2x + 2 \cos 2x dx = -15e^{-x} (\sin 2x) + C f e^{-x} \sin 2x + 2 \cos = -14e^{-x} (\sin$$

$$+ C$$

$$\int (x dx) (14 \sin x \ln \cos f)$$

$$x \sin x \ln x dx = \sin x \ln x \int \cos x dx v = \sin x \sin x dx du = \cos x dv = \cos \sin u = \ln$$

$$x + C x - \sin x \ln x dx = \sin - \int \cos$$

$$\int ((1+e^x) dx) (15e^x \ln f)$$

$$(1+e^x)(1+e^x) dx = e^x \ln(1+e^x) dv = e^x dx du = e^x 1+e^x dx v = e^x \int e^x \ln u = \ln$$

$$(1+e^x) - \int (e^x + -(1+e^x)) - \int (e^x + -11+e^x) dx = e^x \ln - \int e^{2x} 1+e^x dx = e^x \ln$$

$$(1+e^{-x})+C(1+e^x)-e^x-\ln e^{-x}e^{-x+1}dx=e^x \ln$$

أجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

$$\int_0^{\pi/2} x dx (160\pi/2e^x \cos x)$$

$$\int_0^{\pi/2} x dx + \cos x dx = 12e^x (\sin x) + C \Rightarrow \int_0^{\pi/2} 2e^x \cos x + \cos x dx = 12e^x (\sin x \cos x) \int_0^{\pi/2} 2e^x \cos x + \cos x dx = 12e^{\pi/2} - 12e^0 = 12e^{\pi/2} - 12$$

$$\int_1^2 x dx (171e \ln x)$$

$$\int_1^2 x dx = 2x \ln x dv = dx du = 2x dx v = x \int_1^2 1e^2 \ln x dx u = 2 \ln x^2 dx = \int_1^2 1e^2 \ln 1e \ln x dx = 2e - 0 - 2e + 2 = 2e - 2 \ln x |_{1e}^{-2x} |_{1e} = 2e \ln e - \int_1^2 1e^2 dx = 2x \ln$$

$$\int_1^2 (x e^x) dx (1812 \ln x)$$

$$\int_1^2 x dx + \int_1^2 x dx x + x dx = \int_1^2 12 \ln x dx = \int_1^2 (\ln x + \ln(x e^x)) dx = \int_1^2 (\ln 12 \ln x)$$

نجد بطريقة $\int_1^2 x dx 12 \ln x$ الأجزاء:

$$\int_1^2 x |12 - x|^{12} dx = x |12 - x|^{12} - \int_1^2 12 dx = x \ln x dx = x \ln x dv = dx du = 1x dx v = x \int_1^2 12 \ln u = \ln(x e^x) dx 2 - 1 \int_1^2 x dx = 12x^2 |_{12} = 42 - 12 = 32 \Rightarrow \int_1^2 12 \ln 1 - 2 + 1 = 2 \ln 2 - \ln 2 \ln 2 + 12^2 - 1 + 32 = 2 \ln = 2 \ln$$

$$\int_0^{\pi/3} 3x dx (19\pi/12\pi/9x \sec^2 x)$$

$$\int_0^{\pi/3} 3x dx = 13x \tan 3x \int_{\pi/12}^{\pi/9} 12\pi 9x \sec^2 3x dx du = dx v = 13 \tan u = x dv = \sec^2 3x dx = 3x \cos 3x |_{\pi/12}^{\pi/9} - \int_{\pi/12}^{\pi/9} 12\pi 9 13 \sin 3x dx = 13x \tan^2 \pi/9 - \int_{\pi/12}^{\pi/9} 12\pi 9 13 \tan \pi \cos \pi/4 + 19 \ln \pi^3 - \pi^3 6 \tan 3x |_{\pi/12}^{\pi/9} = \pi^2 7 \tan \cos 3x |_{\pi/12}^{\pi/9} + 19 \ln 13x \tan 12/12 - 19 \ln \pi^4 = \pi^3 27 - \pi^3 6 + 19 \ln \cos 3 - 19 \ln$$

$$\int_1^2 x dx (201e x^4 \ln x)$$


$$\int_1^2 x |1e - \int_1^2 1e 15x^4 dx x dx = 15x^5 \ln x dv = x^4 dx du = dx x v = 15x^5 \int_1^2 1e x^4 \ln u = \ln x |_{1e}^{-125x^5} |_{1e} = 15e^5 - 0 - 125e^5 + 125 = 4e^5 + 125 = 15x^5 \ln$$

$$\int_0^{\pi/2} x dx (210\pi/2x^2 \sin x)$$

نجد $\int_0^{\pi/2} x dx x^2 \sin x$ باستخدام طريقة الجدول:

$f(x)$ ومشتقاته المتكررة

$g(x)$ وتكاملاته المتكررة



$$\int_0^{\pi/2} (x^2 + 2x + 2) \sin x \, dx = -x^2 \cos x - 2x \sin x + 2 \cos x \Big|_0^{\pi/2} = \pi - 2x + 2 \cos x \sin$$

$$\int_0^1 x(e^{-2x} + e^{-x}) \, dx \quad (22)$$

$$u = x \, dv = (e^{-2x} + e^{-x}) \, dx \quad du = dx \quad v = -\frac{1}{2}e^{-2x} - e^{-x} \\ \int_0^1 x(e^{-2x} + e^{-x}) \, dx = -\frac{1}{2}xe^{-2x} - xe^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 (-\frac{1}{2}e^{-2x} - e^{-x}) \, dx = -\frac{1}{2}e^{-2} - e^{-1} + \frac{1}{4}e^{-2} + e^{-1} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}e^{-2} - \frac{1}{4}e^{-1} + \frac{5}{4}$$

$$\int_0^1 x e^x (1+x)^2 \, dx \quad (23)$$

$$u = x e^x \, dv = (1+x)^2 \, dx \quad du = (x e^x + e^x) \, dx = e^x (x+1) \, dx \quad v = -\frac{1}{3}(1+x)^{-3} \\ \int_0^1 x e^x (1+x)^2 \, dx = -\frac{1}{3} x e^x (1+x)^{-3} - \int_0^1 e^x (x+1) (1+x)^{-3} \, dx = -\frac{1}{3} x e^x (1+x)^{-3} - \int_0^1 e^x (1+x)^{-2} \, dx \\ = -\frac{1}{3} e^2 + \frac{1}{3} e^{-1} = \frac{1}{3} (e^{-1} - e^2)$$

$$\int_0^1 x^3 \ln x \, dx \quad (24)$$

$$3 \, dx = x^3 \ln 3 \quad \int_0^1 3x^2 \ln 3 \, dx = x^3 \ln 3 \Big|_0^1 = 3 \ln 3 \\ \int_0^1 x^3 \ln x \, dx = x^3 \ln x - \int_0^1 3x^2 \, dx = x^3 \ln x - x^3 \Big|_0^1 = 3 \ln 3 - 3$$

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

$$\int x^3 e^{x^2} \, dx \quad (25)$$

$$y = x^2 \Rightarrow dx = \frac{dy}{2x} \quad \int x^3 e^{x^2} \, dx = \int x^2 e^y \frac{dy}{2x} = \frac{1}{2} \int x e^y \, dy = \frac{1}{2} \int y e^y \, dy \\ \int y e^y \, dy = y e^y - \int e^y \, dy = y e^y - e^y + C \\ \int x^3 e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} (x^2 e^{x^2} - e^{x^2}) + C$$

(26) $\int \frac{dx}{x \cos x}$

$$y = \ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow dx = x dy, x = e^y \int \frac{dx}{x \cos x} = \int \frac{e^y dy}{e^y \cos y} = \int \frac{dy}{\cos y} = \ln |\sec y + \tan y| + C = \ln |\sec(\ln x) + \tan(\ln x)| + C$$

(27) $\int \frac{x^2 dx}{x^3 \sin x}$

$$y = x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{dy}{2x}, x = \sqrt{y} \int \frac{x^2 dx}{x^3 \sin x} = \int \frac{\sqrt{y} dy}{y^3 \sin \sqrt{y}} = \int \frac{dy}{y^{5/2} \sin \sqrt{y}}$$

(28) $\int \frac{2x dx}{x \sin x \cos x}$


$$x = y \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 1 \Rightarrow dx = dy, x = y \int \frac{2x dx}{x \sin x \cos x} = \int \frac{2 dy}{\sin y \cos y} = \int \frac{2 dy}{\sin 2y} = -\ln |\csc 2y + \cot 2y| + C = -\ln |\csc 2x + \cot 2x| + C$$

(29) $\int \frac{x dx}{x^2 \sin x}$

$$x = y \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 1 \Rightarrow dx = dy, x = y \int \frac{x dx}{x^2 \sin x} = \int \frac{dy}{y \sin y} = \int \frac{dy}{y \sin y}$$

(30) $\int \frac{x^3 e^{x^2} (x^2 + 1)^2 dx}{x^2}$

$$y = x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{dy}{2x}, x = \sqrt{y} \int \frac{x^3 e^{x^2} (x^2 + 1)^2 dx}{x^2} = \int \frac{\sqrt{y} e^y (y + 1)^2 dy}{y^2} = \int \frac{e^y (y + 1)^2 dy}{y^{3/2}}$$



إذا كان الشكل المجاور
يمثل منحنى الاقتران:
 $f(x) = e^{-x} \sin 2x$
حيث: $x \geq 0$ فأجيب عن
الأسئلة الثلاثة الآتية
تباعاً:

(31) أجد إحداثيي كل من النقطة A, والنقطة B.

الإحداثيان x للنقطتين A و B هما أصغر حلين موجبين للمعادلة:

$$e^{-x} \sin 2x = 0 \Rightarrow \sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = 0, \pi, 2\pi, \dots \Rightarrow x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \dots \Rightarrow A(\frac{\pi}{2}, 0), B(\pi, 0)$$

(32) أجد مساحة المنطقة المظللة.

$$S = \int_0^{\pi/2} e^{-x} \sin 2x dx$$

للسيوط سنجد أولاً: (التكامل غير المحدود)

$$\begin{aligned} \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \\ \int e^{-x} \sin 2x dx &= -\int 2x f e^{-x} \sin 2x dx \end{aligned}$$

(33) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتعطى سرعته المتجهة بالاقتران:

$v(t) = te^{-t/2}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا بدأ الجسيم الحركة من نقطة الأصل، فأجد موقعه بعد t ثانية.

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t v(t) dt = \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \\ s(t) &= \int_0^t te^{-t/2} dt \end{aligned}$$

في كل مما يأتي المشتقة الأولى للاقتران $(f(x), y=f(x))$ ، ونقطة يمر بها منحنى $y=f(x)$.
أستعمل المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران $(f(x), y=f(x))$:

$$(x; (0,2)) \quad (34) \quad f'(x) = (x+2)\sin x$$

$$\begin{aligned} x f(x) &= -(x+2)\cos x dx du = dx v = -\cos x dx u = x+2 dv = \sin f(x) = \int (x+2)\sin x \\ x+C f(0) &= -2+0+C2 = -2+0+C \Rightarrow C=4 \\ f(x) &= \int (x+2)\sin x dx = -\frac{1}{2}(x+2)^2 \cos x + \int \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2}(x+2)^2 \cos x + \sin x + C \end{aligned}$$

$$(f'(x) = 2xe^{-x}; (0,3)) \quad (35)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int 2xe^{-x} dx u = 2x dv = e^{-x} dx du = 2 dx v = -e^{-x} f(x) = -2xe^{-x} + \int 2e^{-x} \\ x dx &= -2xe^{-x} - 2e^{-x} + C f(0) = 0 - 2 + C3 = -2 + C \Rightarrow C=5 \\ f(x) &= -2xe^{-x} - 2e^{-x} + 5 \end{aligned}$$



(36) دورة تدريبية: تقدمت دعاء لدورة

تدريبية متقدمة في الطباعة. إذا كان عدد

الكلمات التي تطبعها دعاء في الدقيقة يزداد

بمعدل: $N'(t) = (t+6)e^{-0.25t}$ ، حيث $N(t)$ عدد الكلمات التي تطبعها دعاء في

الدقيقة بعد t أسبوعاً من التحاقها بالدورة، فأجد $N(t)$ ، علماً بأن دعاء كانت تطبع 40

كلمة في الدقيقة عند بدء الدورة.

$$\begin{aligned} N(t) &= \int (t+6)e^{-0.25t} dt u = t+6 dv = e^{-0.25t} dt du = dt v = -4e^{-0.25t} N(t) \\ &= -4(t+6)e^{-0.25t} + \int 4e^{-0.25t} dt = -4(t+6)e^{-0.25t} - 16e^{-0.25t} + C \\ N(0) &= -24 - 16 + C40 = -24 - 16 + C \Rightarrow C=80 \Rightarrow N(t) = -4(t+6)e^{-0.25t} - 16e^{-0.25t} + 80 \end{aligned}$$