





أسئلة وزارية (الحموض والقواعد) الدورات (2006-2010)


الدورة الشتوية 2006

أ- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:

1- إحدى الصيغ الآتية تسلك كحمض وقاعدة حسب مفهوم برونستد ولوري:



2- الأيون المشترك في المحلول المكون من حمض HCOOH والملح HCOONa هو:



الحمض	K_a
HClO	3×10^{-8}
H_2S	1×10^{-7}
CH_3COOH	1.8×10^{-5}
HCN	4.9×10^{-10}

ب- لديك أربعة محاليل مائية لبعض الحموض الضعيفة متساوية التركيز (0.1 M) لكل منها. معتمداً على المعلومات الواردة في الجدول المجاور أجب عن الأسئلة الآتية:

1- أي المحاليل له أعلى قيمة pH ؟



2- أي القاعدتين HS^- ، CH_3COO^- هي الأقوى؟

HS^-

3- أكمل المعادلة الآتية ثم حدد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة:



الأزواج المترافقة: $(\text{ClO}^-/\text{HClO})$, $(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-)$

4- احسب تركيز أيون الهيدرونيوم في محلول الحمض H_2S .



$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HS}^-]/[\text{H}_2\text{S}] = [\text{H}_3\text{O}^+]^2/[\text{HS}^-]$$

$$1 \times 10^{-7} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2/20.1$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-8} = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (1 \times 10^{-4}) = 4$$

ج- محلول مكون من القاعدة الضعيفة (CH_3NH_2) تركيزها (0.2 M) والملح $(\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Br})$ تركيزه (0.3 M)، فإذا علمت أن قيمة K_b للقاعدة $= 4 \times 10^{-4}$. احسب pH للمحلول الناتج. (علماً بأن $K_w = 1 \times 10^{-14}$ ، $(\log 3.7 = 0.57)$)

$$K_b = [\text{OH}^-][\text{CH}_3\text{NH}_3^+]/[\text{CH}_3\text{NH}_2]$$

$$4 \times 10^{-4} = [\text{OH}^-] \cdot 0.30.2$$

$$[\text{OH}^-] = 2.66 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_w/[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}/2.66 \times 10^{-4} = 0.37 \times 10^{-10} = 3.7 \times 10^{-11} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (3.7 \times 10^{-11}) = 11 - \log 3.7 = 11 - 0.57 =$$

10.43

الدورة الصيفية 2006

أ- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية:

1- الأيون الذي يعتبر قاعدة حسب تعريف لويس هو:

أ) I^-

ب) Cd^{2+}

ج) Ag^+

د) NH_4^+

2- أي من محاليل الأملاح الآتية يعتبر حمضي التأثير:

أ) NH_4Cl

ب) $NaCl$

ج) CH_3COONa

د) KCl

المحلول	المعلومة
الحمض HA	$K_a = 6.4 \times 10^{-4}$
القاعدة X	$K_b = 1 \times 10^{-8}$
الحمض HB	$[B^-] = 7 \times 10^{-6} M$
القاعدة D	$[H_3O^+] = 2.5 \times 10^{-10}$
الحمض HC	$pH = 3$


ب- في الجدول المجاور خمسة محاليل تركيز كل منها (0.1 M). اعتماداً على المعلومات الواردة عن كل منها في الجدول، أجب عما يأتي:

1- حدد أقوى حمض.

HA

2- احسب قيمة K_b للقاعدة D. علماً أن $K_w = 1 \times 10^{-14}$


$$[\text{OH}^-] = K_w[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14} \times 2.5 \times 10^{-10} = 4 \times 10^{-5} \text{ M}$$



$$K_b = [\text{OH}^-][\text{HD}^+]/[\text{D}] = [\text{OH}^-]^2/[\text{D}]$$

$$K_b = (4 \times 10^{-5})^2 / 20.1 = 16 \times 10^{-9}$$


3- في المعادلة الآتية حدّد الاتجاهين يرجح الاتزان:



يرجح الاتزان جهة النواتج (الاتجاه الأمامي).

4- ما أثر إضافة ملح NaB إلى محلول حمض HB على تركيز $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (يقل، يزداد، يبقى ثابت)؟
يقل.

ج- أكمل التفاعل الآتي ثم حدّد الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة:



د- احسب كتلة (KOH) المذابة في (500 mL) من المحلول إذا كانت قيمة pH للمحلول تساوي (13).

(الكتلة المولية لـ $K_w = 1 \times 10^{-14}$, $K = 39$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$).

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-13} = 1 \times 10^{-13} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = K_w/[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14} / 1 \times 10^{-13} = 1 \times 10^{-1} \text{ M} = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = [\text{KOH}] = 0.1 \text{ M}$$

$$n = M \times V = 0.1 \times 0.5 = 0.05 \text{ mol}$$

$$m = n \times Mr = 0.05 \times 56 = 2.8 \text{ g}$$

الدورة الشتوية 2007

أ- انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية على الترتيب:

1- يتطلب تعريف الحموض والقواعد حسب مفهوم أرهينيوس شرطاً أساسياً هو:
(أ) إيصالها للتيار الكهربائي.

(ب) ذوبانها في وسط غير مائي.

(ج) ذوبانها في وسط مائي.

(د) استخدام كواشف خاصة.

2- الملح الذي إذا أذيب في الماء فإن قيمة pH لمحلوله تكون أقل من (7) هو:

(أ) NaNO_3

(ب) KCN

(ج) Na_2CO_3

(د) NH_4Cl


ب- اعتماداً على الجدول المجاور والذي يبين قيم ثابت التأيّن (K_a) لعدد من الحموض الضعيفة المتساوية التركيز أجب عما يأتي:

صيغة الحمض	K_a
HNO_2	4.5×10^{-4}
HCOOH	1.8×10^{-4}
HOCl	3.1×10^{-8}
CH_3COOH	1.8×10^{-5}

1- اكتب صيغة القاعدة المرافقة للحمض الأضعف.

OCl^-

2- اكتب معادلة تفاعل الحمض HCOOH مع الماء.



3- حدد الثنائيات المترافقة من الحمض والقاعدة في المعادلة السابقة.

الثنائيات المترافقة: $(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+)$, $(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-)$

4- pH للمحلول HNO_2



5- احسب $[\text{H}_3\text{O}^+]$ لمحلول تركيزه (0.01 M) من الحمض CH_3COOH .



$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{H}_3\text{O}^+]^2/[\text{CH}_3\text{COOH}]$$

$$1.8 \times 10^{-5} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2/0.01$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.01} = 4.2 \times 10^{-4} \text{ M}$$

ج- محلول مكون من القاعدة NH_2OH تركيزها (0.2 M) ومحلول الملح $\text{NH}_2\text{OH}_2\text{Cl}$ تركيزه (0.3 M) مع العلم أن قيمة K_b للقاعدة تساوي (1.1×10^{-8}) ، أجب عما يأتي:

1- احسب تركيز $[\text{OH}^-]$.

$$1.1 \times 10^{-8} = [\text{OH}^-] \times 0.30.2$$

$$[\text{OH}^-] = 7.3 \times 10^{-9} \text{ M}$$





2- ما صيغة الأيون المشترك؟



الدورة الصيفية 2007

أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الآتية على الترتيب:

1- أحد المحاليل الآتية ليس (حمض / قاعدة) مترافقان:



2- المحلول الذي له أعلى قيمة pH من بين المحاليل الآتية المتساوية في التركيز:



ب) إذا كان لديك الجدول الآتي الذي يحتوي على معلومات متعلقة بالحمضين الضعيفين (1، 2).

ادرسه جيداً وأجب عن الأسئلة التي تليه: ($K_w = 1 \times 10^{-14}$)

الرقم	الصيغة الكيميائية	التركيز	معلومات خاصة بالحمض
1	CH_3COOH	0.1 M	$K_a = 1.74 \times 10^{-5}$
2	ClCH_2COOH	1 M	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 3.8 \times 10^{-2} \text{ M}$

1- ما المقصود بمصطلح الحمض الضعيف؟

هو الحمض الذي يتفكك جزئياً في الماء.

2- اكتب معادلة تفكك الحمض رقم (2) في الماء.



3- احسب $[\text{OH}^-]$ في الحمض رقم (1).




$$K_a = [H_3O^+] [CH_3COO^-] [CH_3COOH] = [H_3O^+]^2 [CH_3COOH]$$

$$1.74 \times 10^{-5} = [H_3O^+] 20.1$$

$$[H_3O^+] = 1.74 \times 10^{-6} = 1.3 \times 10^{-3} M$$

$$[OH^-] = K_w [H_3O^+] = 1 \times 10^{-14} 1.3 \times 10^{-3} = 0.77 \times 10^{-11} = 7.7 \times 10^{-12} M$$

4- احسب قيمة K_a للحمض رقم (2).



$$K_a = [H_3O^+] [ClCH_2COO^-] [ClCH_2COOH] = [H_3O^+]^2 [ClCH_2COOH]$$

$$K_a = (3.8 \times 10^{-2})^2 = 14.44 \times 10^{-4}$$

5- أيهما أقوى كقاعدة $ClCH_2COO^-$ أم CH_3COO^- ؟ فسّر إجابتك.

CH_3COO^- لأنها ناتجة من حمض أضعف.

ج) إذا أضيفت كمية من ملح NH_4Cl إلى (500 mL) من محلول (0.1 M) من NH_3 حتى أصبح $[H_3O^+]$ يساوي $1 \times 10^{-9} M$ ، احسب عدد مولات NH_4Cl التي أضيفت إلى المحلول. ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

$$[OH^-] = K_w [H_3O^+] = 1 \times 10^{-14} 1 \times 10^{-9} = 1 \times 10^{-5} M$$

$$K_b = [OH^-] [NH_4^+] [NH_3]$$





$$1.8 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} [NH_4^+] 0.1$$

$$[NH_4^+] = [NH_4Cl] = 0.18 M$$

$$n = M \times V = 0.18 \times 0.5 = 0.09 \text{ mol}$$

أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

(1) أحد الآتية يعتبر من حموض لويس:



(2) أحد الأملاح الآتية حمضي التأثير:



ب) لديك المحلولين اللذين يحملان الرقمين (1 و 2)، المحلول (1) هو محلول KOH تركيزه $(1 \times 10^{-4} \text{ M})$ ، المحلول (2) هو محلول H_2S تركيزه $(1 \times 10^{-1} \text{ M})$. قيمة K_a له تساوي (1×10^{-7}) احسب قيمة:

pH (1) للمحلول رقم (1).



$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HS}^-][\text{H}_2\text{S}] = [\text{H}_3\text{O}^+]^2[\text{H}_2\text{S}]$$

$$1 \times 10^{-7} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \times 10^{-1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-8} = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (1 \times 10^{-4}) = 4$$

pH (2) للمحلول رقم (2).



$$[\text{OH}^-] = [\text{KOH}] = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = K_w[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14} \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-10} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (1 \times 10^{-10}) = 10$$

K_a	الحمض
3×10^{-8}	HClO
4.5×10^{-4}	HNO_2
1.8×10^{-5}	CH_3COOH

ج) اعتماداً على الجدول المجاور، أجب عن الأسئلة الآتية:

1- اكتب صيغة الحمض الأقوى.



2- اكتب صيغة القاعدة المرافقة الأقوى.



3- إذا تساوت محاليل الحموض في التركيز فأيهما له أقل قيمة pH ؟



د) محلول مكون من CH_3NH_2 تركيزه 0.5 M و $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ تركيزه K_b (0.4 M) لـ $\text{CH}_3\text{NH}_2 = 4 \times 10^{-4}$.

1- اكتب صيغة الأيون المشترك.



2- احسب pH للمحلول.

$$K_b = [\text{OH}^-] [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] [\text{CH}_3\text{NH}_2]$$

$$4 \times 10^{-4} = [\text{OH}^-] 0.4 \times 0.5$$

$$[\text{OH}^-] = 5 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_w[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14} \times 5 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-11} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (2 \times 10^{-11}) = 11 - \log 2 = 11 - 0.3 = 10.7$$

3- إذا أضيف (0.2 M) من HBr احسب pH بعد الإضافة. ($\log 5 = 0.7$, $\log 2 = 0.3$)

$$K_b = [\text{OH}^-] [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] [\text{CH}_3\text{NH}_2]$$

$$4 \times 10^{-4} = [\text{OH}^-] (0.4 + 0.2)(0.5 - 0.2)$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 10^{-4} \text{ M}$$




$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_w [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14} \times 2 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-11} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (2 \times 10^{-11}) = 11 - \log 2 = 11 - 0.3 = 10.7$$

الدورة الصيفية 2008

أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

1) أي من الآتية يمكن أن يسلك كحمض وكقاعدة:



2) إن إضافة الملح RCOONa للحمض RCOOH يؤدي إلى:

أ) زيادة pH.

ب) تقليل pH.

ج) تقليل K_a .

د) زيادة $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

ب) إذا كان تركيز H_3O^+ في محلول الحمض HX يساوي $8 \times 10^{-2} M$ و pH لمحلول الحمض HY تساوي (2.5). أجب عما يأتي:

1- حدّد الأزواج المترافقة في التفاعل: $HX + Y^- \rightleftharpoons HY + X^-$

(HX/ X^-) , (Y/ HY)

2- حدد الجهة التي يرجحها الاتزان.

يرجح الاتزان جهة النواتج.

ج) الجدول الآتي يبين عدد من المحاليل الافتراضية وقيم pH لها:

F	E	D	C	B	A	المحلول الافتراضي
1	12	7	0	8.7	4.5	pH

فأي المحاليل يمثل:

1- القاعدة الأقوى.

E

2- محلول NaCl .

D

3- محلول HNO_3 تركيزه 0.1 M

F

4- قاعدة فيها $[OH^-]$ يساوي $5 \times 10^{-6} M$

B

5- حمضاً فيه $[H_3O^+]$ يساوي $3 \times 10^{-5} M$

A

د) حدّد حمض وقاعدة لويس في محلول $[Co(NH_3)_4]^{2+}$.

حمض لويس: Co^{2+} ، قاعدة لويس: NH_3

هـ) محلول مكوّن من RNH_2 تركيزها (0.04 M) والملح RNH_3Cl تركيزه (0.04 M).

1- اكتب معادلة تفكك كل منهما في الماء.



2- حدّد صيغة الأيون المشترك.



3- إذا كانت pH للمحلول تساوي (8.3) احسب K_b لـ RNH_2 .

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-8.3} = 5 \times 10^{-9} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = K_w[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14} \times 5 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$K_b = [\text{OH}^-][\text{RNH}_3^+]/[\text{RNH}_2] = 5 \times 10^{-6} \times 0.04 / 0.04$$

$$K_b = 5 \times 10^{-6}$$

4- اكتب معادلة تحضير RNH_3Cl من RNH_2 .



و) ما طبيعة تأثير الملح RCOOK (حمضي، قاعدي، متعادل)؟

قاعدي.

$$(\log 5 = 0.7 , \log 3 = 0.5 , \log 2 = 0.3)$$